

## LATVIJAS CEPURĪŠU SĒNU (*AGARICALES* s.l.) KONSPEKTS

**Inita Dāniele [Avota]\*, Inguna Krastiņa\*\***

\*Latvijas Dabas muzejs, Kr. Barona iela 4, Rīga LV 1712

\*\*LU Bioloģijas institūts, Miera iela 3, Salaspils LV 2169

Latvijas cepurīšu sēnu konspektā ir ietvertas 1080 sugas, 43 varietātes un 14 formas. Sugām doti biežāk lietotie sinonīmi, arī latviskie nosaukumi, minēti herbāriji, kuros glabājas paraugi. Raksturota sastopamība, trofiskā grupa, biotops, augļķermeņu parādīšanās laiks, kā arī iespēja sugu lietot pārtikā.

**Atslēgas vārdi:** Latvijas mikoflora, cepurīšu sēnes, sēnu latviskie nosaukumi.

### IEVADS

Pēdējais apkopojums par Latvijas cepurīšu sēnēm publicēts 1986.gadā Baltijas valstu agarikāļu rindas sēnu (*Agaricales* s. l.) konspektā (Urbonas et al. 1986). Konspeks ietver no 1778. gada līdz 1984.gadam Lietuvā, Latvijā un Igaunijā konstatētās cepurīšu sēnes. Latvijā šajā laikā bija reģistrētas 639 cepurīšu sēnu sugas, 17 pasugas un 4 formas.

Pēdējā laikā Latvijas cepurīšu sēnu sugu saraksts ir stipri papildinājies. Pēc 1986. gada publicēti vairāki Latvijai jaunu cepurīšu sēnu sugu saraksti (Avota 1992, 1993, 1994, 1995, 1995a, 1996; Avota, Krastiņa 1994), kā arī bērzlapju ģints sugu noteicēji, kuros ir daudz jaunu sugu (Amoliņš 1992, 1996). Daļa no jaunajām sugām ir minētas arī citos avotos (Krastiņa 1990, Krastina 2000; Kalamees 1996; Vimba 1997; Vauras, Ruotsalainen 2000).

Pašlaik Latvijā konstatētas cepurīšu sēnu 1080 sugas, 43 varietātes un 14 formas. Herbārijos ir materiāls par 1022 sugu un iekšsugu taksoniem: 827 sugu paraugi glabājas Latvijas Dabas muzeja herbārijā (ap 2000 vienību, pārsvarā I. Dānieles [Avotas] vākumi). 257 taksonu paraugi atrodas Latvijas Universitātes herbārijā, 317 – I.Krastiņas herbārijā un 162 – A. Amoliņa herbārijā. Latvijā sēnu paraugus ievākuši arī citu valstu zinātnieki: K. Kalamees (Igaunija), J. Vauras (Somija) u.c., bet par šiem vākumiem

ārzemju herbārijos mums nav ziņu. 115 sugas ir zināmas tikai pēc literatūras datiem.

Konspektā nav ietvertas dažas publikācijās līdz šim minētās sugas, kurām nav herbārija materiāla vai par kurām nav citu drošu ziņu, kā arī tās, kuras, kritiski pārskatot herbārijus, atzītas par kļūdaini noteiktām. Konspektā nav iekļautas arī vairākas herbārijos esošās sistemātiski šaubīgās sugas. Sugās, kuras nav ievietotas 1986. gada konspektā, bet ir minētas citās publikācijās, mūsu sarakstā atzīmētas ar vienu zvaigznīti (\*), norādot arī literatūras avotu. Tās lielākoties ir sugas, kas pirmo reizi minētas pēc 1986. gada, bet ir arī dažas sugas no senākām publikācijām, piemēram, F.E. Štolla akvareļos (1913-1939) attēlotās sēņu sugas. Ar divām zvaigznītēm (\*\*) atzīmētas Latvijai jaunās sugas.

Konspektā sēņu sugas sakārtotas alfabētiskā secībā, vadoties pēc biežāk lietoto noteicēju “Nordic Macromycetes. Vol. 2” (Hansen & Knudsen 1992) un “Die Röhrlinge und Blätterpilze” (Moser 1978) nomenklatūras, bet dažos gadījumos - pieskaņojoties arī Igaunijas un Lietuvas sēņu sarakstiem. Gan ģintīm, gan sugām doti latviskie nosaukumi (ģints nosaukums – daudzskaitlī, sugas nosaukums – vienskaitlī, sarakstā tie treknināti). Tām sugām, kurām latvisko nosaukumu līdz šim nebija, tie ir darināti, vai nu tulkojot latīņu, vācu vai krievu nosaukumus, vai arī ņemot vērā sēnes izskatu, augšanas vietu u.tml. Jaunie nosaukumi akceptēti Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijā. Visām sugām doti arī biežāk lietotie zinātnisko (sarakstā – kursīvā, netreknināti) un latvisko nosaukumu sinonīmi. Lai atvieglotu darbu ar konspektu, sinonīmi un ģinšu latīniskie nosaukumi sakārtoti arī atsevišķā sarakstā konspeksa beigās.

Sugām raksturota sastopamība, piederība noteiktais trofiskajai grupai, raksturīgie biotopi, augļķermeņu parādīšanās laiks (mēnesis – apzīmēts ar romiešu ciparu), kā arī iespēja lietot pārtikā. Sugas piederība trofiskajai grupai precīzēta pēc “Ekologisk Katalog over Storsvampar. Databanken fot hotade arter” (Hallingback 1994). Nosaukti herbāriji, kuros glabājas sēņu paraugi. Ja herbārija paraugu nav, dots literatūras avots, kurā suga minēta.

**Saīsinājumi:**

L – literatūras avots;

H – herbārijs;

DM – Latvijas Dabas muzeja herbārijs;

RIG – Latvijas Universitātes herbārijs;

HK – I.Krastiņas herbārijs;

HA – A.Amoliņa herbārijs;

\* - taksoni, kas minēti dažādās publikācijās, bet nav bijuši iekļauti Baltijas valstu agarikāļu rindas sēņu 1986.gada konspektā;

\*\* - Latvijai jaunie taksoni.

Izsakām pateicību A.Amoliņam, V.Urbonas un K.Kalamees par palīdzību sugu noteikšanā, kā arī E.Vimbam par ieteikumiem konspekta sagatavošanā.

## TAKSONU SARKSTS

*Agaricus* L.: Fr., **atmatenes**

*A. arvensis* Schaeff. – *A. abruptibulbus* Peck – *Psalliota arvensis* (Schaeff.)

Fr., **tīruma atmatene**, humusa saprotrofs, ēdama, ļoti bieži, lapu koku mežos, pļavās, dārzos, VI– X, H: DM, RIG.

*A. augustus* Fr. – *A. perrarus* Schulz., **cildenā atmatene**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, ēdama, reti, parkos, lapu koku mežos, VI– IX, H: DM, RIG.

*A. bisporus* (Lange) Imbach – *A. hortensis* (Cooke) Pilát, **dārza atmatene**, humusa saprotrofs, koprotrofs, ēdama, reti, ceļmalās, dārzos, komposta kaudzēs, kultivē, VIII– IX, H: DM.

*A. bitorquis* (Quél.) Sacc. – *A. edulis* (Vittad.) Pilát, **pilsētas atmatene**, humusa saprotrofs, ēdama, bieži, ceļmalās, dārzos, parkos, V– IX, H: DM, RIG.

*A. campestris* L.: Fr. – *Psalliota campestris* (L.) Fr., **lauka atmatene**, humusa saprotrofs, ēdama, ļoti bieži, ganībās, pļavās, V– XI, H: DM, HK, RIG.

\*\**A. comtulus* Fr., **sīkā atmatene**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, ēdama, bieži, jauktos mežos, pļavās, zālainās ceļmalās, VIII– X, H: HK.

\*\**A. devoniensis* Orton – *Psalliota arenicola* Wakef. & Pers., **smiltāju atmatene**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, ēdama, reti, kāpās, IX– X, H: HK.

*A. langei* (F. H. Möller) F. H. Möller – *A. haemorrhoidearius* Schulz. ss. Lange, Schaeff., Pilát – *Psalliota haemorrhoidea* Kalchbr., **sarkstošā atmatene**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, ēdama, reti, eglu un jauktos mežos, VII– X, H: DM, RIG.

*A. macrosporus* (F. H. Möller & Schaeff.) Pilát, **dižsporu atmatene**, humusa saprotrofs, ēdama, ļoti reti, piejūras pļavās, kāpās, VII– X, H: DM.

- A. rusiophyllus* Lasch – *Psalliota rusiophylla* (Lasch) Fr., **sarkanlapīņu atmatene**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, ēdama, bieži, jauktos mežos, VII– X, H: DM.
- A. semotus* Fr. – *A. rubellus* (Gill.) Sacc., **vīnsarkanā atmatene**, nedzīvās zemsedzes un humusa saprotrofs, ēdama, reti, skuju koku un jauktos mežos, VII– X, H: DM, HK.
- A. silvaticus* Schaeff.– *A. haemorrhoidarius* Schulz. ss F. H. Möller – *Psalliota silvatica* (Schaeff.) Fr., **meža atmatene**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, ēdama, bieži, eglu mežos, VII– XI, H: DM, HK.
- A. silvicola* (Vittad.) Peck – *Psalliota silvicola* (Vittad.) Fr., **dzeltējošā atmatene**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, ēdama, ļoti bieži, mežos, VII– XI, H: DM.
- A. vaporarius* (Vittad.) M. M. Moser, **milzu atmatene**, humusa saprotrofs, ēdama, reti, dārzos, tīrumos, komposta kaudzēs, VI– X, H: DM.
- A. xanthoderma* Genev., **indīgā atmatene**, humusa saprotrofs, indīga, ļoti reti, lapu koku mežos, dārzos, VIII, H: DM.

#### *Agrocybe* Fayod, tīrumenes

- \**A. arvalis* (Fr.) Singer – *A. tuberosa* (Henn.) Singer, **arumu tīrumene**, humusa un nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, ceļmalās, tīrumos, dārzos, IX– X, H: DM, L: Avota 1995a.
- \**A. erebia* (Fr.: Fr.) Kühner, **tumšā tīrumene**, humusa saprotrofs, ēdama, reti, lapu koku mežos, zālainās vietās, auglīgās augsnēs, V– XI, H: DM, L: Avota 1994.
- A. molesta* (Lasch) Singer – *A. dura* (Bolton: Fr.) Singer, **cietā tīrumene**, humusa saprotrofs, neēdama, reti, dārzos, V– X, H: DM, RIG.
- \*\**A. paludosa* (Lange) Bon & Courtecuisse, **purva tīrumene**, humusa saprotrofs, neēdama, ļoti reti, purvos, mitros mežos, VI– VIII, H: DM.
- \**A. pediades* (Fr.: Fr.) Fayod – *A. semiorbicularis* (Bull.) Fayod, **puslodes tīrumene**, humusa saprotrofs, neēdama, bieži, mežos, zālainās vietās, VI– VIII, H: DM, L: Avota 1996.

- A. *praecox*** (Pers.: Fr.) Fayod – *Pholiota praecox* (Pers.) Fr., **agrā tīrumene**, humusa saprotrofs, ēdama, bieži, mežos, krūmājos, dārzos, ceļmalās, trūdvielām bagātās augsnēs, V– VIII, H: DM, HK, RIG.
- \*\***A. *pusiola*** (Fr.) R. Heim – *A. pusilla* (Fr.) Watling, **sīkā tīrumene**, humusa saprotrofs, neēdama, ļoti reti, parkos, mežmalās, ceļmalās, zālainās vietās, smilšainās augsnēs, VI, H: DM.
- \***A. *sphaleromorpha*** (Bull.: Fr.) Fayod ss. Bon, **bumbulkāta tīrumene**, humusa saprotrofs, neēdama, reti, jauktos mežos, purvainās vietās, kā arī smilšainās augsnēs, V– VII, H: DM, L: Avota 1996.
- \*\***A. *subpediates*** (Murill) Watling, **pļavas tīrumene**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, bieži, sausās pļavās, kāpās, VII– IX, H: HK.
- \***A. *vervacti*** (Fr.: Fr.) Singer, **dobkāta tīrumene**, humusa saprotrofs, neēdama, reti, ganībās, V– X, H: DM, L: Avota, Krastiņa 1994.

#### *Amanita* Pers., **mušmires, makstsēnes**

- A. *alba*** Gillet – *A. vaginata* var. *alba* Gillet – *Amanitopsis alba* Gill., **baltā makstsēne**, mikorizas sēne, indīga, ļoti reti, skuju koku mežos, skābās augsnēs, VI– VIII, H: DM.
- \*\***A. *battarae*** (Boud.) Bon – *A. umbrinolutea* Secr., **divkrāsu makstsēne**, mikorizas sēne, ēdama, reti, skuju koku mežos, VI– X, H: DM.
- A. *citrina*** (Schaeff.) Pers. – *A. mappa* (Batsch) Quél., **bālā mušmire**, mikorizas sēne, indīga, ļoti bieži, skuju koku mežos, skābās augsnēs, VII– XI, H: DM, RIG.
- A. *crocea*** (Quél.) Singer – *Amanitopsis crocea* (Quél.) Singer, **oranžā makstsēne**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, mežos, VIII– X, H: DM, HK.
- A. *eliae*** Quél., **Elijas mušmire**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VII– IX, H: DM.
- A. *excelsa*** (Fr.) Bertillon – *A. spissa* (Fr.) P. Kumm., **pelēkā mušmire**, mikorizas sēne, ēdama, reti, skuju koku un jauktos mežos, skābās augsnēs, VII– IX, H: DM, HK, RIG.

- A. friabilis* (P. Karst.) Bas, **alkšņu makstsēne**, alkšņu mikorizas sēne, neēdama, ļoti reti, mitros alkšņu mežos, VIII– IX, H: DM.
- A. fulva* (Schaeff.) Pers. – *A. vaginata* var. *badia* Gillet – *Amanitopsis fulva* (Schaeff.: Sommerfelt) Singer, **dzeltenbrūnā makstsēne**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, priežu mežos, VII– VIII, H: DM.
- A. muscaria* (L.: Fr.) Hook., **sarkanā mušmire**, mikorizas sēne, indīga, ļoti bieži, mežos, VII– XI, H: DM, RIG.
- A. pantherina* (DC.: Fr.) Krombh., **panteru mušmire**, mikorizas sēne, indīga, bieži, mežos, skābās augsnēs, VII– IX, H: DM, RIG.
- A. phalloides* (Vail.: Fr.) Link, **zaļā mušmire**, mikorizas sēne, indīga, bieži, lapu koku un jauktos mežos, trūdvielām bagātās augsnēs, VII– X, H: DM, RIG.
- A. porphyria* (Alb. & Schwein.: Fr.) Mladý, **violetbrūnā mušmire**, mikorizas sēne, indīga, ļoti bieži, skuju koku mežos, skābās augsnēs, VIII– XI, H: DM, HK, RIG.
- A. regalis* (Fr.) Michael – *A. muscaria* subsp. *regalis* (Fr.) Sacc., **brūnā mušmire**, mikorizas sēne, indīga, bieži, eglu mežos, skābās augsnēs, VIII– IX, H: DM, RIG.
- A. rubescens* (Pers.: Fr.) Gray, **sarkstošā mušmire**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, mežos, VI– XI, H: DM, HK, RIG.
- A. strobiliformis* (Paulet) Bertilloni, **bārkstainā mušmire**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, lapu koku un jauktos mežos, VII– IX, L: Urbonas et al. 1986.
- A. vaginata* (Bull.: Fr.) Vittad. – *Amanitopsis vaginata* (Bull.: Fr.) Roze, **pelēkā makstsēne**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, skuju koku un jauktos mežos, skābās augsnēs, VII– XI, H: DM, RIG.
- A. virosa* (Lam.) Bertilloni – *A. verna* (Bull.: Fr.) Roques, **baltā mušmire**, eglu mikorizas sēne, indīga, bieži, eglu mežos, skābās augsnēs, VII– X, H: DM, RIG.

***Armillaria* (Fr.: Fr.) Staude, **celmenes****

\*\**Armillaria borealis* Marxm. & Korhonen, **ziemeļu celmene**, parazīts, ēdama, reti, priežu mežos, IX– X, H: HK.

\*\**Armillaria ostoyae* (Romagn.) Herink – *A. obscura* (Schaeff.) Henrik ss. Marxm. & Printz, **tumšā celmene**, parazīts, ēdama, bieži, mežos, parkos, IX– XII, H: DM.

\*\* *Armillaria lutea* Gillet, **dzeltenā celmene**, parazīts, ēdama, bieži, mežos, parkos, IX– XII, H: DM.

*Armillaria mellea* (Vahl.: Fr.) P. Kumm. – *Armillariella mellea* (Vahl: Fr.) P. Karst., **parastā celmene**, koksnes saprotrofs, parazīts, ēdama, ļoti bieži, mežos, parkos, IX– XII, H: DM, RIG.

***Arrhenia* Fr., sūneklenes**

\*\**A. acerosa* (Fr.: Fr.) Kühner – *Leptoglossum acerosum* (Fr.) n. c., **zemes sūneklene**, humusa saprotrofs, neēdama, ļoti reti, plavās, uz augsnes, koksnes, uz zāles atliekām, sūnās, X, H: DM.

\*\**A. acerosa* (Fr.: Fr.) Kühner f. *latispora* Favre, humusa saprotrofs, neēdama, ļoti reti, IX– X, H: HK.

A. *spathulata* (Fr.) Redhead – *Leptoglossum muscigenum* (Bull.: Fr.) P. Karst., **joslainā sūneklene**, briotrofs, neēdama, bieži, mežos, ganībās, VII– X, H: DM, HK, RIG.

***Asterophora* Ditm.: Fr., naksnenes**

*Asterophora lycoperdoides* (Bull.: Fr.) Ditm. – *Nyctalis asterophora* Fr. – **pūpēžu naksnene**, mikotrofs, neēdama, bieži, mežos, uz trūdošām tumšajām bērzlapēm *Russula adusta* Fr., VII– XI, H: DM, RIG.

*Asterophora parasitica* (Bull.: Fr.) Singer – *Nyctalis parasitica* (Bull.: Fr.) Singer – **parazītiskā naksnene**, mikotrofs, neēdama, ļoti reti, mežos, uz trūdošām baltajām bērzlapēm *Russula delica* Fr., IX– X, L: Urbonas et al. 1986.

**Baeospora** Singer, čiekurenes

\***Baeospora myosura** (Fr.: Fr.) Singer – *Collybia myosura* (Fr.: Fr.) Quél.,  
peļastes čiekurene, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, bieži,  
skuju koku mežos, uz čiekuriem, VIII– XI, H: DM, HK, L: Štolls,  
akvareļi 1913-1939.

**Bolbitius** Fr., mēslenes

**Bolbitius titubans** (Bull.: Fr.) Fr. – *B. vittellinus* (Pers.: Fr.) Fr. – *B. fragilis*  
(L.: Fr.) Fr., zaļdzeltenā mēslene, humusa un koksnes saprotrofs,  
koprotrofs, neēdama, bieži, ganībās, zālainās vietās, V– X, H: DM,  
RIG.

**Boletus** Dill.: Fr., bekas, baravikas

**B. betulinola** (Vassilkov) Pilát & Dermek – *B. edulis* f. *betulinola* Vassilk.,  
bērzu baravika, bērzu mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, jauktos  
mežos, VII– IX, H: DM, HK.

**B. calopus** (Pers.) Fr. – *B. pachypus* Fr.: Fr., resnkāta beka, mikorizas  
sēne, indīga, ļoti reti, lapu koku mežos, VIII– X, L: Urbonas et al.  
1986.

**B. edulis** Bull.: Fr., egļu baravika, egļu mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži,  
egļu un jauktos mežos, skābās augsnēs, VI– XI, H: DM.

**B. erythropus** Pers., pārslainā beka, mikorizas sēne, ēdama, reti, mežos,  
VI– IX, H: DM, RIG.

**B. luridus** Schaeff.: Fr., raganu beka, ozolu mikorizas sēne, ēdama, bieži,  
lapu koku un jauktos mežos, VI– IX, H: DM, RIG.

**B. pinophilus** Pilát & Dermek – *B. pinicola* (Vittad.) Vent, priežu baravika,  
priežu mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, priežu mežos, VII– XI, H:  
DM.

**B. radicans** Pers.: Fr. – *B. albidus* Roc., sakņkāta beka, mikorizas sēne,  
neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VII– IX, H: RIG.

**B. reticulatus** Schaeff. – **B. aestivalis** Paulet: Fr., **vasaras baravika**, ozolu mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, jauktos un lapu koku mežos, VI– X, H: DM.

**B. satanas** Lenz, **velna beka**, mikorizas sēne, indīga, ļoti reti, lapu koku mežos, VII– X, H: DM.

#### *Calocybe* Donk, **skaistgalves**

\*\***C. carneia** (Bull.: Fr.) Donk, **sārtā skaistgalve**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, ēdama, reti, dārzos, parkos, ceļmalās, VII– IX, H: DM.

\***C. cerina** (Pers.: Fr.) Kühner & Donk, **vaska skaistgalve**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, neēdama, reti, skuju koku mežos, VIII– IX, H: DM, L: Avota 1994.

\***C. chrysentera** (Bull.: Fr.) Singer: Bon & Contu, **dzeltenā skaistgalve**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, parkos, VIII– X, H: DM, L: Lapiņš 1963.

**C. gambosa** (Fr.) Singer: Donk – **C. georgii** (Clus.) Kühner – *Tricholoma gambosum* Fr., **maija auzene**, humusa saprotofs, ēdama, ļoti bieži, mežos, parkos, krūmājos, mežmalās, V– VI, H: DM, RIG.

\***C. ionides** (Bull.: Fr.) Kühner & Donk, **vijolīšu skaistgalve**, nedzīvās zemsedzes un humusa saprotofs, ēdama, ļoti reti, jauktos mežos, krūmājos, VII– IX, H: DM, L: Štolls, akvareļi 1913-1939.

**C. leucocephala** (Fr.) Singer – *Tricholomella constricta* (Fr.) Zerova: Kalamees, **baltā skaistgalve**, nedzīvās zemsedzes un humusa saprotofs, ēdama, reti, lapu koku un jauktos mežos, parkos, VI– X, L: Urbonas et al. 1986.

\*\***C. onychina** (Fr.) Donk, **tumšā skaistgalve**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, neēdama, ļoti reti, skujkoku mežos, IX– X, H: HK.

#### *Camarophyllum* P. Kumm., **biezlapītes**

**C. pratensis** (Pers.: Fr.) P. Kumm. – *Cuphophyllum pratensis* (Pers.: Fr.) Bon, **pļavas biezlapīte**, humusa saprotofs, ēdama, reti, sausās pļavās, mežmalās, VIII– X, H: DM, HK.

*C. subradiatus* (Schum.) Wünsche, **starainā biezlapīte**, humusa saprotrofs, ēdama, reti, sausās pļavās, skābās augsnēs, VIII– X, L: Urbonas et al. 1986.

*C. virgineus* (Wulf.: Fr.) Kovalenko – *C. niveus* (Scop.) Bon, **sniegbaltā biezlapīte**, humusa saprotrofs, ēdama, bieži, sausās pļavās, skābās augsnēs, VII– XI, H: DM, HK.

***Cantharellula* Singer, gailenītes**

*C. umbonata* (J. F. Gmel.: Fr.) Singer, **kuprainā gailenīte**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, ēdama, ļoti bieži, priežu mežos, VIII– XI, H: DM, HK RIG.

***Chalciporus* Bat. rubīnbekas**

*Ch. piperatus* (Bull.: Fr.) Bat. – *Suillus piperatus* (Bull.: Fr.) O. Kuntze – *Boletus piperatus* (Bull.: Fr.) O. Kuntze, **piparu rubīnbeka**, priežu mikorizas sēne, ēdama, bieži, skuju koku un jauktos mežos, VII– X, H: DM, HK.

*Ch. rubinus* (W. G. Smith) Singer, **sarkanā rubīnbeka**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, parkos, VIII– X, L: Urbonas et al. 1986.

***Cheimonophyllum* Singer, karotenes**

\**Ch. candidissimum* (Berk. & M. A. Curtis) Singer, **sniegbaltā karotene**, koksnes saprotrofs uz apses kritālām, neēdama, reti, lapu koku mežos, VIII– X, H: DM, HK, L: Avota 1994.

***Chroogomphus* (Singer) F. H. Möller, dzeltenpēdenes**

*Ch. rutilus* (Schaeff.: Fr.) O. K. Mill. – *Gomphidius rutilus* (Schaeff.: Fr.) S. Lundell & Nannf. – *Gomphidius viscidus* (L.) Fr., **lipīgā dzeltenpēdene**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, skuju koku mežos, priežu mežos, VIII– X, H: DM, HK, RIG.

***Clitocybe* P. Kumm., piltuvenes**

- \*\**C. albofragrans* (Harmaja) Kuyper, **smaržīgā piltuvene**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, neēdama, bieži, zālainās vietās, sūnās, antropogēnos biotopos, VIII– IX, H: HK.
- C. alexandri* (Gillet) Konrad, **Aleksandra piltuvene**, mikorizas sēne, nedzīvās zemsedzes saprotofs, ēdama, reti, eglu mežos, IX– X, H: DM.
- C. angustissima* (Lasch) P. Kumm., **šaurlapīņu piltuvene**, humusa saprotofs, neēdama, reti, meža klajumos, pļavās, ganībās, VI– IX, H: DM.
- \**C. anisata* Velen. s. Harmaja, **saldsmaržas piltuvene**, mikorizas sēne, nedzīvās zemsedzes saprotofs, neēdama, reti, jauktos mežos, VIII– X, H: DM, L: Avota 1994.
- C. brumalis* (Fr.: Fr.) P. Kumm., **ziemas piltuvene**, nedzīvās zemsedzes un humusa saprotofs, ēdama, bieži, skuju koku mežos, smilšainās augsnēs, IV– XII, H: DM.
- C. candicans* (Pers.: Fr.) P. Kumm., **baltā piltuvene**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, neēdama, bieži, lapu koku mežos, VIII– X, H: DM, HK.
- C. catinus* (Fr.) Quél. ss. Harmaja, **błodas piltuvene**, nedzīvās zemsedzes un humusa saprotofs, ēdama, reti, lapu koku mežos, IX– X, L: Urbonas et al. 1986.
- C. cerussata* (Fr.) P. Kumm., **iebaltā piltuvene**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, indīga, bieži, skuju koku un jauktos mežos, VII– XI, H: DM, HK, RIG.
- C. clavipes* (Pers.: Fr.) P. Kumm., **biezkāta piltuvene**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, ēdama, ļoti bieži, skuju koku un jauktos mežos, skābās augsnēs, VII– XI, H: DM, HK, RIG.
- \**C. costata* K. & R. – *C. incilis* (Fr.) Gillet, **ribainā piltuvene**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, ēdama, ļoti reti, eglu mežos, VII– X, H: DM, L: Avota 1994.

- C. dealbata* (Sowerby: Fr.) P. Kumm. – *C. ruderalis* Harmaja, **lauku piltuvene**, nedzīvās zemsedzes un humusa saprotrofs, indīga, bieži, pļavās, ceļmalās, mežmalās, VIII– XI, H: DM, HK.
- \*\**C. deceptiva* Bigelow, **saldenā piltuvene**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, jauktos mežos, IX– X, H: HK.
- C. diatreta* (Fr.: Fr.) P. Kumm., **caurspīdīgā piltuvene**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, indīga, bieži, skuju koku un jauktos mežos, VIII– X, H: DM, HK.
- C. ditopus* (Fr.: Fr.) Gillet, **pelēkā piltuvene**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, reti, skuju koku mežos, IX– XI, L: Urbonas et al. 1986.
- C. ericetorum* Quél., **viršāja piltuvene**, humusa saprotrofs, neēdama, bieži, priežu mežos, mežmalās, meža klajumos, VIII– X, H: DM.
- \**C. fragrans* (With.: Fr.) P. Kumm. – *C. suaveolens* (Schumach.: Fr.) P. Kumm., **aromātiskā piltuvene**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, bieži, priežu un lapu koku mežos, IX– XI, H: DM, HK, L: Štolls, akvareļi 1913-1939.
- \**C. fuligineipes* Métrod – *C. fritilliformis* (Lasch: Fr.) Gillet, **rūgtā piltuvene**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, jauktos mežos, VII– VIII, H: DM, L: Avota 1996.
- \**C. gallinacea* (Scop.) Lange, **rūgtenā piltuvene**, humusa saprotrofs, neēdama, reti, mežos, X, H: DM, L: Avota 1994.
- C. geotropa* (Bull.) Quél., **dzeltenpelēkā piltuvene**, humusa un nedzīvās zemsedzes saprotrofs, ēdama, reti, mežos, VIII– XI, H: DM.
- C. gibba* (Pers.: Fr.) P. Kumm. – *C. infundibuliformis* (Schaeff.) Quél., **parastā piltuvene**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, ēdama, ļoti bieži, mežos, VII– XI, H: DM, HK, RIG.
- \**C. inornata* (Sowerby: Fr.) Gillet, **pelēklapiņu piltuvene**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, ēdama, reti, skuju koku mežos, IX– X, H: DM, L: Avota 1994.

- \**C. josserandii* Singer – *Pleurotellus mutilus* (Fr.) Konr. & Maubl. ss. Joss., **Žoserāna piltuvene**, briotrofs, humusa saprotrofs, neēdama, bieži, skuju koku un jauktos mežos, VIII– X, H: DM, L: Avota 1993.
- \**C. langei* Singer & Hora, **Langes piltuvene**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, reti, skuju koku un jauktos mežos, X, H: DM, L: Avota 1996.
- C. lignatilis* (Pers.: Fr.) P. Karst. – *Notophanus lignatilis* (Pers.: Fr.) Bon – *Pleurocybella lignatilis* (Pers.: Fr.) Singer, **koksnes piltuvene**, koksnes saprotrofs, neēdama, reti, mežos, VII– X, H: DM.
- C. metachroa* (Fr.) P. Kumm. – *C. dicolor* (Pers.) Murill, **mainīgā piltuvene**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, ļoti bieži, skuju koku mežos, IX– XI, H: DM, HK.
- C. nebularis* (Batsch: Fr.) P. Kumm. – *Lepista nebularis* (Batsch: Fr.) Harmaja, **dūmainā piltuvene, aplocene, liepene**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, ēdama, ļoti bieži, skuju koku un jauktos mežos, VIII– XI, H: DM, RIG.
- \**C. nitriolens* Favre, **sārmainā piltuvene**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, skuju koku mežos, IX, H: DM, L: Avota 1996.
- \*\**C. obsoleta* (Batsch) Quél., **vienkāršā piltuvene**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, bieži, skuju koku mežos, IX– X, H: DM.
- C. odora* (Bull.: Fr.) P. Kumm., **anīsa piltuvene**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, ēdama, bieži, skuju koku un jauktos mežos, VIII– XI, H: DM, HK, RIG.
- C. paropsis* (Fr.) Quél., **agrā piltuvene**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, reti, skuju koku mežos, IV– VII, L: Urbonas et al. 1986.
- C. phyllophila* (Pers.: Fr.) P. Kumm., **lapu piltuvene**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, indīga, bieži, mežos, IX– XI, H: DM.
- C. pithyophila* (Fr.) Gillet, **skuju piltuvene**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, indīga, bieži, jauktos mežos, IX– X, H: DM, RIG.
- C. pruinosa* P. Kumm. – *C. radicellata* Gillet – *C. verna* Egeland: S. Lundell, **apsarmotā piltuvene**, humusa saprotrofs, neēdama, reti, skuju koku mežos, XI– IV, H: DM, HK.

- C. pseudoobbata* (Lange) Kuyper – *C. expallens* (Pers.: Fr.) P. Kumm., **bālejošā piltuvene**, humusa saprotrofs, ēdama, reti, mežos, VII– IX, H: DM.
- C. rivulosa* (Pers.: Fr.) P. Kumm., **pļavu piltuvene**, humusa saprotrofs, indīga, bieži, sausās pļavās, IX– XI, H: RIG.
- C. sinopica* (Fr.: Fr.) P. Kumm., **degumu piltuvene**, nedzīvās zemsedzes un humusa saprotrofs, karbotrofs, ēdama, bieži, skuju koku un jauktos mežos, IV– IX, H: DM, HK, RIG.
- C. squamulosa* (Pers.: Fr.) P. Kumm., **zvīņainā piltuvene**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, ēdama, reti, skuju koku mežos, VI– IX, H: DM.
- C. tuba* (Fr.) Gillet, **stobrveida piltuvene**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, bieži, skuju koku mežos, IX– XI, L: Urbonas et al. 1986.
- C. vermicularis* (Fr.) Quél. – *C. rizophora* Velen., **lapeglu piltuvene**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, ēdama, reti, skuju koku mežos, lapeglu stādījumos, IV– VI, L: Urbonas et al. 1986.
- C. vibecina* (Fr.) Quél. s. Bres., **svītrainā piltuvene**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, reti, skuju koku mežos, priežu mežos, X– XI, H: HK.

***Clitopilus* P. Kumm., plūmenes**

*Clitopilus prunulus* (Scop.: Fr.) P. Kumm., **zīdainā plūmene**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, mežos, VII– X, H: DM, HK.

\**Clitopilus scypoides* (Fr.) Singer, **kausiņa plūmene**, humusa saprotrofs, neēdama, reti, dārzos, parkos, V– VII, H: DM, L: Avota 1994.

\**Clitopilus scypoides* var. *intermedius* Romagn., humusa saprotrofs, neēdama, ļoti reti, jauktos mežos, VIII– IX, H: DM.

***Collybia* P. Kumm., vērdiņšēnes**

- C. acervata* (Fr.) P. Kumm., rudkāta vērdiņšēne**, nedzīvās zemsedzes un koksnes saprotofs, ēdama, bieži, skuju koku un jauktos mežos, VI–X, H: DM, HK.
- C. asema* (Fr.: Fr.) P. Kumm. – *C. butyracea* var. *asema* Fr., pelēkā vērdiņšēne**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, skuju koku un jauktos mežos, VII– XI, H: DM, HK, RIG.
- C. butyracea* (Bull.: Fr.) P. Kumm., sviesta vērdiņšēne**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, skuju koku un jauktos mežos, VII– XI, H: DM, HK.
- C. cirrhata* (I. H. Schum.) P. Kumm. – *Microcollybia cirrhata* (I. H. Schum.) Lennox, skropstainā vērdiņšēne**, mikotrofs, neēdama, ļoti bieži, mežos, VII– X, H: DM, HK, RIG.
- C. confluens* (Pers.: Fr.) P. Kumm., kopaugošā vērdiņšēne**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, neēdama, ļoti bieži, skuju koku un jauktos mežos, VII– X, H: DM, HK, RIG.
- \****C. cookei* (Bres.) J. D. Arnold – *Microcollybia cookei* (Bres.) Lennox, Kuka vērdiņšēne**, mikotrofs, nedzīvās zemsedzes saprotofs, neēdama, reti, skuju koku un jauktos mežos, VIII– X, L: Kalamees, Vimba 1985.
- C. distorta* (Fr.) Quél., savītā vērdiņšēne**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, mikorizas sēne, ēdama, reti, skuju koku mežos, priežu mežos, VIII– IX, L: Urbonas et al. 1986.
- C. dryophila* (Bull.: Fr.) P. Kumm., nobiru vērdiņšēne**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, ēdama, ļoti bieži, mežos, V– XI, H: DM, HK, RIG.
- \****C. exculta* (Fr.) Gillet, citrondzeltenā vērdiņšēne**, nedzīvās zemsedzes un humusa saprotofs, ēdama, reti, jauktos mežos, VII– VIII, H: DM, L: Avota 1994.
- \****C. extuberans* (Fr.) Quél., kuprainā vērdiņšēne**, koksnes saprotofs, neēdama, reti, skuju koku mežos, VII– X, H: DM, HK, L: Avota, Krastiņa 1994.

- \**C. fusipes* (Bull.: Fr.) Quél., **vārpstveida vērdiņšene**, koksnes saprotofs uz ozola kritām, ēdama, reti, lapu koku mežos, VII– X, H: DM, L: Lapiņš 1963.
- \**C. hariolorum* (Bull.: Fr.) Quél., **sarainā vērdiņšene**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, neēdama, reti, lapu koku un priežu mežos, VIII– IX, H: DM, L: Avota 1992.
- C. ingrata* (Schumach.: Fr.) Kühner, **stīvkāta vērdiņšene**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, neēdama, reti, skuju koku un jauktos mežos, VIII– IX, H: DM.
- \*\**C. macilenta* (Fr.) Quél., **plānā vērdiņšene**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, neēdama, reti, skuju koku mežos, VIII, H: HK.
- C. maculata* (Alb. & Schwein.: Fr.) P. Kumm., **plankumainā vērdiņšene**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, mikorizas sēne, neēdama, bieži, skuju koku un jauktos mežos, VIII– X, H: DM, HK, RIG.
- C. ocellata* (Fr.) P. Kumm., **acu vērdiņšene**, koksnes saprotofs, neēdama, reti, mežos, VII– X, H: DM.
- C. peronata* (Bolton: Fr.) P. Kumm., **zābakotā vērdiņšene**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, neēdama, ļoti bieži, skuju koku un jauktos mežos, VII– XI, H: DM, HK, RIG.
- C. prolixa* (Fr.) Gillet, **zāģzobainā vērdiņšene**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, ēdama, ļoti reti, skuju koku un jauktos mežos, VIII– IX, H: HK.
- \**C. putilla* (Fr.: Fr.) Singer, **priežu vērdiņšene**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, neēdama, bieži, priežu mežos, VIII– X, H: HK, L: Krastiņa 2000.
- C. tuberosa* (Bull.: Fr.) P. Kumm. – *Microcollybia tuberosa* (Bull.: Fr.) Lennox, **bumbuļu vērdiņšene**, mikotrofs, neēdama, ļoti bieži, mežos, VIII– X, H: DM, HK, RIG.
- C. verna* Ryman – *C. nivalis* (Luthi & Plomb) M. M. Moser, **pavasara vērdiņšene**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, neēdama, reti, lapu koku mežos, IV– V, L: Urbonas et al. 1986.

***Conocybe* Fayod, samtmicītes**

- C. ambigua*** Watling – *C. siliginea* var. *ambigua* Kühner, **neskaidrā samtmicīte**, humusa saprotrofs, neēdama, reti, pļavās, VIII– IX, H: DM.
- \****C. aporos*** Kits. v. Wav. – *Pholiotina aporos* Kits. v. Wav, **pavasara samtmicīte**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, mežos, dārzos, ceļmalās, trūdvielām bagātās augsnēs, V, H: DM, L: Avota 1994.
- \*\****C. blattaria*** (Fr.) Kühner – *Pholiotina blattaria* (Fr.) Fayod, **prusaku samtmicīte**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, ceļmalās, lapu koku mežos, VIII, H: DM.
- \*\****C. brunnea*** (Lange & Kühner) Watling, **kastaņbrūnā samtmicīte**, humusa saprotrofs, neēdama, ļoti reti, ceļmalās, jauktos mežos, IX– X, H: DM.
- \****C. cryptocystis*** (Atk.) Singer, **rūsas samtmicīte**, humusa saprotrofs, neēdama, ļoti reti, ozolu mežos, VII– VIII, H: DM, L: Avota 1994.
- \*\****C. cyanopus*** (Atk.) Kühner – *Pholiotina cyanopus* (Atk.) Singer, **zilkāta samtmicīte**, humusa saprotrofs, neēdama, ļoti reti, pļavās, zālainās vietās, VIII– IX, H: DM.
- \****C. filaris*** (Fr.) Kühner – *Pholiotina filaris* (Fr.) Kühner, **sīkā samtmicīte**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, parkos, ceļmalās, trūdvielām bagātās augsnēs, IX, H: DM, L: Avota 1996.
- C. lactea*** (Lange) Métrod., **pienbaltā samtmicīte**, humusa saprotrofs, neēdama, reti, lapu koku mežos, dārzos, parkos, ceļmalās, VI– X, H: DM, HK.
- \****C. macrocephala*** Kühner: Kühner, **lielgalvas samtmicīte**, humusa saprotrofs, neēdama, ļoti reti, mitros lapu koku mežos, VIII, H: DM, L: Avota 1994.
- \****C. pilosella*** (Pers.) Kühner, **matainā samtmicīte**, briotrofs, neēdama, bieži, mežos, VIII– IX, H: DM, L: Avota 1992.

- \**C. pseudopilosella* Kühner & Watling, **retmatiņu samtmicīte**, nedzīvās zemsedzes un humusa saprotrofs, neēdama, reti, plavās, mežos, VI–IX, H: DM, L: Avota 1994.
- C. pubescens* (Gillet) Kühner, **pūkainā samtmicīte**, koprotrofs, neēdama, reti, mežos, VII–IX, H: DM.
- \*\**C. rickeniana* Orton – *Galera teneroides* Peck. ss. Lange, **Rikena samtmicīte**, humusa saprotrofs, neēdama, ļoti reti, mežos, VIII–IX, H: DM.
- \**C. semiglobata* Kühner: Singer – *Galera tenera* (Schaeff.: Fr.) Kühner f. *convexa* Lange, **puslodes samtmicīte**, humusa saprotrofs, neēdama, bieži, ganībās, VIII–X, H: DM, L: Avota 1996.
- \**C. siennophylla* (Berk. & Broome) Singer – *C. siliginea* var. *ochracea* Kühner, **pļavas samtmicīte**, briotrofs, neēdama, bieži, mežos, VIII–X, H: DM, L: Avota 1996.
- \**C. subovalis* Kühner: Kühner & Watling – *Galera tenera* (Schaeff.: Fr.) Kühner ss. Lange, **bumbulkāta samtmicīte**, koprotrofs, humusa saprotrofs, neēdama, reti, ceļmalās, ganībās, komposta kaudzēs, V–X, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- \**C. tenera* (Schaeff.: Fr.) Fayod – *Galera tenera* (Schaeff.: Fr.) Kühner f. *tenella* Lange, **smalkā samtmicīte**, humusa saprotrofs, briotrofs, neēdama, reti, ganībās, parkos, dārzos, ceļmalās, zālainās vietās, V–X, H: DM, HK, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

#### *Coprinus* (Pers.) S. F. Gray, **tintenes**

- C. alopecia* Lasch – *C. insignis* Peck, **lapsu tintene**, koksnes saprotrofs, neēdama, reti, jauktos mežos, parkos, VII–X, L: Urbonas et al. 1986.
- C. angulatus* Peck, **meždegu tintene**, karbotrofs, neēdama, reti, degumos, VIII–X, L: Urbonas et al. 1986.
- C. atramentarius* (Bull.: Fr.) Pers., **pelēkā tintene**, humusa saprotrofs, ēdama, ļoti bieži, dārzos, parkos, V–XI, H: DM, RIG.
- C. auricomus* Pat., **zeltmatainā tintene**, humusa saprotrofs, neēdama, reti, lapu koku mežos, dārzos, VII–XI, L: Urbonas et al. 1986.

- C. cinereus* (Schaeff.: Fr.) Gray – *C. stercorarius* (Bull.)Fr. – *C. fimetarius* (L.) Fr., **pelnpelēkā tintene**, koprotrofs, humusa saprotrofs, neēdama, reti, ganībās, dārzos, VI– X, L: Urbonas et al. 1986.
- C. comatus* (F. H. Möller: Fr.) Pers., **porcelāna tintene**, humusa saprotrofs, ēdama, ļoti bieži, zālainās vietās, tīrumos, ganībās, trūdvielām bagātās augsnēs, VI– X, H: DM.
- C. disseminatus* (Pers.: Fr.) Gray, **dižbara tintene**, koksnes saprotrofs, neēdama, bieži, mežos, dārzos, V– X, H: DM, RIG.
- C. domesticus* (Bolton: Fr.) Gray, **mājas tintene**, koksnes saprotrofs, neēdama, reti, lapu koku mežos, VII– X, H: DM, RIG.
- C. dunarum* F. E. Stoll, **kāpu tintene**, humusa saprotrofs, neēdama, ļoti reti, kāpās, VI– VIII, H: DM.
- C. ephemerus* (Bull.: Fr.), **viendienas tintene**, koprotrofs, neēdama, bieži, mežos, ganībās, VII– IX, L: Urbonas et al. 1986.
- C. extinctorius* (Bull.) Fr., **izzūdošā tintene**, koksnes saprotrofs, neēdama, reti, lapu koku mežos, parkos, VI– X, H: DM.
- C. gonophyllus* Quél., **ugunskura tintene**, karbotrofs, neēdama, reti, degumos, V– X, L: Urbonas et al. 1986.
- C. hemerobius* Fr., **īslaicīgā tintene**, humusa saprotrofs, neēdama, bieži, mežos, ganībās, zālainās vietās, V– X, H: HK.
- C. impatiens* (Fr.) Quél., **spriņķu tintene**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, IX– X, L: Urbonas et al. 1986.
- \**C. lagopides* P. Karst., **zaķu tintene**, humusa saprotrofs, neēdama, bieži, degumos, IV– XI, H: DM, L: Avota 1994.
- C. lagopus* (Fr.) Fr., **zaķkājas tintene**, humusa saprotrofs, neēdama, bieži, lapu koku mežos, VII– X, H: DM.
- C. micaceus* (Bull.: Fr.) Fr., **vizuļojošā tintene**, koksnes un nedzīvās zemsedzes saprotrofs, ēdama, bieži, lapu koku mežos, V– XI, H: DM, HK, RIG.
- C. niveus* (Pers.: Fr.) Fr., **sniegbaltā tintene**, koprotrofs, neēdama, bieži, mežu klajumos, ganībās, V– XI, H: DM, RIG.

- \**C. pellucidus* P. Karst., **caurspīdīgā tintene**, koprotrofs, neēdama, ļoti reti, mežos, IX– X, H: HK, L: Krastiņa 2000.
- C. plicatilis* (Sowerby: Fr.) Fr., **krokainā tintene**, humusa saprotrofs, neēdama, bieži, ceļmalās, dārzos, zālainās vietās, VII– IX, H: DM, HK.
- \*\**C. radians* (Desm.) Fr., **atspoles tintene**, koprotrofs, neēdama, bieži, dārzos, IV– X, H: DM.
- C. silvaticus* Peck, **meža tintene**, humusa saprotrofs, neēdama, bieži, mežos, IV– X, L: Urbonas et al. 1986.
- C. stercquilinus* (Fr.) Fr., **gredzenotā tintene**, koprotrofs, neēdama, ļoti reti, mežos, pļavās, V– X, L: Urbonas et al. 1986.

#### *Cortinarius* Fr. **tīmeklenes**

- C. acutus* (Pers.: Fr.) Fr., **smailā tīmeklene**, mikorizas sēne, neēdama, bieži, skuju koku mežos, IX– X, H: DM.
- C. alboviolaceus* (Pers.: Fr.) Fr. – *Inoloma alboviolaceum* (Pers.) Fr., **baltvioletā tīmeklene**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, mežos, VIII– X, H: DM, HK.
- \*\**C. alnetorum* (Velen.) M. M. Moser, **alkšņu tīmeklene**, alkšņu mikorizas sēne, neēdama, reti, mitros alkšņu mežos, VIII– X, H: DM.
- C. amoenolens* Rob. Henry: Orton – *C. cyanopus* Fr. ss. Lange, **plūmju tīmeklene**, mikorizas sēne, neēdama, bieži, mežos, IX– X, L: Urbonas et al. 1986.
- \*\**C. anomalus* (Fr.: Fr.) Fr., **violetbrūnā tīmeklene**, mikorizas sēne, neēdama, bieži, lapu koku mežos un atklātās vietās skuju koku mežos, VIII– IX, H: HK.
- C. anthracinus* (Fr.) Fr. – *Dermocybe anthracina* (Fr.) Ricken, **tumšsarkanā tīmeklene, ādgalve**, mikorizas sēne, neēdama, bieži, lapu koku mežos, IX– X, H: DM.
- C. argentatus* (Fr.) Fr., **sudrabotā tīmeklene**, mikorizas sēne, neēdama, reti, skuju koku mežos, VIII, H: DM.

- \*\**C. argutus* Fr., **smakojošā tīmeklene**, mikorizas sēne, neēdama, ļoti reti, jauktos mežos, IX– X, H: HK.
- C. armeniacus* (Schaeff.: Fr.) Fr. – *Hygrocybe armeniaca* (Schaeff.) Fr., **aprikožu tīmeklene**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, skuju koku mežos, VIII– X, H: HK.
- C. armillatus* (Fr.: Fr.) Fr. – *Telamonia armillata* Fr., **sarkanjoslu tīmeklene**, bērzu mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, skuju koku un jauktos mežos, IX– X, H: DM, HK.
- \**C. arvinaceus* Fr., **taukainā tīmeklene**, mikorizas sēne, neēdama, bieži, auglīgos lapu koku un jauktos mežos, parkos, VII, H: DM, L: Avota 1996.
- C. azureus* Fr., **zīdainā tīmeklene**, mikorizas sēne, ēdama, reti, lapu koku mežos, VIII– X, H: DM.
- \**C. balaustinus* Fr., **granātsarkanā tīmeklene**, mikorizas sēne, neēdama, reti, lapu koku mežos, IX– X, H: DM, L: Avota 1996.
- C. balteatus* (Fr.) Fr. – *C. subbalteatus* Kühner, **apmalotā tīmeklene**, mikorizas sēne, ēdama, reti, skuju koku mežos, VIII– X, H: DM.
- \*\**C. betuletorum* (M. M. Moser) M. M. Moser, **bērzu tīmeklene**, bērzu mikorizas sēne, neēdama, reti, lapu koku un jauktos mežos, VIII– IX, H: DM.
- \*\**C. biformis* Fr. – *C. privignus* (Fr.) Fr., **divveida tīmeklene**, mikorizas sēne, neēdama, bieži, skuju koku mežos, VIII– X, H: HK.
- C. bolaris* (Pers.: Fr.) Fr. – *Inoloma bolare* (Pers.) Fr., **sarkanzvīņu tīmeklene**, mikorizas sēne, neēdama, bieži, skuju koku mežos, VIII– X, H: DM, RIG.
- C. bovinus* Fr., **vēršu tīmeklene**, mikorizas sēne, neēdama, reti, skuju koku mežos, VIII– IX, L: Urbonas et al. 1986.
- C. brunneofulvus* Fr. – *Telamonia brunneofulva* Fr., **brūndzeltenā tīmeklene**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, mitros skuju koku mežos, VII– X, H: DM.

- C. brunneus* (Pers.: Fr.) Fr. – *Telamonia brunnea* (Pers.) Fr., **brūnā tīmeklene**, mikorizas sēne, neēdama, reti, skuju koku mežos, VIII– X, H: DM.
- \**C. camphoratus* (Fr.) Fr. – *C. amethystinus* Schaeff.: Quél. – *C. hircinus* Fr., **kampara tīmeklene**, mikorizas sēne, neēdama, ļoti reti, eglu mežos, VIII– IX, H: DM, L: Avota 1996.
- C. callisteus* (Fr.: Fr.) Fr., **skaistā tīmeklene**, mikorizas sēne, neēdama, reti, skuju koku mežos, VIII– IX, L: Urbonas et al. 1986.
- \**C. caninus* (Fr.) Fr., **suņu tīmeklene**, eglu mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, eglu mežos, VIII– IX, H: DM L: Avota 1996.
- C. cinnabarinus* Fr. – *Dermocybe cinnabarina* (Rob. Henry) M. M. Moser, **cinobrsarkanā tīmeklene, ādgalve**, mikorizas sēne, neēdama, reti, skuju koku un jauktos mežos, VIII– X, L: Urbonas et al. 1986.
- C. cinnamomeobadius* Rob. Henry – *Dermocybe cinnamomeobadia* (Rob. Henry) M. M. Moser, **kastaņbrūnā tīmeklene, ādgalve**, mikorizas sēne, neēdama, bieži, skuju koku un jauktos mežos, VIII– XI, H: DM.
- C. cinnamomeus* (L.: Fr.) Fr. – *Dermocybe cinnamomea* (L.: Fr.) Wünsche, **kanēļa tīmeklene, ādgalve**, mikorizas sēne, neēdama, bieži, skuju koku un jauktos mežos, VIII– X, H: DM, HK, RIG.
- C. caerulescens* (Schaeff.) Fr. – *Phlegmacium coerulescens* (Schaeff.) Fr., **zilganā tīmeklene**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VIII– IX, H: DM.
- C. cotoneus* Fr., **vilnainā tīmeklene**, mikorizas sēne, neēdama, reti, mežos, IX– X, L: Urbonas et al. 1986.
- \**C. croceus* (Schaeff.) Bigeard & H. Guill. – *Dermocybe crocea* (Schaeff.) M. M. Moser, **safrāna tīmeklene, ādgalve**, bērzu mikorizas sēne, neēdama, bieži, skuju koku mežos (ar bērziem), purvājos, VIII– IX, H: HK, L: Krastiņa 2000.
- C. decoloratus* (Fr.) Fr., **bālējošā tīmeklene**, mikorizas sēne, neēdama, reti, lapu koku un skuju koku mežos, VII– X, H: DM.
- C. delibutus* Fr. – *Myxarium delibutum* Fr., **dzeltenā tīmeklene**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, mežos, VIII– IX, H: DM.

- \*\**C. eburneus* (Velen.) Rob. Henry – *C. emollitus* Fr. ss. Lange, **ziloņkaula tīmeklene**, mikorizas sēne, neēdama, reti, priežu mežos, VIII, H: HK.
- C. elegantior* (Fr.) Fr. – *Phlegmacium elegantius* Fr., **krāšņā tīmeklene**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, skuju koku mežos, VIII– IX, H: DM.
- C. erytrinus* (Fr.) Fr., **sārtkāta tīmeklene**, mikorizas sēne, neēdama, ļoti reti, skuju koku un jauktos mežos, V– VI, L: Urbonas et al. 1986.
- C. fulmineus* Fr. – *C. fulgens* (Fr.) Fr. ss. Lange – *Phlegmacium fulgens* (Alb. & Sw.) Fr., **spožā tīmeklene**, mikorizas sēne, ēdama, reti, skuju koku un jauktos mežos, VIII– IX, L: Pučko 1954.
- C. gentilis* (Fr.) Fr. – *Telamonia gentilis* Fr., **zeltdzeltenā tīmeklene**, mikorizas sēne, neēdama, bieži, skuju koku mežos, VIII– X, L: Urbonas et al. 1986.
- C. glandicolor* (Fr.) Fr., **melnbrūnā tīmeklene**, mikorizas sēne, neēdama, reti, skuju koku mežos, IX– X, L: Urbonas et al. 1986.
- C. glaucopus* (Schaeff.: Fr.) Fr., **rindas tīmeklene**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, skuju koku un jauktos mežos, VIII– IX, H: HK.
- C. helvolus* (Bull.) Fr., **iedzeltenā tīmeklene**, mikorizas sēne, neēdama, bieži, skuju koku mežos, VIII– X, L: Urbonas et al. 1986.
- C. hemitrichus* (Pers.: Fr.) Fr., **pārslu tīmeklene**, mikorizas sēne, neēdama, bieži, skuju koku un jauktos mežos, VIII– X, H: DM.
- \**C. hercynicus* (Pers.) M. M. Moser, **tumšvioletā tīmeklene**, mikorizas sēne, ēdama, reti, skuju koku mežos, VIII– IX, H: DM, L: Štolls, akvareļi 1913-1939.
- C. hinulleus* Fr., **briežu tīmeklene**, mikorizas sēne, ēdama, reti, lapu koku mežos, V– XI, H: DM, RIG.
- \**C. huronensis* Ammirati & A. H. Sm. – *Dermocybe palustris* (M. M. Moser) M. M. Moser, **purvū tīmeklene, ādgalve**, mikorizas sēne, neēdama, bieži, mitros mežos, purvos, VIII– X, H: DM, L: Avota 1994.
- C. infractus* (Pers.: Fr.) Fr. – *Phlegmacium infractum* (Pers.) Fr., **ielauztā tīmeklene**, mikorizas sēne, neēdama, bieži, mežos, IX– X, H: DM.

- \**C. leucopus* (Bull.: Fr.) Fr., **balkāta tīmeklene**, mikorizas sēne, neēdama, reti, skuju koku mežos, IX, H: DM, L: Avota 1994.
- C. lividoochraceus* (Berk.) Berk. – *C. elatior* Fr. – *Myxarium elatius* Fr., **augstā tīmeklene**, mikorizas sēne, ēdama, reti, mitros un applūstošos mežos, VIII– X, L: Urbonas et al. 1986.
- \**C. malachius* (Fr.) Fr. – *C. umidicola* (Kauffm.) Rob. Henry ss. M. M. Moser, **bumbuļu tīmeklene**, mikorizas sēne, neēdama, reti, skuju koku un jauktos mežos, VIII– IX, H: DM, HK, L: Štolls, akvareļi 1913-1939.
- C. malicorius* Fr. – *Dermocybe malicoria* (Fr.) Ricken, **oranžā tīmeklene, ādgalve**, mikorizas sēne, neēdama, reti, mitros jauktos mežos, VIII, L: Urbonas et al. 1986.
- C. mucifluus* Fr., **rievainā tīmeklene**, mikorizas sēne, ēdama, reti, skuju koku mežos, VII– IX, L: Urbonas et al. 1986.
- C. mucosus* (Bull.: Fr.) Kickx – *Myxarium mucosum* (Bull.) Fr., **sila tīmeklene**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, skuju koku mežos, VIII– X, H: DM.
- C. multiformis* (Fr.) Fr. – *C. allutus* Fr. – *Phlegmacium multiforme* Fr., **daudzveida tīmeklene**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, mežos, IX– X, H: HK.
- C. muscigenus* Peck – *C. collinitus* (Sow.: Fr.) Fr. ss. Lange – *Myxarium collinitum* (Fr.) Sow., **pavalku tīmeklene**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, skuju koku un jauktos mežos, VIII– IX, H: DM, HK.
- C. nemorensis* (Fr.) Lange – *C. largus* Fr. – *Phlegmacium largum* (Buxbaum) Fr., **birztalas tīmeklene**, mikorizas sēne, ēdama, reti, lapu koku mežos, VIII– X, H: DM.
- C. olidus* Lange – *C. cephalixus* Fr., **graudainā tīmeklene**, mikorizas sēne, neēdama, bieži, jauktos un lapu koku mežos, X– XI, L: Urbonas et al. 1986.
- \**C. orellanoides* Rob. Henry – *C. speciosissimus* Kühner & Romagn., **sarkanbrūnā tīmeklene**, mikorizas sēne, indīga, ļoti reti, mitros eglu mežos, VIII– X, H: DM, HK, L: Avota 1994.

- \**C. paleaceus* Fr. – *C. flexipes* (Pers.: Fr.) Fr. ss. Lange, **bālā tīmeklene**, mikorizas sēne, neēdama, bieži, skuju koku un jauktos mežos, IX– X, H: DM, L: Avota 1996.
- \**C. paragaudis* Fr., **apmalotā tīmeklene**, mikorizas sēne, neēdama, ļoti reti, skuju koku mežos, IX– X, H: DM, L: Avota 1994.
- C. phoeniceus* Maire – *Dermocybe phoenicea* (Bull.) M. M. Moser, **purpursarkanā tīmeklene, ādgalve**, mikorizas sēne, neēdama, bieži, priežu mežos, VII– X, L: Urbonas et al. 1986.
- C. pholideus* (Fr.: Fr.) Fr., **zvīņainā tīmeklene**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, jauktos mežos, VII– X, H: DM, HK.
- C. raphanoides* (Pers.: Fr.) Fr., **rutku tīmeklene**, mikorizas sēne, neēdama, reti, skuju koku mežos, upmalās, ceļmalās, VIII– X, L: Urbonas et al. 1986.
- \**C. rigidus* (Fr.) Fr. – *C. umbriolens* Orton – *Telamonia rigida* (Scop.) Fr., **stingrā tīmeklene**, mikorizas sēne, neēdama, bieži, jauktos mežos, VII– X, H: DM, HK, L: Avota 1994.
- C. rufoolivaceus* (Pers.: Fr.) Fr., **brūnsarkanā tīmeklene**, mikorizas sēne, ēdama, reti, lapu koku mežos, IX– X, L: Urbonas et al. 1986.
- C. saginus* (Fr.) Fr. – *C. validus* Favre, **tuklā tīmeklene**, mikorizas sēne, neēdama, reti, jauktos mežos, VIII– X, L: Urbonas et al. 1986.
- C. sanguineus* (Fr.) Gillet – *Dermocybe sanguinea* (Wulfen: Fr.) Wünsche, **asinssarkanā tīmeklene, ādgalve**, mikorizas sēne, neēdama, ļoti bieži, skuju koku un jauktos mežos, VII– X, H: DM, HK, RIG.
- C. saniosus* (Fr.) Fr., **oranždzeltenā tīmeklene**, mikorizas sēne, neēdama, reti, mežos, VIII– X, H: DM, RIG.
- \*\**C. scaurus* Fr. – *C. herpeticus* Fr. – *Phlegmacium scaurum* Fr., **sūnekļu tīmeklene**, mikorizas sēne, neēdama, ļoti reti, mitros jauktos mežos, VIII– X, H: HK.
- C. scutulatus* (Fr.) Fr., **mārrutku tīmeklene**, mikorizas sēne, neēdama, reti, jauktos mežos, IX– X, L: Urbonas et al. 1986.
- C. sebaceus* Fr. – *C. variegatus* Bres., **raibā tīmeklene**, mikorizas sēne, neēdama, reti, skuju koku mežos, VIII– IX, L: Urbonas et al. 1986.

- C. semisanguineus* (Fr.) Gillet – *Dermocybe semisanguinea* (Fr.) M. M. Moser, **sarkanlapīnu tīmeklene, ādgalve**, mikorizas sēne, neēdama, ļoti bieži, priežu mežos, VII– X, H: DM, HK.
- C. stillatitius* Fr. – *C. pseudosalor* Lange ss. M. M. Moser, **lāsumainā tīmeklene**, mikorizas sēne, neēdama, reti, mežos, VII– IX, L: Urbonas et al. 1986.
- C. tofaceus* (Fr.) Fr. – *Inoloma tophaceum* Fr., **dzeltenbrūnā tīmeklene**, mikorizas sēne, ēdama, reti, lapu koku mežos, VIII– X, L: Urbonas et al. 1986.
- C. torvus* (Fr.: Fr.) Fr. – *Telamonia torva* Fr., **saldsmaržas tīmeklene**, mikorizas sēne, neēdama, reti, lapu koku mežos, VIII– X, H: DM.
- C. traganus* (Fr.: Fr.) Fr. – *Inoloma traganum* Fr., **āžu tīmeklene**, mikorizas sēne, indīga, bieži, skuju koku mežos, VII– X, H: DM.
- C. triumphans* (Fr.) Fr. – *C. crocolitus* Quél. – *Phlegmacium triumphans* Fr., **gleznā tīmeklene**, mikorizas sēne, ēdama, reti, jauktos mežos, VIII– X H: DM.
- C. trivialis* Lange, **parastā tīmeklene**, mikorizas sēne, neēdama, reti, lapu koku mežos, IX– X, H: DM.
- C. tubarius* Ammirati & Singer – *D. sphagneti* (Orton) M. M. Moser, **sfagnu tīmeklene, ādgalve**, mikorizas sēne, neēdama, reti, sūnu purvos, IX, H: DM.
- \**C. uliginosus* Berk. – *Dermocybe uliginosa* (Berk.) M. M. Moser, **dūksnāju tīmeklene, ādgalve**, mikorizas sēne, neēdama, reti, mitros lapu koku mežos, VII– X, H: DM, L: Avota, Krastiņa 1994.
- C. uraceus* Fr. – *Hygrocybe uracea* Fr., **olīvbrūnā tīmeklene**, mikorizas sēne, neēdama, bieži, skuju koku mežos, VIII– X, L: Urbonas et al. 1986.
- C. variecolor* (Pers.: Fr.) Fr. – *Phlegmacium variicolor* Fr., **daudzkrāsainā tīmeklene**, mikorizas sēne, neēdama, reti, skuju koku mežos, VIII– X, H: DM.
- C. varius* (Schaeff.: Fr.) Fr., **kieģeldzeltenā tīmeklene**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, skuju koku mežos, VII– X, L: Urbonas et al. 1986.

- C. venetus* (Fr.) Fr., **zaļganā tīmeklene**, mikorizas sēne, neēdama, reti, skuju koku un jauktos mežos, VIII– X, L: Urbonas et al. 1986.
- C. vibratilis* (Fr.) Fr. – *Myxarium vibratile* Fr., **rūgtā tīmeklene**, mikorizas sēne, neēdama, bieži, skuju koku un jauktos mežos, VIII– X, H: DM, HK.
- C. violaceus* (L.: Fr.) Gray – *Inoloma violaceum* (L.) Fr., **violetā tīmeklene**, mikorizas sēne, ēdama, reti, lapu koku mežos, VIII– X, H: DM, HK, RIG.

***Crepidotus* (Fr.) P. Kumm., sēdenes**

- C. appianatus* (Pers.) P. Kumm., **plakanā sēdene**, koksnes saprotrofs, ēdama, ļoti bieži, lapu koku mežos, VIII– X, H: DM, HK.
- \**C. calolepis* Fr. – *C. mollis* var. *calolepis* (Fr.) P. Karst., **skaistgalvenu sēdene**, koksnes saprotrofs uz apses kritalām, neēdama, bieži, lapu koku mežos, VIII– X, H: DM, RIG, L: Kalamees, Vimba 1985.
- \**C. cesatii* (Rabenh.) Sacc., **Cezata sēdene**, koksnes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VIII– IX, H: DM, L: Avota 1994.
- \**C. crocophyllus* (Berk.) Sacc., **krašņā sēdene**, koksnes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VIII, H: DM, L: Avota 1996.
- \*\**C. dishonestus* P. Karst. – *C. lundellii* Pilát, **novārta sēdene**, koksnes saprotrofs, neēdama, bieži, lapu koku mežos, VIII– IX, H: DM.
- C. mollis* (Schaeff.: Fr.) Staude, **mīkstā sēdene**, koksnes saprotrofs, neēdama, ļoti bieži, lapu koku mežos, VII– X, H: DM, HK, RIG.
- C. variabilis* (Pers.: Fr.) P. Kumm., **mainīgā sēdene**, koksnes saprotrofs, neēdama, bieži, lapu koku mežos, VI– XI, H: DM.
- \**C. versutus* (Peck) Sacc. – *C. pubescens* Bres., **pūkainā sēdene**, koksnes saprotrofs, neēdama, bieži, lapu koku mežos, VIII– X, H: DM, HK, L: Avota 1994.

***Crinipellis* Pat., krinipelas**

- \**Crinipellis scabella* (Alb. & Schwein.: Fr.) Murill – *C. stipitaria* (Fr.) Pat., **tiekvāta krinipela**, herbotrofs, neēdama, bieži, uz graudzāļu atliekām,

sausās pļavās, kāpās, IX– X, H: HK, RIG, L: Kalamees, Vimba 1985.

***Cystoderma* Fayod, graudcepurītes**

*C. amianthinum* (Scop.) Fayod – *Lepiota amianthina* (Scop.) Fr., **dzeltenā  
graudcepurīte**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, ēdama, ļoti bieži,  
skuju koku mežos, VIII– XI, H: DM, HK, RIG.

*C. carcharias* (Pers.) Fayod – *Lepiota carcharias* (Pers.) Fr., **smakojošā  
graudcepurīte**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, ēdama, bieži, skuju  
koku un jauktos mežos, IX– XI, H: DM, HK, RIG.

*C. granulosum* (Batsch: Fr.) Fayod, **rūsas graudcepurīte**, nedzīvās  
zemsedzes saprotofs, ēdama, reti, skuju koku un jauktos mežos,  
VIII– XI, H: DM, HK, RIG.

*C. terrei* (Berk. & Broome) Harmaja – *C. cinnabarinum* (Alb. & Schwein.)  
Fayod – *Lepiota cinnabarina* (Alb. & Schw.) P. Karst.,  
**cinobrsarkanā graudcepurīte**, nedzīvās zemsedzes saprotofs,  
ēdama, reti, skuju koku un jauktos mežos, VII– X, H: DM.

***Cystolepiota* Singer, graudsardzenes**

\**C. seminuda* (Lasch) Bon – *C. sistrata* (Fr.) Singer., **puskailā  
graudsardzene**, humusa saprotofs, neēdama, ļoti bieži, mežos,  
ceļmalās, krūmājos, VII– X, H: DM, HK, L: Kalamees, Vimba 1985.

***Delicatula* Fayod, greznulītes**

*Delicatula integrella* (Pers.: Fr.) Fayod, **baltā greznulīte**, koksnes  
saprotofs, neēdama, bieži, skuju koku un jauktos mežos, V– X, H:  
DM, HK.

***Entoloma* (Fr.) P. Kumm., sārtlapītes**

*E. aprile* (Britzelm.) Sacc. – *Rhodophyllus aprilis* (Britzelm.) Romagn.,  
**aprīļa sārtlapīte**, mikorizas sēne, ēdama, reti, lapu koku un jauktos  
mežos, V, H: DM.

- \**E. araneosum* (Quél.) M. M. Moser, **pelēkā sārtlapīte**, mikorizas sēne, neēdama, reti, lapu koku mežos, parkos, VIII– X, H: DM L: Avota 1996
- \*\**E. cetratum* (Fr.: Fr.) M. M. Moser – *Rhodophyllus cetratus* (Fr.: Fr.) Quél., **meduskrāsas sārtlapīte**, nedzīvās zemsedzes un humusa saprotofs, neēdama, ļoti bieži, skuju koku mežos, parkos, dārzos, IX– XI, H: DM, HK.
- E. chalybaeum* (Fr.: Fr.) Noordel. – *Rhodophyllus lazulinus* (Fr.) Quél., **zilmelnā sārtlapīte**, humusa saprotofs, neēdama, bieži, ceļmalās, dārzos, parkos, zālainās vietās, VI– X, H: RIG.
- E. clypeatum* (L.: Fr.) P. Kumm. – *Rhodophyllus clypeatus* (L.) Quél., **vairoga sārtlapīte**, mikorizas sēne, ēdama, reti, lapu koku mežos, zālainās vietās, VI– IX, H: DM, RIG.
- E. conferendum* (Britzelm.) Noordel. – *E. staurosorum* (Bres.) E Horak. – *Rhodophyllus staurosorus* (Bres.) Lange, **krustsporu sārtlapīte**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, neēdama, ļoti bieži, skuju koku un jauktos mežos, skābās augsnēs, VII– IX, H: DM, HK.
- E. cuneatum* (Bres.) M. M. Moser, **ķīlveida sārtlapīte**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, neēdama, bieži, plavās, zālainās vietās, parkos, VIII– X, L: Urbonas et al. 1986.
- E. elodes* (Fr.) P. Kumm. – *E. helodes* (Fr.) P. Kumm. – *Rhodophyllus elodes* (Fr.) Romagn., **sfagnu sārtlapīte**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, neēdama, reti, sūnu purvos, VIII– X, L: Urbonas et al. 1986.
- E. euchroum* (Pers.: Fr.) Donk – *Leptonia euchroa* Fr., **violetā sārtlapīte**, koksnes saprotofs, neēdama, reti, lapu koku mežos, IX– X, H: DM.
- \**E. exile* (Fr.: Fr.) Hesler, **sīksīkā sārtlapīte**, humusa saprotofs, neēdama, ļoti reti, dārzos, ganībās, VIII, H: DM, L: Avota 1996.
- E. griseorubidum* Noordel. – *E. griseorubellus* (Lasch) Quél. ss. Konrad & MaUBL. – *Eccilia griseorubella* (Lasch) Fr., **pelēksārtā sārtlapīte**, humusa saprotofs, neēdama, reti, izcirtumos, VIII– IX, L: Urbonas et al. 1986.

- \**E. incanum* (Fr.: Fr.) Hesler – *Rhodophyllus euchlorus* (Lasch) Quél., **zalbrūnā sārtlapīte**, nedzīvās zemsedzes un humusa saprotrofs, neēdama, ļoti reti, mežos, pļavās, zālainās vietās, VIII– IX, H: DM, L: Avota 1996.
- \**E. incarnatofuscescens* (Britzelm.) Noordel. – *E. leptonipes* Kühner & Romagn., **brūnvioletā sārtlapīte**, humusa saprotrofs, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, parkos, VI, H: DM, L: Avota 1996.
- E. lampropus* (Fr.: Fr.) Hesler – *Rhodophyllus lampropus* (Fr.: Fr.) Quél., **spožkāta sārtlapīte**, humusa saprotrofs, neēdama, reti, dārzos, tīrumos, VII– X, H: DM.
- E. mammosum* (L.) Hesler – *Rhodophyllus mammosus* (Fr.) Quél., **trāna sārtlapīte**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, skuju koku un jauktos mežos, VII– X, H: DM, RIG.
- \**E. minutum* (P. Karst.) Noordel., **sīkā sārtlapīte**, humusa saprotrofs, neēdama, reti, lapu koku mežos, parkos, VIII, H: DM, L: Avota 1996.
- E. nidorosum* (Fr.) Quél. – *Rhodophyllus nidorosus* (Fr.) Quél., **smirdošā sārtlapīte**, humusa un nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, ļoti bieži, mitros lapu koku un jauktos mežos, VIII– X, H: DM.
- E. nigrellum* (Quél.) Noordel., **melnganā sārtlapīte**, humusa saprotrofs, neēdama, reti, zālainās vietās, pļavās, VII– VIII, H: DM.
- \**E. nitidum* (Quél.) Quél. – *Rhodophyllus nitidus* (Quél.) Quél., **tēraudspožā sārtlapīte**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, reti, skuju koku un jauktos mežos, VII– XI, H: DM, HK, L: Štolls, akvareļi 1913-1939.
- \**E. platyphylloides* (Romagn.) Largent, **platlapīnu sārtlapīte**, humusa saprotrofs, neēdama, reti, lapu koku mežos, VIII– IX, H: DM, L: Avota 1993.
- E. pleopodium* (Bull.: D. C.: Fr.) Noordel. – *E. icterinum* (Fr.: Fr.) M. M. Moser – *Rhodophyllus icterinus* (Fr.: Fr.) Quél., **iedzeltenā sārtlapīte**, humusa saprotrofs, neēdama, reti, mežos, dārzos, parkos, zālainās vietās, VIII– X, H: DM.

- \**E. rhodoclylix* (Lasch: Fr.) M. M. Moser, **alkšņu sārtlapīte**, humusa saprotofs, koksnes saprotofs, neēdama, reti, lapu koku un jauktos mežos, zālainās vietās, VIII– IX, H: DM, L: Avota 1996.
- E. rhodopolium* (Fr.) P. Kumm. – *Rhodophyllum rhodopolius* (Fr.) Quél., **ieliekta sārtlapīte**, mikorizas sēne, neēdama, ļoti bieži, lapu koku un jauktos mežos, VIII– X, H: DM.
- E. rusticoides* (Gillet) Noordel. – *Eccilia rusticoides* Gill., **brūnā sārtlapīte**, humusa saprotofs, neēdama, reti, sausos jauktos mežos, VII– X, H: DM.
- E. sarcitulum* (Orton) Arnolds, **zvīnainā sārtlapīte**, humusa saprotofs, neēdama, reti, ganībās, VIII– IX, H: DM.
- E. sepium* (Noulet & Dass.) Richon & Roze, **sēpijas sārtlapīte**, humusa saprotofs, neēdama, ļoti reti, mežos, VI, H: RIG.
- E. sericatum* (Britzelm.) Sacc., **sūnekļa sārtlapīte**, humusa saprotofs, neēdama, reti, parkos, IX, H: DM.
- \**E. sericellum* (Fr.) P. Kumm.– *Rhodophyllum sericellus* (Fr.: Fr.) Quél., **baltā sārtlapīte**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, neēdama, ļoti reti, pļavās, mežmalās, zālainās vietās, VIII– IX, H: DM, L: Avota 1996.
- \**E. sericeum* (Bull.) Quél. – *Rhodophyllum sericeus* (Quél.) Quél., **zīdainā sārtlapīte**, humusa un nedzīvās zemsedzes saprotofs, indīga, bieži, dārzos, tīrumos, ganībās, pļavās, V– X, H: DM, L: Štolls, akvareļi 1913-1939.
- E. serrulatum* (Fr.: Fr.) Hesler – *Rhodophyllum serrulatus* (Fr.: Fr.) Quél. – *Leptonia serrulata* (Pers.) Fr., **zāgzobainā sārtlapīte**, humusa un nedzīvās zemsedzes saprotofs, neēdama, bieži, lapu koku mežos, nabadzīgās augsnēs, VI– X, L: Urbonas et al. 1986.
- E. sinuatum* (Bull.: Fr.) P. Kumm. – *E. lividum* (Bull.) Quél. ss. Quél. – *Rhodophyllum sinuatus* (Bull.: Fr.) Quél., **milzu sārtlapīte**, mikorizas sēne, indīga, reti, lapu koku un jauktos mežos, V– IX, H: RIG.
- \**E. sodale* Kühner: Noordel., **sīkzīnu sārtlapīte**, humusa saprotofs, neēdama, reti, ganībās, pļavās, IX, H: DM, L: Avota 1996.

- \**E. sordidulum* (Kühner & Romagn.) Orton, **netīrā sārtlapīte**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, parkos, VIII, H: DM, L: Avota 1996.
- \**E. turbidum* (Fr.) Quél., **ripas sārtlapīte**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, bieži, mitros skuju koku mežos, skābās augsnēs, VIII, H: DM, HK, L: Avota 1994.
- \*\**E. undatum* (Fr.) M. M. Moser – *Eccilia sericeonitida* Orton – *Rhodophyllus sericeonitidus* Orton, **vilnainā sārtlapīte**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, bieži, jauktos mežos, skābās augsnēs, VI– X, H: DM, HK.
- E. vernum* S. Lundell – *Rhodophyllus cucullatus* Favre, **pavasara sārtlapīte**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, indīga, bieži, priežu mežos, IV– IX, H: DM, RIG.

#### *Fayodia* Kühner, fajodijas

- F. maura* (Fr.) Singer – *Myxomphalia maura* (Fr.) Hora, **ogļu fajodija, miksomfālija**, karbotrofs, neēdama, jauktos mežos, izcirtumos, degumos, VIII– X, H: DM, HK, RIG.

#### *Flammulaster* Earle, liesmenītes

- \**F. gracilis* (Quél.) Watling – *F. wieslandri* (Fr.) M. M. Moser, **slaidā liesmenīte**, koksnes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VIII– IX, H: DM, L: Avota 1996.
- \**F. limulatus* (Fr.) Watling ss. Orton, **dūkstu liesmenīte**, koksnes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VII– VIII, H: DM, L: Avota 1996.
- \**F. muricatus* (Fr.: Fr.) Watling, **mūru liesmenīte**, koksnes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, ozolu mežos, VIII, H: DM, L: Avota 1996.

#### *Flammulina* P. Karst., ziemenes

- \**F. fennae* Bas, **baltā ziemene**, koksnes saprotrofs, ēdama, reti, lapu koku mežos, VII– IX, H: DM, HK, L: Avota 1996a.

**F. *velutipes*** (Curt.: Fr.) Singer – *Collybia velutipes* (Curt.: Fr.) Kumm., **samtkāta ziemene, ziemas celmene**, koksnes saprotrofs, ēdama, ļoti bieži, lapu koku mežos, VIII– XII, H: DM, RIG.

**Galerina Earle, ķiverenes**

\*\***G. *camerina*** (Fr.) Kühner, **velves ķiverene**, koksnes saprotrofs, neēdama, bieži, priežu mežos, IX– X, H: DM, HK.

\*\***G. *clavata*** (Velen.) Kühner – *G. heterocystis* (Atk.) Sm. & Singer, **vālīšu ķiverene**, briotrofs, neēdama, ļoti reti, jauktos mežos, plavās, VII– VIII, H: DM.

\*\***G. *cuspidata*** A. H. Sm., **smailā ķiverene**, briotrofs, neēdama, ļoti reti, plavās, X, H: DM.

\*\***G. *embolus*** (Fr.) Orton, **kāpu ķiverene**, briotrofs, neēdama, reti, kāpās, IX– X, H: HK.

\*\***G. *gibbosa*** Favre, **kuprainā ķiverene**, briotrofs, neēdama, ļoti reti, mežos, IX– X, H: HK.

**G. *hypnorum*** (Schrank.: Fr.) Kühner ss. lat. – *Galera hypnorum* (Schrank.) Fr., **zaļšūnu ķiverene**, briotrofs, neēdama, ļoti bieži, mežos, VI– XI, H: DM, HK.

**G. *marginata*** (Batsch) Kühner, **apmalotā ķiverene**, koksnes saprotrofs, indīga, ļoti bieži, skuju koku mežos, VIII– XI, H: DM, HK, RIG.

**G. *mniophila*** (Lasch) Kühner ss. lat. – *Galera mniophila* (Lasch) Fr., **sūnu ķiverene**, briotrofs, neēdama, bieži, mežos, VIII– XI, H: DM, HK.

\*\***G. *mycenoides*** (Fr.) Kühner – *G. jaapii* Smith & Singer, **sēntīņu ķiverene**, briotrofs, herbotrofs, neēdama, bieži, priežu mežos, IX– X, H: DM.

\*\***G. *nana*** (Petri) Kühner, **pundura ķiverene**, koksnes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, dārzos, parkos, IX, H: DM.

\***G. *nybergii*** A. H. Sm., **Nīberga ķiverene**, briotrofs, neēdama, ļoti reti, jauktos mežos, VIII, H: DM, L: Avota 1996.

\*\***G. *pallida*** (Pilát) Horak & M. M. Moser, **bālā ķiverene**, briotrofs, neēdama, bieži, priežu mežos, IX– X, H: HK.

- \**G. paludosa* (Fr.) Kühner, **purva ķiverene**, briotrofs, neēdama, ļoti bieži, mežos, VI– X, H: DM, HK, L: Avota 1996.
- \**G. pumila* (Pers.: Fr.) M. Lange: Singer – *G. mycenopsis* (Fr.) Kühner ss. Kühner, **zemā ķiverene**, briotrofs, neēdama, bieži, mežos, parkos, IX– XI, H: HK, L: Štolls, akvareļi 1913-1939.
- \**G. salicicola* Orton, **vītolu ķiverene**, koksnes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, jauktos mežos, VIII, H: DM, L: Avota 1994.
- \*\**G. sideroides* (Bull.) Kühner, **glotainā ķiverene**, koksnes saprotrofs, neēdama, bieži, priežu mežos, IX– XI, H: DM.
- G. sphagnorum* (Pers.: Fr.) Kühner, **sfagnu ķiverene**, briotrofs, neēdama, reti, mežos, purvos, IX– X, H: DM, HK.
- \*\**G. terrestris* Wells & Kempton, **zemes ķiverene**, briotrofs, neēdama, mitros mežos, purvos, IX– X, H: HK.
- \**G. tibiicystis* (Atk.) Kühner, **galvainā ķiverene**, briotrofs, neēdama, reti, mežos, VIII– IX, H: DM, L: Avota 1994.
- \**G. triscopa* (Fr.) Kühner, **stumbru ķiverene**, koksnes saprotrofs, neēdama, ļoti bieži, mežos, VIII– X, H: DM, HK, L: Avota 1995a.
- \*\**G. uncialis* (Britzelm.) Kühner, **hipnu ķiverene**, briotrofs, koksnes saprotrofs, neēdama, reti, mežos, VIII– IX, H: DM.
- \**G. unicolor* (Vahl.: Fr.) Singer, **vienkrāsas ķiverene**, koksnes un nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, reti, lapu koku mežos, IX– X, H: DM, HK, L: Štolls, akvareļi 1913-1939.

#### *Gerronema* Singer, geronēmas

- \**G. postii* (Fr.) Singer – *Omphalina postii* (Fr.) Singer, **Posta geronēma**, briotrofs, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, karbotrofs, neēdama, bieži, mitros mežos, parkos, V– X, H: DM, L: Štolls, akvareļi 1913-1939.
- \*\**G. prescotii* (Weinm.) Redhead – *G. albidum* (Fr.) Singer ss. auct., **Preskota geronēma**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, priežu mežos, IX, H: HK.

***Gomphidius* Fr., zeltkātes**

*G. glutinosus* (Schaeff.: Fr.) Fr., **eglaines zeltkāte**, egļu mikorizas sēne, ēdama, bieži, skuju koku un jauktos mežos, VII– X, H: DM, HK.

*G. roseus* (Fr.) Fr., **rožsārtā zeltkāte**, priežu mikorizas sēne, ēdama, bieži, priežu mežos, skābās augsnēs, VII– X, H: DM.

***Gymnopilus* P. Karst., liesmenes**

\**G. decipiens* (A. H. Sm.) Orton, **mānīgā liesmene**, karbotrofs, neēdama, reti, degumos, VIII– IX, H: DM, L: Avota 1996.

\*\**G. fulgens* (Favre & Maire) Singer, **sfagnu liesmene**, briotrofs, neēdama, ļoti reti, jauktos mežos, VII– VIII, H: DM.

\**G. hybridus* (Sw.: Fr.) Maire, **bastarda liesmene**, koksnes saprotrofs, neēdama, reti, mežos, VIII– X, H: DM, HK, L: Štolls, akvareļi 1913– 1939.

*G. penetrans* (Fr.: Fr.) Murill, **raiblapiņu liesmene**, koksnes saprotrofs, neēdama, ļoti bieži, mežos, VI– X, H: DM, HK, RIG.

\**G. picreus* (Pers.: Fr.) P. Karst., **tumšbrūnā liesmene**, koksnes saprotrofs, neēdama, bieži, skuju koku mežos, IX, H: DM, HK, L: Avota 1996.

*G. sapineus* (Fr.: Fr.) Maire, **skujkoku liesmene**, koksnes saprotrofs, neēdama, bieži, skuju koku mežos, VIII– IX, H: DM.

*G. spectabilis* (Weinm.: Fr.) A. H. Sm. – *G. junonius* (Fr.) Orton, **ievērojamā liesmene**, koksnes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VIII– X, H: DM.

***Gyrodon* Opat., zobiņbekas**

*G. lividus* (Bull.: Fr.) Sacc., **alkšņu zobiņbeka**, alkšņu mikorizas sēne, ēdama, bieži, mitros alkšņu mežos, VII– X, H: DM.

***Gyroporus* Quél., smilšbekas**

*G. castaneus* (Bull.: Fr.) Quél. – *Suillus castaneus* (Bull.) P. Karst., **kastaņu smilšbeka**, mikorizas sēne, ēdama, reti, skuju koku un jauktos mežos, VII– IX, H: DM.

**G. cyanescens** (Bull.: Fr.) Quél. – *Suillus cyanescens* (Bull.) P. Karst., **rudzupuķu smilšbeka**, mikorizas sēne, ēdama, reti, priežu mežos, jauktos mežos, VII– X, H: DM.

**Hebeloma** P. Kumm., **bārkstmales**

**H. claviceps** (Fr.) Wünsche, **resnkāta bārkstmale**, mikorizas sēne, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, IX– XI, L: Urbonas et al. 1986.

**H. crustuliniforme** (Bull.) Quél., **parastā bārkstmale**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, mežos, mežmalās, parkos, skābās augsnēs, VIII– IX, H: DM, HK.

\***H. cylindrosporum** Romagn., **cilindrsporu bārkstmale**, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, IX, H: DM, L: Avota 1996.

\***H. dunense** L. Corb. & R. Heim, **kāpu bārkstmale**, mikorizas sēne, neēdama, reti, kāpās, smilšainās augsnēs, V– X, H: DM, RIG, L: Kalamees, Vimba 1985.

**H. fastibile** (Pers.: Fr.) P. Kumm., **asarojošā bārkstmale**, mikorizas sēne, neēdama, ļoti reti, skuju koku mežos, smilšainās augsnēs, VI– IX, L: Urbonas et al. 1986.

**H. firmum** (Pers.) Quél., **cietā bārkstmale**, mikorizas sēne, neēdama, ļoti reti, jauktos un skuju koku mežos, VII– X, L: Urbonas et al. 1986.

\***H. helodes** Favre, **purva bārkstmale**, mikorizas sēne, neēdama, ļoti reti, mitros mežos, parkos, VII, H: DM, HK, L: Avota 1994.

\***H. hiemale** Bres., **ziemas bārkstmale**, mikorizas sēne, neēdama, reti, lapu koku mežos, VII– VIII, H: DM, L: Avota 1996.

\*\***H. leucosarx** Orton, **vītolu bārkstmale**, mikorizas sēne, neēdama, ļoti reti, mitros lapu koku mežos, IX, H: DM, HK.

\***H. longicaudum** (Pers.: Fr.) P. Kumm., **garkāta bārkstmale**, mikorizas sēne, neēdama, reti, mitros mežos, zālainās vietās, VIII– XI, H: DM, HK, L: Avota 1996.

**H. mesophaeum** (Pers.) Quél., **brūnvidus bārkstmale**, bērzu mikorizas sēne, neēdama, ļoti bieži, mežos, IX– XI, H: DM, HK, RIG.

*H. mesophaeum* var. *strophosum* (Fr.) Quadraccia –

*H. strophosum* (Fr.) Sacc., mikorizas sēne, neēdama, ļoti reti, skuju koku mežos, IX– XI, L: Urbonas et al. 1986.

\**H. pallidum* Malençon, **bālā bārkstmale**, mikorizas sēne, neēdama, ļoti reti, egļu mežos, IX, H: DM, L: Avota 1996.

\*\**H. psammophilum* Bon, **smiltāju bārkstmale**, mikorizas sēne, neēdama, ļoti reti, kāpās, VIII, H: HK.

\**H. pumilum* Lange, **pundura bārkstmale**, mikorizas sēne, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VII– X, H: DM, L: Avota 1996.

\*\**H. pusillum* Lange, **sīkā bārkstmale**, mikorizas sēne, neēdama, ļoti reti, priežu mežos, purvos, IX– X, H: HK.

*H. radicosum* (Bull.: Fr.) Ricken, **sakņkāta bārkstmale**, koksnes saprotofs, neēdama, reti, lapu koku mežos, VII– X, H: DM.

*H. sacchariolens* Quél., **saldsmaržīgā bārkstmale**, mikorizas sēne, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, zālainās vietās, skābās augsnēs, IX– X, H: DM.

*H. sinapizans* (Paulet) Gillet, **sinepju bārkstmale**, mikorizas sēne, neēdama, bieži, mežos, VIII– X, H: DM, HK, RIG.

\*\**H. truncatum* (Fr.) P. Kumm., **nošķeltā bārkstmale**, mikorizas sēne, neēdama, reti, priežu mežos, VIII– IX, H: DM.

\**H. versipelle* (Fr.) Quél., **rūsganā bārkstmale**, mikorizas sēne, neēdama, bieži, priežu mežos, IX– X, H: DM, L: Avota 1994.

#### *Hemimycena* (Singer) Singer, **pussēntiņas**

*H. cucullata* (Pers.: Fr.) Singer – *Mycena gypsea* (Fr.) Quél., **gipša pussēntiņa**, nobiru un koksnes saprotofs, neēdama, reti, lapu koku mežos, IX– XI, H: DM.

\*\**H. gracilis* (Quél.) Singer, **slaidā pussēntiņa**, nobiru saprotofs, neēdama, reti, jauktos mežos, VII– VIII, H: DM.

\**H. lactea* (Pers.: Fr.) Singer – *H. delicatella* (Peck) Singer – *Mycena lactea* (Pers.: Fr.) P. Kumm., **pienbaltā pussēntiņa**, nobiru saprotofs, neēdama, reti, egļu mežos, VIII– IX, H: DM, L: Avota, Krastiņa 1994.

\*\**H. rickenii* (A. H. Sm.) Singer, **Rikena pussēntiņa**, nobiru saprotrofs, neēdama, bieži, skuju koku mežos, VIII– IX, H: DM.

***Hohenbuehelia* Schulz., gliemežnīcenes**

- H. geogenia*** (D. C.) Singer – *Pleurotus geogenius* Bres., **zemes gliemežnīcene**, nedzīvās zemsedzes un humusa saprotrofs, ēdama, reti, skuju koku mežos, VIII– X, L: Urbonas et al. 1986.
- H. petaloides*** (Bull.: Fr.) Schulzer – *Pleurotus petaloides* (Bull.) Fr., **vainaglapu gliemežnīcene**, nedzīvās zemsedzes un koksnes saprotrofs, ēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, IX– XI, H: RIG.

***Hydropus* (Kühner) Singer, ūdenspēdenes**

- H. marginellus*** (Fr.) Singer, **sīkkātiņa ūdenspēdene**, koksnes saprotrofs, neēdama, reti, mežos, VIII– IX, L: Urbonas et al. 1986.

***Hygrocybe* P. Kumm., stiklenes**

- H. calyptraeformis*** (Berk & Broome) Fayod – *Hygrophorus calyptraeformis* Berk., **rožainā stiklene**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, ēdama, ļoti reti, skuju koku un jauktos mežos, VII– VIII, H: DM.
- H. cantharellus*** (Schwein.: Fr.) Lange – *H. lepida* Arnolds – *Pseudohygrocybe cantharellus* (Schwein.: Fr.) Kovalenko, **gaileņu stiklene**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, ēdama, bieži, skuju koku mežos, priežu mežos, VII– IX, H: DM, RIG.
- H. ceracea*** (Fr.) P. Kumm. – *Pseudohygrocybe ceracea* (Fr.) Kovalenko – *Hygrophorus ceraceus* (Wulfen.) Fr., **vaska stiklene**, humusa saprotrofs, neēdama, reti, mežu klajumos, ganībās, zālainās vietās, VII– IX, H: DM, RIG.
- H. chlorophana*** (Fr.) P. Karst. – *Hygrophorus chlorophanus* Fr., **zaļganā stiklene**, humusa saprotrofs, ēdama, reti, mežmalās, mežos, pļavās, zālainās vietās, VIII– X, L: Urbonas et al. 1986.

- H. coccinea*** (Pers.: Fr.) P. Kumm. – *Pseudohygrocybe coccinea* (Pers.: Fr.) Kovalenko – *Hygrophorus coccineus* (Schaeff.) Fr., **šarlaksarkanā stiklene**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, ēdama, reti, pļavās, ganībās, pārpurvotos mežos, VII– XI, H: DM.
- H. conica*** (Scop.: Fr.) P. Kumm. – *Hygrophorus conicus* (Scop.) Fr., **smailā stiklene**, humusa saprotofs, nedzīvās zemsedzes saprotofs, ēdama, bieži, mežmalās, ganībās, pļavās, zālainās vietās, V– XI, H: DM, HK.
- \****H. insipida*** (Lange) M. M. Moser – *Gliophorus insipidus* (Lange) Kovalenko, **negaršīgā stiklene**, humusa saprotofs, neēdama, reti, mežos, pļavās, IX– X, H: DM, L: Avota 1996.
- H. intermedia*** (Passer) Fayod – *Pseudohygrocybe intermedia* (Passer) Kovalenko, **videjā stiklene**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, neēdama, reti, priežu mežos, mežmalās, ganībās, VII– VIII, H: DM.
- \****H. lilacina*** (Laest.) M. M. Moser – *Gliophorus lilacinus* (Laest.) Kovalenko, **violetā stiklene**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, neēdama, ļoti reti, mitros eglu mežos, VIII, H: DM, L: Avota 1996.
- H. miniata*** (Fr.) P. Kumm. – *Pseudohygrocybe miniata* (Fr.) Kovalenko, **mīnijsarkanā stiklene**, humusa saprotofs, ēdama, bieži, mežos, ganībās, pļavās, purvos, skābās augsnēs, VI– X, H: DM, HK, RIG.
- H. nitrata*** (Pers.) Wünsche – *H. murinacea* (Bull.: Fr.) M. M. Moser – *Neohygrocybe nitrata* (Pers.) Kovalenko – *Hygrophorus nitratus* (Pers.) Fr., **smirdošā stiklene**, humusa un nedzīvās zemsedzes saprotofs, neēdama, reti, mežos, ganībās, VIII– IX, L: Urbonas et al. 1986.
- H. obrussea*** (Fr.) Wünsche – *H. quieta* (Kühner) Singer – *Pseudohygrocybe obrussea* (Fr.) Kovalenko – *Hygrophorus obrusseus* Fr., **smaržīgā stiklene**, humusa saprotofs, ēdama, reti, mežmalās, lapu koku mežos, VI– X, H: DM, RIG.
- H. persistens*** (Britzelm.) Singer – *H. acutoconica* (Clem.) Singer – *H. langei* Kühner, **oranžā stiklene**, humusa saprotofs, ēdama, ļoti bieži, mežmalās, mežos, pļavās, VII– IX, H: DM.

- \**H. pseudoconica* Lange – *H. nigrescens* (Quél.) Kühner, **melnējošā stiklene**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, bieži, jauktos mežos, pļavās, ganībās, V– IX, H: DM, L: Avota, Krastiņa 1994.
- H. psittacina* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm. – *Gliophorus psittacinus* (Schaeff.: Fr.) Herink – *Hygrophorus psittacinus* (Schaeff.) Fr., **zaļā stiklene**, humusa saprotrofs, neēdama, ļoti reti, mežmalās, VIII– IX, L: Urbonas et al. 1986.
- H. punicea* (Fr.) P. Kumm. – *Pseudohygrocybe punicea* (Fr.) Kovalenko – *Hygrophorus puniceus* Fr., **sarkanā stiklene**, humusa saprotrofs, ēdama, reti, mežmalās, pļavās, IX– X, H: RIG.
- \**H. reae* (Maire) Lange – *Gliophorus reae* (Maire) Kovalenko, **Reja stiklene**, humusa saprotrofs, neēdama, reti, mežmalās, pļavās, VIII– IX, H: DM, L: Avota 1995a.
- H. spadicea* (Scop.: Fr.) P. Karst. – *Hygrophorus spadiceus* (Scop.) Fr., **melnbrūnā stiklene**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, ēdama, reti, eglu mežos, IX– X, L: Urbonas et al. 1986.
- \**H. tristis* (Pers.) F. H. Möller – *H. chloroides* (Malençon) Kovalenko, **citrondzeltenā stiklene**, humusa saprotrofs, neēdama, bieži, mežos, pļavās, mežmalās, VIII, H: DM, L: Avota 1996.
- \**H. turunda* (Fr.: Fr.) P. Karst. – *Pseudohygrocybe turunda* (Fr.: Fr.) Kovalenko, **rūsas stiklene**, humusa saprotrofs, neēdama, ļoti reti, mežos, pļavās, pārpurvotos mežos, IX– X, H: DM, L: Avota, Krastiņa 1994.

#### *Hygrophoropsis* (Schroet.) Maire, **negailenes**

- H. aurantiaca* (Wulfen: Fr.) Maire, **dzeltensarkanā negailene**, nedzīvās zemsedzes un koksnes saprotrofs, ēdama, bieži, skuju koku un jauktos mežos, VII– X, H: DM, HK, RIG.
- \**H. pallida* (Peck) Kreisel, **bālā negailene**, briotrofs, ēdama, ļoti reti, skuju koku mežos, VII– IX, H: DM, L: Avota 1994.

***Hygrophorus* Fr., gliemezenes**

- H. agathosmus*** (Fr.) Fr. – *Limacium agathosmum* Fr., **smaržīgā gliemezene**, egļu mikorizas sēne, ēdama, bieži, skuju koku un jauktos mežos, IX– X, H: DM, RIG.
- H. atramentosus*** (Alb. & Schwein.) Haas & Haller, **melnšķiedrainā gliemezene**, egļu mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, egļu mežos, VIII– X, L: Urbonas et al. 1986.
- H. camarophyllus*** (Alb. & Schwein.: Fr.) Dumeé, Grandjean & Maire, **biezlapīšu gliemezene**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, mitros skuju koku mežos, VII– X, H: DM.
- \****H. chrysodon*** (Batsch: Fr.) Fr. – *Limacium chrysodon* (Batsch) Fr., **dzeltenbrūnā gliemezene**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, lapu koku un jauktos mežos, parkos, VIII– XI, H: DM, L: Pučko 1954.
- H. discoideus*** (Pers.: Fr.) Fr., **diska gliemezene**, egļu mikorizas sēne, ēdama, reti, egļu mežos, IX– XI, H: DM.
- H. eburneus*** (Bull.: Fr.) Fr. – *Limacium eburneum* (Bull.) Fr., **zilonīkaula gliemezene**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, lapu koku mežos, VIII– X, H: DM, RIG.
- H. erubescens*** (Fr.) Fr., **iesārtā gliemezene**, mikorizas sēne, ēdama, reti, skuju koku mežos, VII– XI, H: DM, RIG.
- \****H. hedrychii*** (Velen.) K. Kult. – *H. cossus* (Sowerby) Fr., **bērzu gliemezene**, bērzu mikorizas sēne, ēdama, bieži, lapu koku un jauktos mežos, VIII– X, H: DM, L: Avota 1996.
- \*\****H. hyacinthinus*** Quél., **hiacinšu gliemezene**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, skuju koku mežos, IX, H: DM.
- H. hypothejus*** (Fr.: Fr.) Fr. – *Limacium hypotheum* Fr., **salnas gliemezene**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, priežu mežos, IX– XII, H: DM, HK, RIG.
- H. hypothejus* var. *aureus* (Arrh.) Imler – *H. aureus* Arrh., mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, priežu mežos, IX, L: Urbonas et al. 1986.

- \**H. melizeus* (Fr.: Fr.) Fr., **medainā gliemezene**, mikorizas sēne, ēdama, reti, skuju koku mežos, skābās augsnēs, IX– X, H: DM, HK, L: Avota 1992.
- H. nemoreus* (Pers.: Fr.) Fr., **birztalu gliemezene**, mikorizas sēne, ēdama, loti reti, lapu koku mežos, mežmalās, VIII– X, H: DM.
- H. olivaceoalbus* (Fr.: Fr.) Fr. – *Limacium olivaceoalbum* Fr., **olīvbaltā gliemezene**, eglu mikorizas sēne, ēdama, loti bieži, eglu mežos, skābās augsnēs, IX– XI, H: DM, RIG.
- H. penarius* Fr. – *Limacium penarium* Fr., **sausā gliemezene**, mikorizas sēne, ēdama, reti, lapu koku mežos, IX– XI, L: Urbonas et al. 1986.
- \*\**H. piceae* Kühner, **egļu gliemezene**, eglu mikorizas sēne, ēdama, reti, eglu mežos, IX– XI, H: DM.
- H. pudorinus* (Fr.) Fr., **lapegļu gliemezene**, mikorizas sēne, neēdama, reti, lapegļu stādījumos, IX– X, L: Urbonas et al. 1986.
- \**H. pustulatus* (Pers.: Fr.) Fr., **melnpunktu gliemezene**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, skuju koku un eglu mežos, IX– X, H: DM, HK, L: Avota, Krastiņa 1994.
- H. russula* (Schaeff.: Fr.) Quél., **bērzlapju gliemezene**, mikorizas sēne, ēdama, reti, lapu koku mežos, IX– X, H: RIG.

#### *Hypholoma* (Fr.) P. Kumm., **sērsēnes**

- H. capnoides* (Fr.: Fr.) P. Kumm. – *Naematoloma capnoides* (Fr.: Fr.) P. Karst., **dūmainā sērsēne**, koksnes saprotrofs, ēdama, loti bieži, skuju koku un jauktos mežos, VIII– X, H: DM, HK, RIG.
- \**H. elongatum* (Pers.: Fr.) Ricken – *H. elongatipes* Peck – *Psilocybe uda* (Pers.: Fr.) Gillet ss. Cooke, **garkāta sērsēne**, briotrofs, neēdama, bieži, priežu mežos, pārpurvotos mežos, VIII– X, H: DM, HK, L: Avota 1996.
- \**H. ericaeoides* Orton – *Naematoloma ericaeoides* (Orton) Kalamees, **ēriku sērsēne**, humusa saprotrofs, neēdama, reti, ganībās, zālainās vietās, IX– X, H: DM, L: Avota 1996.

- H. fasciculare*** (Huds.: Fr.) P. Kumm. – *Naematoloma fasciculare* (Huds.: Fr.) P. Karst., **rūgtā sērsēne**, koksnes saprotrofs, indīga, ļoti bieži, mežos, dārzos, parkos, V– XI, H: DM, HK, RIG.
- \****H. laeticolor*** (F. H. Möller) Orton, **košā sērsēne**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs un nobiru saprotrofs, briotrofs, neēdama, ļoti reti, mežos, parkos, IX, H: DM, L: Avota 1996.
- H. lateritium*** (Schaeff.: Fr.) Schroet. – *H. sublateritium* (Fr.) Quél. – *Naematoloma sublateritium* (Fr.) P. Karst., **ķiegelsarkanā sērsēne**, koksnes saprotrofs, neēdama, ļoti bieži, priežu mežos, VIII– X, H: DM, RIG.
- H. myosotis*** (Fr.) M. M. Moser – *Pholiota myosotis* (Fr.) Singer – *Naematoloma myosotis* (Fr.: Fr.) Singer, **purvū sērsēne**, briotrofs, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, parkos, lapu koku mežos, pārpurvotos mežos, VIII– X, H: HK.
- \****H. polytrichi*** (Fr.: Fr.) Singer – *Naematoloma polytrichi* (Fr.: Fr.) Konrad, **dzegužlinu sērsēne**, briotrofs, neēdama, reti, pārpurvotos mežos, VIII– X, H: HK, L: Avota, Krastiņa 1994.
- \****H. radicosum*** Lange – *H. epixanthum* (Fr.) Quél. – *Naematoloma radicosum* (Lange), Konrad & MaUBL., **sakņkāta sērsēne**, koksnes saprotrofs, egļu mežos, VIII– X, H: DM, RIG, L: Pučko 1954.
- \****H. squamosa*** (Pers.: Fr.) Urbonas – *Stropharia squamosa* (Pers.: Fr.) Quél., **zvīnainā sērsēne**, nedzīvās zemsedzes un koksnes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, jauktos un lapu koku mežos, VIII– X, H: DM, L: Avota, Krastiņa 1994.
- \****H. subericaceum*** (Fr.) Kühner – *Naematoloma subericaceum* (Fr.) Singer, **virsāju sērsēne**, briotrofs, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, priežu mežos, X, H: DM, L: Avota 1996.
- H. udum*** (Pers.: Fr.) Kühner – *Naematoloma udum* (Pers.: Fr.) P. Karst., **mitruma sērsēne**, briotrofs, neēdama, bieži, priežu mežos, IX– X, H: DM, HK, RIG.

***Hypsizygus* Singer, kokpūkaines*****Hypsizygus ulmarius* (Bull.: Fr.) Redhead – *H. tessellatus* (Bull.: Fr.)**

Singer, – *Lyophyllum ulmarium* (Bull.: Fr.) Kühner – *Pleurotus ulmarius* (Bull.: Fr.) Quél., **gobu kokpūkaine, čemurpūkaine**, koksnes saprotrofs, parazīts, ēdama, reti, lapu koku mežos, VII– XI, H: DM, HK, RIG.

***Inocybe* Fr., šķiedrgalvītes*****I. assimilata* (Britzelm.) Sacc. – *I. umbrina* Bres., tumšbrūnā šķiedrgalvīte,** mikorizas sēne, indīga, reti, mežos, skābās augsnēs, VII– X, H: DM.**\*\**I. asterospora* Quél., zvaigžņsporu šķiedrgalvīte**, mikorizas sēne, neēdama, reti, lapu koku mežos, VII– X, H: DM.**\*\**I. auricoma* (Batsch) Lange, zeltainā šķiedrgalvīte**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VIII, H: HK.***I. bongardii* (Weinm.) Quél., Bongarda šķiedrgalvīte**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, bieži, lapu koku mežos, VII– X, H: DM.**\*\**I. brunnea* Quél., brūnā šķiedrgalvīte**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, indīga, bieži, lapu koku mežos, VIII– X, H: DM.**\*\**I. calamistrata* (Fr.: Fr.) Gillet, zilkāta šķiedrgalvīte**, mikorizas sēne, neēdama, ļoti reti, parkos, mitros jauktos un lapu koku mežos, VIII– X, H: DM.**\*\**I. calospora* Quél., skaistsporu šķiedrgalvīte**, alkšņu mikorizas sēne, neēdama, reti, mitros lapu koku mežos, VIII, H: HK.***I. cervicolor* (Pers.) Quél. – *I. hirsuta* (Lasch) Fr. ss. Lange, briežu šķiedrgalvīte**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, bieži, lapu koku mežos, VII– X, L: Urbonas et al. 1986.***I. cincinnata* (Fr.) Quél. – *I. obscura* (Pers.) Gillet, cirtainā šķiedrgalvīte**, mikorizas sēne, indīga, bieži, lapu koku mežos, VII– X, H: DM, HK, RIG.***I. cookei* Bres., Kuka šķiedrgalvīte**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, ēdama, bieži, skuju koku mežos, VIII– X, H: DM.

- \**I. curvipes* P. Karst. – *I. lanuginella* (Schroet.) Konr. & Maubl. ss. Lange, **izliektā šķiedrgalvīte**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, parkos, dārzos, VII– IX, H: DM, L: Avota 1996.
- I. decipiens* Bres., **mānīgā šķiedrgalvīte**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, reti, priežu mežos, ceļmalās, VI, H: RIG.
- I. destricta* (Fr.) Bres., **kastaņbrūnā šķiedrgalvīte**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, reti, skuju koku mežos, VI– X, L: Urbonas et al. 1986.
- \**I. devoniensis* Orton, **jūrmalas šķiedrgalvīte**, humusa saprotrofs, neēdama, ļoti reti, smiltājos, kāpās, VIII, H: HK, RIG, L: Vimba 1997.
- \**I. dulcamara* (Pers.) P. Kumm., **olīvdzeltenā šķiedrgalvīte**, mikorizas sēne, neēdama, bieži, sausos skuju koku mežos, VI– X, H: DM, HK, L: Avota 1996.
- \*\**I. dunensis* Orton, **kāpu šķiedrgalvīte**, humusa saprotrofs, neēdama, ļoti reti, kāpās, VII– X, H: RIG.
- I. erubescens* Blytt – *I. patouillardii* Bres., **Patujāra šķiedrgalvīte**, humusa saprotrofs, indīga, ļoti bieži, lapu koku mežos, parkos, dārzos, V– VIII, H: DM, RIG.
- \**I. eutheles* (Berk. & Broome) Sacc., **matainā šķiedrgalvīte**, mikorizas sēne, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, skābās augsnēs, VIII, H: DM, L: Štolls, akvareļi 1913-1939.
- \*\**I. flocculosa* (Berk.) Sacc. – *I. gausapata* Kühner – *I. pallidipes* Ell. & Ev. ss. Lange, **pārslainā šķiedrgalvīte**, humusa saprotrofs, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VII– X, H: HK.
- I. fraudans* (Britzelm.) Sacc. – *I. incarnata* Bres. – *I. pyriodora* (Pers.: Fr.) P. Kumm., **bumbieru šķiedrgalvīte**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, reti, mežos, dārzos, VIII– IX, L: Urbonas et al. 1986.
- \**I. fuscidula* Velen. – *I. brunneoatra* (R. Heim) Orton – *I. virgatula* Kühner, **brūnganā šķiedrgalvīte**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, parkos, lapu koku mežos, smilšainās augsnēs, VII– IX, H: DM, HK, L: Avota 1996.

- I. fuscomarginata* Kühner – *I. relicina* (Fr.) Quél. s. R. Heim, **brūnapmalu šķiedrgalvīte**, humusa saprotrofs, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, reti, mežos, zālainās vietās, sausās vietās, VIII, L: Urbonas et al. 1986.
- I. geophylla* (Fr.: Fr.) P. Kumm., **zemes šķiedrgalvīte**, humusa saprotrofs, indīga, ļoti bieži, mežos, dārzos, trūdvielām bagātās augsnēs, VII– X, H: DM, HK.
- \*\**I. glabripes* Ricken – *I. microspora* Lange, **kailkāta šķiedrgalvīte**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, reti, lapu koku mežos, VIII– X, H: DM.
- \*\**I. grammata* Quél., **paugeusrporu šķiedrgalvīte**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, reti, priežu mežos, VII– X, H: DM.
- \**I. halophila* R. Heim ss. Huijsman, **smiltāju šķiedrgalvīte**, humusa saprotrofs, ļoti reti, kāpās, smilšainās augsnēs, VII– IX, H: RIG, L: Vimba 1997.
- \*\**I. hirtella* Bres., **cirtainā šķiedrgalvīte**, mikorizas sēne, indīga, reti, lapu koku mežos, VIII– X, H: DM.
- I. impexa* (Lasch) Kuyper – *I. maritima* (Fr.) P. Karst., **jūrmalas šķiedrgalvīte**, humusa saprotrofs, neēdama, ļoti reti, kāpās, smilšainās augsnēs, VII– X, H: RIG.
- I. lacera* (Fr.) P. Kumm., **šķeltā šķiedrgalvīte**, mikorizas sēne, indīga, bieži, priežu mežos, smilšainās augsnēs, VI– IX, H: DM, HK, RIG.
- \*\**I. langei* R. Heim, **Langes šķiedrgalvīte**, humusa saprotrofs, neēdama, ļoti reti, priežu un lapu koku mežos, IX– X, H: HK.
- I. lanuginosa* (Bull.: Fr.) P. Kumm., **tumšzvīņu šķiedrgalvīte**, koksnes un nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, bieži, priežu mežos, VII– X, H: HK.
- \**I. longicystis* Atl., **vilnainā šķiedrgalvīte**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, indīga, bieži, priežu mežos, skābās augsnēs, VIII– IX, H: DM, L: Pučko 1954.

- I. maculata** Boud., **plankumainā šķiedrgalvīte**, humusa saprotrofs, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, indīga, reti, jauktos mežos, VII– XI, H: DM, HK, RIG.
- \*\***I. melanopus** Stuntz, **melnkāta šķiedrgalvīte**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, dārzos, VIII, H: DM.
- \***I. mixtilis** (Britzelm.) Sacc. – *I. praetervisa* Quél. ss. Lange, **bumbuļkāta šķiedrgalvīte**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, indīga, reti, mežos, VII– X, H: DM, HK, L: Avota, Krastiņa 1994.
- \***I. muricellata** Bres. – *I. scabella* (Alb. & Schwein.: Fr.) P. Kumm. s. Cooke, R. Heim, **gaišbrūnā šķiedrgalvīte**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, reti, skuju koku mežos, VIII, H: DM, L: Avota 1994.
- \***I. napipes** Lange, **rāceņu šķiedrgalvīte**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, reti, lapu koku un jauktos mežos, skābās augsnēs, VII– XI, H: DM, HK, L: Štolls, akvareļi 1913-1939.
- \***I. nitidiuscula** (Britzelm.) Sacc. – *I. friesii* R. Heim, **Frīza šķiedrgalvīte**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, indīga, reti, mežos, V– XI, H: DM, L: Avota 1996.
- \*\***I. oblectabilis** (Britzelm.) Sacc., **bālganā šķiedrgalvīte**, humusa saprotrofs, neēdama, reti, eglu mežos, VIII, H: DM.
- \*\***I. obscuroides** Orton, **tumšā šķiedrgalvīte**, mikorizas sēne, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VIII– X, H: DM.
- \*\***I. ovatocystis** Kühner & Boursier, **ovālpūšļu šķiedrgalvīte**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, trūdvielām bagātās augsnēs, VIII– IX, H: DM, H: HK.
- \***I. paludinella** Peck, **dūksnāja šķiedrgalvīte**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, reti, jauktos mežos, pārpurvotos mežos, VII– VIII, H: DM, L: Štolls, akvareļi 1913-1939.
- I. phaeodisca** Kühner, **tepē šķiedrgalvīte**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, reti, mežos, IX, H: DM.
- \*\***I. posterula** (Britzelm.) Sacc., **bālā šķiedrgalvīte**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, skuju koku mežos, VIII– X, H: DM.

- I. *praetervisa*** Quél., **čiekursporu šķiedrgalvīte**, mikorizas sēne, indīga, bieži, mežos, skābās augsnēs, V– X, L: Urbonas et al. 1986.
- I. *pseudodestricta*** Stangl. & Veselsky, **spožā šķiedrgalvīte**, humusa saprotofs, neēdama, reti, lapu koku un jauktos mežos, IX– X, H: DM.
- \*\*I. *relicina*** (Fr.) Quél., **dzeltenlapiņu šķiedrgalvīte**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, neēdama, ļoti reti, skuju koku mežos, VIII, H: HK.
- \*I. *queletii*** Maire & Konrad, **Kelē šķiedrgalvīte**, humusa saprotofs, neēdama, ļoti reti, priežu mežos, VII– X, H: DM, L: Avota 1994.
- I. *rimosa*** (Bull.: Fr.) P. Kumm. – *I. fastigiata* (Schaeff.) Quél., **smailā šķiedrgalvīte**, mikorizas sēne, neēdama, ļoti bieži, mežos, VIII– XI, H: DM.
- I. *sambucina*** (Fr.: Fr.) Quél., **plūškoku šķiedrgalvīte**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, indīga, reti, skuju koku mežos, smilšainās augsnēs, VIII– IX, H: DM.
- \*I. *serotina*** Peck, **vēlā šķiedrgalvīte**, neēdama, bieži, priežu mežos, smilšainās augsnēs, kāpās, IX– X, H: DM, HK, RIG, L: Kalamees, Vimba 1985.
- \*I. *sindonia*** (Fr.) P. Karst. – *I. kühneri* Stangl & J. Veselsky – *I. commutabilis* Furrer– Ziogas, **Kīnera šķiedrgalvīte**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, indīga, bieži, jauktos mežos, VI– X, H: DM, HK, L: Avota 1996.
- \*\*I. *soluta*** Velen., **kvadrātsporu šķiedrgalvīte**, mikorizas sēne, neēdama, ļoti reti, priežu mežos, IX– X, H: HK.
- \*\*I. *squarrosa*** Rea, **zvīņainā šķiedrgalvīte**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, neēdama, ļoti reti, jauktos mežos, VIII, H: DM.
- \*I. *subcarpta*** Kühner & Boursier, **gredzenotā šķiedrgalvīte**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, neēdama, bieži, skuju koku mežos, smilšainās augsnēs, VIII– IX, H: DM, L: Štolls, akvareļi 1913-1939.
- \*I. *subnudipes*** Kühner, **puskailā šķiedrgalvīte**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, neēdama, ļoti reti, jauktos mežos, parkos, VIII– IX, H: DM, L: Avota 1996.

- \*\**I. terrigena* (Fr.) Kühner – *I. dulcamara* s. Ricken, **zābakotā šķiedrgalvīte**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, reti, jauktos mežos, ceļmalās, VIII– X, H: DM.
- \**I. trivialis* Lange, **parastā šķiedrgalvīte**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, skuju koku mežos, smilšainās augsnēs, VIII– IX, H: DM, RIG, L: Avota 1994.
- \**I. umbratica* Quél., **ēnainā šķiedrgalvīte**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, ļoti bieži, skuju koku mežos, eglu mežos, VIII– X, H: DM, HK, L: Štolls, akvareļi 1913-1939.
- I. vatricosa* (Fr.: Fr.) Karst, **glotainā šķiedrgalvīte**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, IX, L: Urbonas et al. 1986.

#### *Kuehneromyces* Singer & A. H. Sm., **pacelmenes**

- \*\**K. lignicola* (Peck) Redhead – *K. myriadophylla* (Orton) Pegler & Young – *K. vernalis* (Peck) Singer & A. H. Sm., **pavasara pacelmene**, koksnes saprotrofs, ēdama, reti, lapu koku mežos, V– VI, H: DM.
- K. mutabilis* (Schaeff.: Fr.) Singer & Smith – *Pholiota mutabilis* (Schaeff.: Fr.) Kumm., **mainīgā pacelmene**, koksnes saprotrofs, ēdama, ļoti bieži, mežos, V– XI, H: DM, HK, RIG.

#### *Laccaria* Berk. & Br., **bērzlapenes**

- L. amethystea* (Bull.) Murill – *L. amethystina* (Bolt.) Murill, **ametista bērzlapene**, humusa saprotrofs, mikorizas sēne, ēdama, reti, mežos, VI– X, H: DM, RIG.
- L. bicolor* (Maire) Orton, **divkrāsu bērzlapene**, humusa saprotrofs, mikorizas sēne, ēdama, bieži, mežos, VI– X, H: DM, HK.
- L. laccata* (Scop.: Fr.) Berk. & Broome – *Russulopsis laccata* (Scop.) Schroet., **sārtā bērzlapene**, humusa saprotrofs, mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, mežos, VI– XI, H: DM, HK, RIG.

- \**L. proxima* (Boud.) Pat., **lielā bērzlapene**, humusa saprotrofs, mikorizas sēne, ēdama, reti, skuju koku mežos, VII– IX, H: DM, HK, L: Avota, Krastiņa 1994.
- \**L. tortilis* (Bolton) Cooke – *L. echinospora* (Speg.) Singer, **sīkā bērzlapene**, humusa saprotrofs, neēdama, ļoti reti, mitros skuju koku un jauktos mežos, VIII– IX, H: DM, HK, L: Avota, Krastiņa 1994.

***Lactarius* (DC.: Fr.) S. F. Gray, pienaines, krimildes, alksnenes, sarkandzeltaines, rudmieses, vilnīši, saldūksnes, eglenes**

*L. acerrimus* Britzelm., **sūrā pienaine**, mikorizas sēne, neēdama, ļoti reti, lapu kokumežos, ozolu mežos, VI– IX, H: DM, RIG.

*L. acris* (Bolton: Fr.) Gray, **kodīgā pienaine**, mikorizas sēne, ēdama, reti, lapu koku mežos, VII– IX, L: Urbonas et al. 1986.

\*\**L. aquizonatus* Kytov., **ūdensjoslu pienaine**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, skuju koku mežos, VIII– IX, H: DM.

\*\**L. aspideus* (Fr.: Fr.) Fr., **vītolu pienaine**, mikorizas sēne, neēdama, ļoti reti, mitros lapu koku mežos, IX– X, H: DM.

*L. aurantiacus* (Pers.: Fr.) Gray, **oranžā pienaine**, mikorizas sēne, ēdama, reti, lapu koku mežos, IX– XI, L: Urbonas et al. 1986.

\**L. azonites* (Bull.) Fr., **bezjoslu pienaine**, mikorizas sēne, ēdama, reti, lapu koku mežos, zālainās vietās, VI– IX, H: DM, L: Avota 1996.

*L. bertillonii* (Neuhoff.: Z. Schaeff.) Bon – *L. vellereus* (Fr.: Fr.) Fr. s. auct., **baltā krimilde**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, mežos, VIII– X, H: DM.

*L. blennius* (Fr.: Fr.) Fr., **dižskābaržu pienaine**, dižskābaržu mikorizas sēne, ēdama, reti, parkos, dižskābaržu stādījumos, IX– X, H: DM.

*L. camphoratus* (Bull.: Fr.) Fr., **kampara pienaine**, egļu mikorizas sēne, ēdama, bieži, skuju koku mežos, VII– XI, H: DM, HK, RIG.

*L. citriolens* Pouzar – *L. cilicioides* (Fr.: Fr.) Fr. ss. Neuhoff, **skropstainā pienaine**, bērzu mikorizas sēne, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, IX– X, L: Urbonas et al. 1986.

- L. controversus*** (Pers.: Fr.) Fr., **apšu pienaine**, apšu mikorizas sēne, ēdama, reti, jauktos mežos, VIII– X, H: DM.
- L. deliciosus*** (L.: Fr.) Gray, **priežu rudmiese**, priežu mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, skuju koku un jauktos mežos, VIII– IX, H: DM, HK.
- L. deterrimus*** Groger – *L. semisanguifluus* R. Heim. & Leclair ss. Neuhoff., **egļu rudmiese**, egļu mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, egļu mežos, VIII– X, H: DM.
- L. flexuosus*** (Pers.: Fr.) Gray, **pelēkā pienaine**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, jauktos mežos, VII– X, H: DM.
- L. fuliginosus*** (Fr.: Fr.) Fr., **sodrējainā pienaine**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, lapu koku mežos, VII– X, H: DM.
- L. fulvissimus*** Romagn. – *L. ichoratus* (Batsch.) Fr., **oranžbrūnā pienaine**, mikorizas sēne, neēdama, reti, lapu koku un jauktos mežos, VII– XI, L: Urbonas et al. 1986.
- L. glutinopallens*** Moeller & Lange, **pelēkbālganā pienaine**, mikorizas sēne, neēdama, reti, skuju koku mežos, VII– X, L: Urbonas et al. 1986.
- L. glycosmus*** (Fr.: Fr.) Fr., **smaržīgā pienaine**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, mežos, VII– XI, H: DM, HK, RIG.
- L. helvus*** (Fr.) Fr., **sarkandzeltaine**, mikorizas sēne, neēdama, ļoti bieži, skuju koku mežos, pārpurvotos mežos, VIII– X, H: DM, HK, RIG.
- L. hortensis*** Velen. – *L. pyrogalus* (Bull.: Fr.) Fr., **dedzinošā pienaine**, lazdu mikorizas sēne, ēdama, bieži, lapu koku un jauktos mežos, VIII– X, H: DM, HK, RIG.
- L. hysignus*** (Fr.: Fr.) Fr., **cūku pienaine**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, skuju koku un jauktos mežos, VIII– X, L: Urbonas et al. 1986.
- L. insulsus*** (Fr.) Fr., **negardā pienaine**, ozolu mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VII-X, L: Urbonas et al. 1986.
- \*\****L. lacunarum*** Romagn., **lāmu pienaine**, mikorizas sēne, neēdama, bieži, mitros jauktos mežos, IX, H: DM.
- L. lignyotus*** Fr., **koksnes pienaine**, mikorizas sēne, ēdama, reti, skuju koku un jauktos mežos, skābās augsnēs, VII– IX, H: DM, RIG.

- L. lilacinus* (Lasch) Fr., **ceriņu pienaine**, alkšņu mikorizas sēne, ēdama, bieži, mitros alkšņu mežos, IX– X, H: DM, HK, RIG.
- L. mamosus* (Fr.: Weinm.) Fr. – *L. fuscus* Rolland, **cigoriņu pienaine**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, skuju koku un jauktos mežos, VIII– IX, H: DM.
- L. mitissimus* (Fr.) Fr., **maigā pienaine**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, skuju koku mežos, VIII– X, H: DM, HK, RIG.
- L. musteus* Fr., **sila pienaine**, mikorizas sēne, ēdama, reti, priežu mežos, smilšainās augsnēs, VIII– XI, H: HK, RIG.
- L. necator* (J. F. Gmel: Fr.) P. Karst – *L. turpis* (Weinm.) Fr., **cūcene**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, skuju koku un jauktos mežos, VII– XI, H: DM, RIG.
- L. obscuratus* (Lasch) Fr., **alkšņu pienaine**, alkšņu mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, mitros alkšņu mežos, VII– IX, H: DM.
- L. omphaliaformis* Romagn. – *L. cyathula* (Fr.) Fr. ss. Lange, **kausa pienaine**, alkšņu mikorizas sēne, neēdama, bieži, mitros alkšņu mežos, VIII– X, H: DM.
- L. pallidus* (Pers.: Fr.) Fr., **bālā pienaine**, mikorizas sēne, ēdama, reti, lapu koku mežos, VII– X, L: Urbonas et al. 1986.
- L. pergamenus* (Sw.: Fr.) Fr., **sīvā krimilde**, mikorizas sēne, ēdama, reti, lapu koku mežos, VII– X, L: Urbonas et al. 1986.
- \**L. picinus* Fr., **egļu pienaine**, egļu mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, egļu mežos, VIII– IX, H: DM, L: Avota 1996.
- L. piperatus* (Fr.) Gray, **piparu krimilde**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, lapu koku un jauktos mežos, VIII– X, H: DM, RIG.
- L. porninsis* Roll., **lapegļu pienaine**, lapegļu mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, lapegļu stādījumos, VIII– X, L: Urbonas et al. 1986.
- L. pubescens* (Schrad.) Fr. – *L. blumii* Bon., **bālais vilnītis**, bērzu mikorizas sēne, ēdama, bieži, mežos, VIII– X, H: DM, HK.
- L. quietus* (Fr.) Fr., **ozolu pienaine**, ozolu mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, ozolu mežos, VIII– XI, H: DM, HK, RIG.

- L. repreasentaneus* Britzelm., **meduszvīņu krimilde**, eglū mikorizas sēne, ēdama, reti, skuju koku mežos, VII– X, H: DM.
- L. resimus* (Fr.: Fr.) Fr., **saldūksne**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, lapu koku un jauktos mežos, VII– X, H: DM.
- L. rufus* (Scop.: Fr.) Fr., **alksnene**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, priežu mežos, VI– XI, H: DM, RIG.
- \**L. scoticus* Berk. & Broome – *L. favrei* H. Jahn, **Skotijas pienaine**, mikorizas sēne, ēdama, reti, mežos, pārpurvotos mežos, VIII– X, H: DM.
- L. scrobiculatus* (Scop.: Fr.) Fr., **eglene**, eglū mikorizas sēne, ēdama, reti, eglū mežos, VII– X, H: DM, HK.
- L. serifluus* (DC.: Fr.) Fr., **seruma pienaine**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, lapu koku mežos, VII– XI, L: Urbonas et al. 1986.
- L. spinosulus* Quél., **zvīņainā pienaine**, mikorizas sēne, ēdama, reti, lapu koku mežos, applūstošās vietās, zālainās vietās, VIII– XI, H: DM.
- L. subdulcis* (Pers.: Fr.) Gray, **saldenā pienaine**, mikorizas sēne, ēdama, reti, mežos, VII– XI, H: DM, RIG.
- L. theiogalus* (Bull.: Fr.) Fr. – *L. tabidus* Fr. ss. Lange, **purva pienaine**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, mežos, VIII– X, H: DM.
- L. torminosus* (Schaeff.: Fr.) Pers., **parastais vilnītis**, bērzu mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, jauktos mežos, skābās augsnēs, VII– XI, H: DM, HK.
- L. trivialis* (Fr.: Fr.) Fr., **parastā pienaine**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, mežos, skābās augsnēs, VII– XI, H: DM.
- L. umbrinus* (Pers.) Fr., **brūnganā pienaine**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, IX– X, L: Urbonas et al. 1986.
- L. utilis* (Weinm.) Fr., **iedzeltenā pienaine**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, mežos, VIII– X, H: DM, RIG.
- L. uvidus* (Fr.: Fr.) Fr., **slapjā pienaine**, mikorizas sēne, neēdama, bieži, lapu koku mežos, VIII– X, H: DM.
- L. vietus* (Fr.: Fr.) Fr., **vīstošā pienaine**, bērzu mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, jauktos mežos, VIII– X, H: DM, HK.

- L. violascens* (Otto: Fr.) Fr., **violetā pienaine**, mikorizas sēne, ēdama, reti, lapu koku un jauktos mežos, VIII– X, L: Urbonas et al. 1986.
- L. volemus* (Fr.: Fr.) Fr., **saldā krimilde**, mikorizas sēne, ēdama, reti, lapu koku un jauktos mežos, VIII– X, H: DM.
- L. zonarius* (Bull.) Fr. ss. Neuhoff, **joslainā pienaine**, mikorizas sēne, ēdama, reti, lapu koku mežos, VII– IX, L: Urbonas et al. 1986.

***Leccinum* S. F. Gray, apšubekas, bērzubekas, lācīši**

- L. aurantiacum* (Bull.) Gray – *Boletus rufus* (Schaeff.) Quél., **parastā apšubeka**, apšu mikorizas sēne, ēdama, bieži, mežos, VI– X, H: DM.
- \**L. duriusculum* (Schulzer) Singer, **brūnā apšubeka**, apšu mikorizas sēne, ēdama, reti, lapu koku mežos, V– IX, L: Štolls, akvareļi 1913-1939.
- L. niveum* (Fr.) Rauschert – *L. holopus* (Rostk.) Watling, **purva bērzubeka**, bērzu mikorizas sēne, ēdama, bieži, jauktos un lapu koku mežos, pārpurvotos mežos, VIII– IX, H: DM.
- \**L. oxydabile* (Singer) Singer, **sarkstošā bērzubeka**, mikorizas sēne, ēdama, reti, jauktos mežos, VIII– X, H: DM, L: Avota 1992.
- L. percandidum* (Vassilkov) Watling – *L. roseotinctum* Watling, **baltā apšubeka**, mikorizas sēne, ēdama, reti, mežos, VIII– X, H: DM.
- L. quercinum* (Pilát) Green & Watling, **ozolu lācītis**, ozolu mikorizas sēne, ēdama, reti, ozolu mežos, VIII– IX, L: Urbonas et al. 1986.
- L. roseofractum* Watling – *L. melaneum* (Smotl.) Pilát & Dermek, **melnā bērzubeka**, mikorizas sēne, ēdama, reti, jauktos mežos, VIII– IX, H: DM, HK.
- L. scabrum* (Bull.: Fr.) Gray – *Boletus scaber* Bull., **parastā bērzubeka**, bērzu mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, lapu koku un jauktos mežos, VI – XI, H: DM, RIG.
- L. variicolor* Watling, **raibā bērzubeka**, mikorizas sēne, ēdama, reti, mežos, VIII– IX, H: DM.

*L. versipelle* (Fr.) Snell. – *L. testaceoscabrum* Singer, **dzeltenbrūnā apšubeka**, bērzu mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, lapu koku mežos, VI– IX, H: DM.

*L. vulpinum* Watling, **sila lācītis**, priežu mikorizas sēne, ēdama, bieži, priežu mežos, VIII– IX, H: DM.

### *Lentinus* Fr., **sīkstenes**

*L. conchatus* (Bull.: Fr.) Schroet.– *Panus conchatus* (Bull.: Fr.) Fr., **bērzu sīkstene, kamolene**, koksnes saprotrofs, neēdama, bieži, lapu koku mežos uz bērza koksnes, VII– X, H: DM, RIG.

*L. cyathiformis* (Schaeff.) Bres., **kausveida sīkstene**, koksnes saprotrofs uz apses kritālām, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, V-X., L: Urbonas et al. 1986.

*L. lepideus* (Fr.: Fr.) Fr., **zvīñainā sīkstene**, koksnes saprotrofs, ēdama, bieži, uz koksnes mežos, arī uz apstrādātas koksnes (pagrabos, uz dzelzceļa gulšņiem u. c.), V– X, H: DM, RIG.

*L. suavissimus* Fr. – *Panus suavissimus* (Fr.) Singer, **smaržīgā sīkstene, kamolene**, koksnes saprotrofs, neēdama, reti, lapu koku mežos, VIII– X, H: DM, RIG.

\**L. tigrinus* (Bull.: Fr.) Fr. – *Panus tigrinus* (Bull.: Fr.) Singer, **tīgeru sīkstene**, koksnes saprotrofs uz skujkoku kritālām, neēdama, ļoti reti, mežos, VII– X, H: DM, RIG, L: Avota 1996.

### *Lepiota* (Pers.) S. F. Gray em. Pat., **saulsardzenes**

*L. alba* (Bres.) Sacc. **baltā saulsardzene**, humusa un nedzīvās zemsedzes saprotrofs, ēdama, ļoti reti, mežos, ganībās, smilšainās augsnēs, VIII– IX, H: DM, HK.

*L. aspera* (Pers.: Fr.) Quél. – *L. acutesquamosa* (Weinm.) P. Kumm. – *L. friesii* (Lasch) Quél. – *Cystolepiota aspera* (Pers.: Fr.) Quél., **smailzīņu saulsardzene**, humusa saprotrofs, neēdama, bieži, jauktos mežos, dārzos VII– X, H: DM, HK, RIG.

- L. castanea* Quél., **kastaņu saulsardzene**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, neēdama, reti, mežos, skābās augsnēs, VII– X, H: DM.
- L. clypeolaria* (Bull.: Fr.) P. Kumm., **vairoga saulsardzene**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, ēdama, bieži, skuju koku un jauktos mežos, trūdvielām bagātās augsnēs, VII– IX, H: DM, HK, RIG.
- L. cristata* (Bolton: Fr.) P. Kumm., **sekstainā saulsardzene**, nedzīvās zemsedzes un humusa saprotofs, neēdama, ļoti bieži, skuju koku un jauktos mežos, VII– X, H: DM, HK, RIG.
- L. erminea* (Fr.) Gillet, **sermuļu saulsardzene**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, neēdama, reti, pļavās, ganībās un kāpās, VII– X, H: DM, HK, RIG.
- L. felina* (Pers.: Fr.) P. Karst., **kaķu saulsardzene**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, neēdama, reti, mežos, IX, H: DM, HK.
- \**L. fulvella* Rea, **iedzeltenā saulsardzene**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, neēdama, reti, skuju koku mežos, VIII– IX, H: DM, L: Avota 1994.
- \**L. grangei* (Eyre) Lange, **Granges saulsardzene**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, IX, H: DM, L: Avota 1996.
- \**L. kuehneri* Huijsm.: Hora, **Kīnera saulsardzene**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, neēdama, ļoti reti, jauktos mežos, IX– X, H: DM, L: Avota 1994.
- L. langei* Knudsen – *L. eriophora* Peck, **Langes saulsardzene**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, neēdama, ļoti reti, mitros alkšņu mežos, IX, L: Urbonas et al. 1986.
- \**L. ochraceofulva* Orton, **okerdzeltēnā saulsardzene**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, neēdama, reti, eglu mežos, IX, H: DM, L: Avota 1996.
- \**L. oreadiformis* Velen., **pļavas saulsardzene**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, ēdama, reti, jauktos mežos, IX– X, H: DM, HK, L: Avota, Krastiņa 1994.
- L. parvannulata* (Lasch) Gillet, **sīkgredzena saulsardzene**, humusa un nedzīvās zemsedzes saprotofs, neēdama, ļoti reti, jauktos mežos, dārzos, parkos, VII– IX, H: DM.

- \**L. subalba* Kühner: Orton, **iebaltā saulsardzene**, humusa saprotrofs, neēdama, reti, jauktos mežos, zālainās vietās, VIII– IX, H: DM, L: Krastiņa 1996.
- \**L. tomentella* Lange, **polstera saulsardzene**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, jauktos mežos, IX, H: DM, L: Avota 1994.
- \**L. ventriosospora* Reid, **dzeltenkāta saulsardzene**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, ēdama, bieži, skuju koku un jauktos mežos, VII– X, H: DM, HK, L: Avota, Krastiņa 1994.

***Lepista* (Fr.) W. G. Sm., **aplocenes****

- L. flaccida* (Sowerby: Fr.) Pat. – *L. gilva* (Pers.: Fr.) Roze – *Clitocybe gilva* (Pers.: Fr.) P. Kumm., **līganā aplocene**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, ēdama, ļoti bieži, mežos, VIII– XI, H: DM, HK.
- \**L. glaucocana* (Bres.) Singer, **zilganā aplocene**, nedzīvās zemsedzes un humusa saprotrofs, mikorizas sēne, reti, ēdama, jauktos mežos, VIII– XI, H: DM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- L. inversa* (Scop.: Fr.) Pat. – *Clitocybe inversa* (Scop.: Fr.) Quél., **apvērstā aplocene**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, ēdama, ļoti bieži, skuju koku un jauktos mežos, VIII– XI, H: DM, RIG.
- L. luscina* (Fr.: Fr.) Singer – *L. panaeola* (Fr.) P. Karst., **raibā aplocene**, humusa saprotrofs, ēdama, reti, jauktos mežos, zālainās vietās, IX– XI, H: DM.
- L. nuda* (Bull.: Fr.) Cooke – *Tricholoma nudum* (Bull.) Fr., **kailā aplocene**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, skuju koku un jauktos mežos, IX– XI, H: DM, RIG.
- L. personata* (Fr.: Fr.) Cooke – *L. saeva* (Fr.) Orton – *Tricholoma personatum* Fr., **divkrāsainā aplocene**, humusa un nedzīvās zemsedzes saprotrofs, ēdama, reti, lapu koku un jauktos mežos, IX– XI, H: DM.

*L. sordida* (Schumach.: Fr.) Singer – *Tricholoma sordidum* (Schum.) Fr., **netīrā aplocene**, humusa saprotrofs, ēdama, reti, dārzos, parkos, komposta kaudzēs, VI– XI, H: DM.

***Leucoagaricus* (Locq.) Singer, sārtsporenes**

*L. cretaceus* (Bull.: Fr.) M. M. Moser – *L. pudicus* (Bull.) Bon – *L. naucinus* (Fr.) Singer, **riekstu sārtsporene**, humusa saprotrofs, ēdama, bieži, dārzos, zālainās vietās, VII– X, H: DM, RIG.

\*\**L. holosericus* (Fr.) M. M. Moser, **zīdainā sārtsporene**, humusa saprotrofs, neēdama, ļoti reti, dārzos, IX, H: DM.

***Leucocoprinus* Pat., kroksardzenes**

\**L. aureofloccosus* Henn., **zeltpārslu kroksardzene**, humusa saprotrofs, neēdama, ļoti reti, puķu podos, VII– VIII, H: DM, L: Avota, Krastiņa 1994.

*L. birnbaumii* (Corda) Singer, **dzeltenā kroksardzene**, humusa saprotrofs, neēdama, ļoti reti, siltumnīcās, IX, H: RIG.

\*\**L. bresadolae* (Schulz.) M. M. Moser – *Leucoagaricus bresadolae* (Schulz.) Bon – *Lepiota badhamii* Konrad & Maubl., Kühner & Romagn., **Bresadola kroksardzene**, humusa saprotrofs, ēdama, ļoti reti, priežu mežos, VIII, H: DM.

***Leucocortinarius* (Lange) Singer, balttīmeklenes**

*L. bulbiger* (Alb. & Schwein.: Fr.) Singer – *Tricholoma bulbigerum* (Alb. & Schw.) Fr., **gumainā balttīmeklene**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, skuju koku mežos, VIII– X, H: DM, RIG.

***Leucopaxillus* Boursier, balmietenes**

*L. candidus* (Bres.) Singer, **sniegbaltā balmietene**, humusa un nedzīvās zemsedzes saprotrofs, ēdama, ļoti reti, mežos, X– XI, L: Urbonas et al. 1986.

- \**L. compactus* (Fr.) Neuh. – *L. tricolor* (Peck) Kühner, **trīskrāsu baltmietene**, humusa un nedzīvās zemsedzes saprotofs, ēdama, ļoti reti, jauktos mežos, VII– X, H: DM, L: Avota, Krastiņa 1994.
- L. gentianeus* (Quél.) Kotl. – *L. amarus* (Alb. & Schwein.: Fr.) Kühner, **rūgtā baltmietene**, humusa un nedzīvās zemsedzes saprotofs, neēdama, reti, jauktos mežos, IX– X, L: Urbonas et al. 1986.
- \**L. giganteus* (Sibthorp.: Fr.) Singer, **milzu baltmietene**, nedzīvās zemsedzes un humusa saprotofs, ēdama, reti, jauktos mežos, mežmalās, pļavās, VIII– X, H: DM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913– 1939.
- \*\**L. paradoxus* (Cost. & Dufour) Boursier, **krēmkrāsas baltmietene**, humusa un nedzīvās zemsedzes saprotofs, ēdama, ļoti reti, jauktos mežos, IX– X, H: HK.

#### *Limacella* Earle, **glotaines**

- \**L. glioderma* (Fr.) Maire, **sarkanbrūnā glotaine**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, ēdama, bieži, mežos, IX– X, H: DM, HK, L: Avota, Krastiņa 1994.
- L. guttata* (Pers.: Fr.) Konrad & Maubl. – *L. lenticularis* (Lasch) Maire – *Lepiota lenticularis* (Lasch) Cooke, **pilošā glotaine**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, ēdama, bieži, skuju koku un egļu mežos, VIII– X, H: DM.
- \**L. illinita* (Fr.: Fr.) Murill, **lipīgā glotaine**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, ēdama, reti, skuju koku un jauktos mežos, VIII– X, H: DM, HK, L: Avota 1995a.

#### *Lyophyllum* P. Karst., **čemurpūkaines**

- L. connatum* (Schumach.: Fr.) Singer, **baltā čemurpūkaine**, humusa un nedzīvās zemsedzes saprotofs, ēdama, bieži, mežos, trūdvielām bagātās augsnēs, VIII– X, H: DM, HK, RIG.
- \**L. crassifolium* (Berk.) Singer ss. Lange – *L. caerulescens* Clemençon, **biezlapīnu čemurpūkaine**, nedzīvās zemsedzes un humusa

saprotrofs, neēdama, reti, mežos, VII– IX, H: DM, L: Štolls, akvareļi 1913-1939.

*L. decastes* (Fr.: Fr) Singer – *L. aggregatum* (Schaeff.) Kühner, **brūnā čemurpūkaine**, humusa un nedzīvās zemsedzes saprotrofs, ēdama, bieži, mežos, VII– X, H: DM, RIG.

*L. fumosum* (Pers.: Fr.) Kühner & Romagn. – *L. conglobatum* (Vittad.) M. M. Moser – *Tricholoma conglobatum* (Vittad.) Ricken, **salnas čemurpūkaine**, humusa saprotrofs, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, ēdama, bieži, mežos, mežmalās, trūdvielām bagātās augsnēs, VIII– X, H: DM, RIG.

*L. immundum* (Berk.) Kühner, **dūmpelēkā čemurpūkaine**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, ēdama, bieži, skuju koku mežos, VIII– X, H: DM.

*L. konradianum* (Maire.) Konrad, **Konrāda čemurpūkaine**, humusa saprotrofs, neēdama, ļoti reti, skuju koku mežos, IX– X, L: Urbonas et al. 1986.

\**L. loricatum* (Fr.) Kühner, **grubuļainā čemurpūkaine**, humusa un nedzīvās zemsedzes saprotrofs, ēdama, reti, lapu koku mežos, VIII– X, H: DM, L: Avota 1994.

\**L. macrosporum* Singer, **dižsporu čemurpūkaine**, humusa saprotrofs, ēdama, ļoti reti, pļavās, IX, L: Kalamees, 1996.

\*\**L. semitale* (Fr.) Kühner – *Tricholoma semitale* (Fr.) Rick., **taku čemurpūkaine**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, IX– X, H: DM.

#### *Macrocytidia* R. Heim, **makrocistīdijas**

\**Macrocytidia cucumis* (Pers.: Fr.) R. Heim, **gurķu makrocistīdija**, humusa un nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, bieži, skuju koku un jauktos mežos, IX– XI, H: DM, HK, L: Avota, Krastiņa 1994.

***Macrolepiota* Singer, dižsardzenes**

- M. excoriata*** (Schaeff.: Fr.) Wasser – *Lepiota excoriata* (Schaeff.) Fr., **sēnalainā dižsardzene**, humusa saprotrofs, ēdama, bieži, skuju koku mežos, piejūras pļavās, zālainās vietās, VIII– XI, H: DM, HK.
- M. mastoidea*** (Fr.) Singer – *Lepiota umbonata* (Schum.) Schroet., **paugurainā dižsardzene**, humusa un nedzīvās zemsedzes saprotrofs, ēdama, ļoti reti, mežos, ganībās, VIII– IX, H: DM, RIG.
- M. nympharum*** (Kalchbr.) Wasser – *M. puellaris* (Fr.) M. M. Moser, **meiteņu dižsardzene**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, ēdama, reti, skuju koku un jauktos mežos, VII– X, H: DM, RIG.
- M. procera*** (Scop.: Fr.) Singer – *Lepiota procera* Scop.: Fr., **ielā dižsardzene**, nedzīvās zemsedzes un humusa saprotrofs, mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, mežos, mežmalās, VII– X, H: DM, RIG.
- M. rhacodes*** (Vittad.) Singer – *Lepiota rhacodes* (Vittad.) Fr., **sarkstošā dižsardzene**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, skuju koku un jauktos mežos, VIII– X, H: DM, RIG.
- M. rhacodes* var. *bohemica* (Wich.) Bell. & Lanzoni – *Macrolepiota rhacodes* var. *hortensis* Pilát, **dārza dižsardzene**, humusa saprotrofs, indīga, reti, VIII– X, H: DM.

***Marasmiellus* Murrill, vītenītes**

- M. ramealis*** (Bull.: Fr.) Singer, **zaru vītenīte**, koksnes saprotrofs, neēdama, bieži, lapu koku mežos, VIII– X, H: DM, HK.

***Marasmius* Fr., vītenes**

- M. alliaceus*** (Jacq.: Fr.) Fr., **garkāta vītene**, nobiru un koksnes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, ozolu mežos, VI– XI, H: DM, RIG.
- M. androsaceus*** (L.: Fr.) Fr., **vairoga vītene**, nobiru saprotrofs, neēdama, ļoti bieži, skuju koku mežos, VII– XI, H: DM, HK, RIG.
- M. bulliardii*** Quél., **Bujāra vītene**, nobiru saprotrofs, neēdama, ļoti bieži, lapu koku mežos, VII– XI, H: DM, RIG.

- M. cohaerens* (Pers.: Fr.) Cooke & Quél., **zābakotā vītene**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, reti, lapu koku un jauktos mežos, VIII– XI, H: DM, HK.
- M. epiphyllus* (Pers.: Fr.) Fr., **lapu vītene**, nobiru saprotrofs, neēdama, ļoti bieži, lapu koku un jauktos mežos, VIII– X, H: DM, HK, RIG.
- \**M. graminum* (Libert) Berk., **zāļu vītene**, neēdama, bieži, pļavās, tīrumos, VII– XII, H: DM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913-1939.
- \**M. limosus* (Boud.) Quél., **dūksnāja vītene**, herbotrofs, neēdama, reti, mitrās pļavās, VIII– X, H: DM, HK, L: Kalamees, Vimba 1985.
- M. lupuletorum* (Weinm.) Bres. – *M. torquescens* Quél., **dzeltenīgā vītene**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, reti, lapu koku un jauktos mežos, VIII– IX, H: DM.
- M. oreades* (Bolton: Fr.) Fr., **pļavas vītene**, humusa saprotrofs, mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, ganībās, pļavās, VI– XI, H: DM, HK, RIG.
- \*\**M. prasiosmus* (Fr.: Fr.) Fr., **smirdošā vītene**, nobiru un nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, reti, lapu koku un jauktos mežos, VIII– XII, H: DM.
- M. rotula* (Scop.: Fr.) Fr., **riteņu vītene**, koksnes saprotrofs, neēdama, bieži, lapu koku un jauktos mežos, VI– XI, H: DM, RIG.
- M. saccharinus* (Batsch: Fr.) Fr., **baltā vītene**, nobiru saprotrofs, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VII– IX, H: RIG.
- M. scorodonius* (Fr.: Fr.) Fr., **ķiploku vītene**, nobiru saprotrofs, ēdama, bieži, skuju koku un jauktos mežos, VII– X, H: DM, RIG.
- \**M. tremulae* Velen., **apšu vītene**, nobiru saprotrofs, neēdama, bieži, lapu koku un jauktos mežos, IX– X, H: DM, L: Avota 1995a.
- M. wynnei* Berk. & Broome – *M. globularis* Quél., **Vinneja vītene**, nedzīvās zemsedzes un nobiru saprotrofs, neēdama, reti, skuju koku un jauktos mežos, VIII– X, H: DM.

#### *Megacollybia* Kotl. & Pouz., **dāldersēnes**

- M. platyphylla* (Pers.: Fr.) Kotl. & Pouzar – *Oudemansiella platyphylla* (Pers.: Fr.) M. M. Moser – *Collybia platyphylla* (Pers.) Fr., **platlapīņu**

**dāldersēne**, koksnes un nedzīvās zemsedzes saprotofs, ēdama, ļoti bieži, mežos, VIII– IX, H: DM, RIG.

***Melanoleuca* Pat., melnbaltenes**

***M. brevipes*** (Bull.: Fr.) Pat., **īskātiņa melnbaltene**, humusa saprotofs, ēdama, bieži, mežos, zālainās vietās, IV– VI, H: DM, HK, RIG.

***M. cognata*** (Fr.) Konrad & Maubl., **pavasara melnbaltene**, humusa saprotofs, ēdama, bieži, skuju koku mežos, IV– VI, H: DM.

\*\****M. grammopodia*** (Bull.: Fr.) Pat., **rievkātiņa melnbaltene**, nedzīvās zemsedzes un humusa saprotofs, mikorizas sēne, ēdama, reti, priežu mežos, VIII– X, H: DM.

***M. melaleuca*** (Pers.: Fr.) Murill – ***M. vulgaris*** (Pat.) Pat. – ***Tricholoma melaleucum*** (Pers.) Fr., **parastā melnbaltene**, nedzīvās zemsedzes un humusa saprotofs, ēdama, ļoti bieži, mežos, zālainās vietās, IX– X, H: DM.

\****M. microcephala*** (P. Karst.) Métrod., **sīkgalvas melnbaltene**, humusa saprotofs, ēdama, ļoti reti, mežos, VII, H: DM, HK, L: Avota 1994.

\*\****M. polioleuca*** (Fr.) Kühner & Maire, **dažādveida melnbaltene**, humusa saprotofs, ēdama, reti, skuju koku mežos, VIII– X, H: HK.

***M. strictipes*** (P. Karst.) Métrod., **stīvkātiņa melnbaltene**, humusa saprotofs, ēdama, bieži, skuju koku mežos, V– X, H: DM, HK, RIG.

\*\****M. stridula*** (Fr.) Métrod., **bumbuļkātiņa melnbaltene**, humusa saprotofs, ēdama, reti, priežu mežos, zālainās vietās, IX, H: HK.

\* ***M. subalpina*** (Britz.) Bresinsky & Stangl., **kalnu melnbaltene**, humusa saprotofs, ēdama, bieži, mežos, zālainās vietās, VI– X, H: DM, L: Avota 1994.

***M. subbrevipes*** Métrod., **mazkātiņa melnbaltene**, humusa saprotofs, ēdama, reti, ganībās, pļavās, VII– IX, H: DM.

\****M. turrita*** (Fr.) Singer, **torņa melnbaltene**, humusa saprotofs, nedzīvās zemsedzes saprotofs, neēdama, reti, skuju koku mežos, IX, H: DM, L: Avota, Krastiņa 1994.

***Melanophyllum* Velen., košlapītes**

- \****M. eyrei*** (Massee) Singer, **zaļā košlapīte**, humusa saprotrofs, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VIII, L: Avota 1994.
- \****M. haematospermum*** (Bull.: Fr.) Kreisel – ***M. echinatum*** (Roth.: Fr.) Singer, **sarkanā košlapīte**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, reti, lapu koku un jauktos mežos, VI– X, H: DM., L: Avota 1994.

***Melanotus* Pat., melnules**

- Melanotus philipsii*** (Berk. & Broome) Singer – ***Crepidotus philipsii*** (Berk. & Br.) Sacc. – ***Pleurotus roseolus*** Quél., **Filipsa melnule**, herbotrofs, neēdama, ļoti reti, pļavās, zālainās vietās, VIII– IX, L: Urbonas et al. 1986.

***Micromphale* Nees: S. F. Gray, dobumsēnītes**

- \****M. foetidum*** (Sowerby: Fr.) Singer, **smirdošā dobumsēnīte**, koksnes un nobiru saprotrofs, neēdama, reti, mežos, VIII– X, H: DM, RIG, L: Avota 1994.
- M. perforans*** (Hoffm.: Fr.) Gray – ***Marasmius perforans*** (Hoffm.: Fr.) Fr., **skuju dobumsēnīte**, nobiru saprotrofs, neēdama, ļoti bieži, skuju koku mežos, VII– XI, H: DM, HK.

***Mycena* (Pers.: Fr.) S. F. Gray, sēntiņas**

- \*\****M. abramsii*** (Murrill) Murrill – ***M. praecox*** Velen., **Abramsa sēntiņa**, nedzīvās zemsedzes un koksnes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, V– VI, H: HK.
- M. acicula*** (Schaeff.) P. Kumm., **adatu sēntiņa**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, reti, egļu mežos, V– X, H: DM, RIG.
- M. adonis*** (Bull.: Fr.) Gray, **adonisa sēntiņa**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, reti, skuju koku un jauktos mežos, V– XI, H: DM.

- \**M. aetitis* (Fr.) Quél. – *M. ammoniaca* (Fr.: Fr.) Quél. ss. Lange, **peleklapiņu sēntiņa**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, reti, mežmalās, pļavās, X, H: DM, L: Avota 1994.
- \*\**M. alba* (Bres.) Kühner – *M. corticola* (Pers.: Fr.) S. F. Gray ss. Bresadola, **baltā sēntiņa**, koksnes saprotrofs, neēdama, bieži, parkos, lapu koku mežos, IX– X, H: DM.
- \**M. amicta* (Fr.) Quél., **greznā sēntiņa**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, reti, mežos, IX, H: HK, L: Kalamees, Vimba 1985.
- \**M. aurantiomarginata* (Fr.) Quél., **zeltmalu sēntiņa**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, skuju koku un jauktos mežos, IX– X, H: DM, HK, L: Avota, Krastiņa 1994.
- \*\**M. capillaripes* Peck – *M. plicosa* (Fr.) P. Kumm. var. *marginata* Lange, **slaidkāta sēntiņa**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, skuju koku mežos, IX– X, H: HK.
- \*\**M. capillaris* (Schumach.: Fr.) P. Kumm., **pavediena sēntiņa**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, X, H: DM.
- \*\**M. chloranta* (Fr.: Fr.) P. Kumm., **zaļganā sēntiņa**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, reti, piejūras pļavās, IX, H: HK.
- \**M. cinerella* P. Karst., **pelēkā sēntiņa**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, bieži, egļu mežos, IX– XI, H: DM, HK, L: Avota, Krastiņa 1994.
- \*\**M. citrinomarginata* Gillet, **dzeltenmalu sēntiņa**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, parkos, jauktos mežos, VIII– X, H: HK.
- \**M. clavigularis* (Fr.) Gillet, **stīgas sēntiņa**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, bieži, skuju koku mežos, IX– X, H: HK, L: Krastiņa 2000.
- \**M. cyanipes* Godey, **zilkāta sēntiņa**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, koksnes saprotrofs, neēdama, reti, skuju koku mežos, VIII– X, H: DM, L: Avota 1996.
- M. epipterygia* (Scop.: Fr.) Gray, **stiepīgā sēntiņa**, nedzīvās zemsedzes un koksnes saprotrofs, neēdama, ļoti bieži, skuju koku un jauktos mežos, VIII– XI, H: DM, HK.

- M. filopes*** (Bull.: Fr.) P. Kumm. – *M. amygdalina* (Pers.) Singer, **smalkā sētiņa**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, neēdama, bieži, jauktos mežos, IX– XI, H: DM, HK.
- \* ***M. flavoalba*** (Fr.) Quél., **dzeltenbaltā sētiņa**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, neēdama, bieži, eglu un jauktos mežos, pļavās, VIII– X, H: DM, HK, L: Avota, Krastiņa 1994.
- \*\****M. floridula*** (Fr.) P. Karst. – *M. flavoalba* (Fr.) Quél. var. *floridula* (Fr.) Kühner & Romagn., **ziedu sētiņa**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, neēdama, reti, jauktos un skuju koku mežos, VIII– X, H: HK.
- M. galericulata*** (Scop.: Fr.) Gray, **ķiveres sētiņa**, koksnes saprotofs, neēdama, ļoti bieži, skuju koku un jauktos mežos, V– XI, H: DM, HK, RIG.
- M. galopus*** (Pers.: Fr.) P. Kumm. – *M. "galopoda"*, *M. leucogala* Cooke, **pienainā sētiņa**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, neēdama, ļoti bieži, jauktos mežos, VIII– XI, H: DM.
- M. haematopus*** (Pers.: Fr.) P. Kumm. – *M. "haematopoda"*, **asins sētiņa**, koksnes saprotofs, neēdama, ļoti bieži, lapu koku un jauktos mežos, VIII– X, H: DM, HK, RIG.
- \****M. hiemalis*** (Retz.) Quél., **vēlā sētiņa**, koksnes saprotofs, neēdama, bieži, lapu koku mežos, VII– IX, H: DM, L: Avota 1996.
- M. inclinata*** (Fr.) Quél., **noliektā sētiņa**, koksnes saprotofs, neēdama, bieži, lapu koku mežos, VIII– X, H: DM, HK.
- \****M. laevigata*** (Lasch: Fr.) Quél., **gludā sētiņa**, koksnes saprotofs, neēdama, reti, skuju koku un jauktos mežos, VIII– IX, H: DM, HK, L: Avota 1996.
- \*\****M. latifolia*** (Peck) A. H. Sm., **platlapīnu sētiņa**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, neēdama, ļoti reti, skuju koku un lapu koku mežos, IX– X, H: HK.
- M. leptcephala*** (Pers.: Fr.) Gillet – *M. chlorinella* (Lange) Singer – *M. ammoniaca* (Fr.: Fr.) Quél. ss. auct., **pelēkā sētiņa**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, neēdama, bieži, mežos, VIII– IX, H: DM, HK.

- \**M. lohwagii* Singer, **Lovaga sēntiņa**, herbotrofs, neēdama, ļoti reti, jauktos mežos, VI– VIII, H: DM, L: Avota 1994.
- \*\**M. longipes* Murill, **garkāta sēntiņa**, neēdama, ļoti reti, jauktos mežos, IX– X, H: HK.
- \*\**M. maculata* P. Karst., **plankumainā sēntiņa**, koksnes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, mežos uz koksnes kritalām, IX– X, H: RIG.
- M. megaspora* Kauffm. – *M. uracea* Pers., **dižsporu sēntiņa**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, bieži, purvājos, purvos, IX, H: HK.
- \**M. metata* (F.: Fr.) P. Kumm. – *M. phyllogena* (Pers.) Singer, **brūnsārtā sēntiņa**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, ļoti bieži, skuju koku un jauktos mežos, IX– XI, H: DM, HK, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- \*\**M. mirata* (Peck) Sacc., **mizas sēntiņa**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, jauktos mežos, VIII, H: DM.
- \**M. niveipes* (Murill) Murill, **pavasara sēntiņa**, koksnes saprotrofs, neēdama, bieži, lapu koku mežos, V– IX, H: DM, L: Avota 1992.
- \**M. nucicola* Huijsm., **riekstu sēntiņa**, nobiru saprotrofs, neēdama, reti, lapu koku mežos, VIII– X, H: DM, L: Avota 1996.
- \*\**M. olivaceomarginata* (Massee) Massee – *M. avenacea* (Fr.) Quél. ss. auct. – *M. plicosa* (Fr.) Kumm. ss. Ricken, **auzu sēntiņa**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, bieži, skuju koku mežos, V– X, H: DM, HK.
- \**M. pelianthina* (Fr.) Quél., **brūnvioletā sēntiņa**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, bieži, skuju koku un jauktos mežos, VIII– IX, H: DM, L: Avota 1996.
- M. polygramma* (Bull.: Fr.) Gray, **rievainā sēntiņa**, koksnes un nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, reti, skuju koku un jauktos mežos, VIII– IX, H: DM.
- M. pseudocorticola* Kühner, **zilganā sēntiņa**, koksnes un nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, ļoti bieži, lapu koku mežos, IX– I, H: DM, RIG.

- M. pterigena*** (Fr.: Fr.) P. Kumm., **paparžu sēntiņa**, herbotrofs, neēdama, bieži, mežos uz paparžu atliekām, IX– X, L: Urbonas et al. 1986.
- M. pura*** (Pers.: Fr.) P. Kumm., **dzidrā sēntiņa**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, ļoti bieži, skuju koku un jauktos mežos, VI– IX, H: DM, HK, RIG.
- \****M. purpureofusca*** (Peck) Sacc., **purpurbrūnā sēntiņa**, koksnes un nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, skuju koku mežos, X– XI, H: HK, L: Krastiņa 2000.
- \****M. renati*** Quél. – *M. flavipes* Quél. – *M. luteoalcalina* Singer non. ss. Kühner, **Renātes sēntiņa**, koksnes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VI– VIII, H: DM, L: Avota 1992.
- \****M. rorida*** (Scop.: Fr.) Quél., **glotkāta sēntiņa**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, reti, skuju koku mežos, X, H: DM, HK, L: Avota, Krastiņa 1994.
- M. rosea*** (Bull.) Gramberg – *M. pura* f. *rosea* (Schumach) Lange, **sārtā sēntiņa**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, bieži, skuju koku un jauktos mežos, VIII– X, H: DM, RIG.
- M. rosella*** (Fr.) P. Kumm., **rožainā sēntiņa**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, bieži, skuju koku mežos, egļu mežos, VIII– X, H: DM, HK, RIG.
- \****M. rubromarginata*** (Fr.: Fr.) P. Kumm., **sarkanmalu sēntiņa**, koksnes saprotrofs, neēdama, reti, egļu mežos, VIII– IX, H: DM, HK, L: Štolls, akvareļi 1913-1939.
- M. sanguinolenta*** (Alb. & Schwein.: Fr.) P. Kumm., **sarkanjoslu sēntiņa**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, ļoti bieži, mežos, VII– X, H: DM, HK.
- M. stipata*** Maas, Gest & Schwobel – *M. alcalina* (Fr.: Fr.) P. Kumm., **sārmainā sēntiņa**, koksnes saprotrofs, neēdama, bieži, skuju koku un jauktos mežos, VIII– IX, H: DM, RIG.
- \****M. strobilicola*** Favre & Kühner – *M. vernalis* S. Lundell, **čiekuru sēntiņa**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, bieži, egļu mežos, uz čiekuriem, IV– V, H: DM, HK, L: Avota, Krastiņa 1994.

- \**M. stylobates* (Pers.: Fr.) P. Kumm. – *M. clavularis* (Batsch.: Fr.) Sacc. ss.  
Lange, **paliktņa sētiņa**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, neēdama,  
reti, skuju koku un jauktos mežos, VIII– X, H: DM, HK, L: Krastiņa  
1990.
- \**M. tintinnabulum* (Fr.) Quél., **ziemas sētiņa**, koksnes saprotofs,  
neēdama, reti, jauktos mežos, X– II, H: DM, L: Avota 1995a.
- \* *M. viridimarginata* P. Karst., **zaļmalu sētiņa**, koksnes saprotofs,  
neēdama, bieži, priežu mežos, IX– X, H: HK, L: Krastiņa 2000.
- M. viscosa* Maire – *M. epipterygia* var. *viscosa* (Maire) Ricken, **lipīgā  
sētiņa**, koksnes saprotofs, neēdama, bieži, skuju koku un jauktos  
mežos, IX– XI, H: DM, RIG.
- M. vitilis* (Fr.) Quél., **pelēkbrūnā sētiņa**, nedzīvās zemsedzes saprotofs,  
koksnies saprotofs, neēdama, reti, skuju koku mežos, zālainās vietās,  
IX– X, H: DM.
- M. vulgaris* (Pers.: Fr.) P. Kumm., **parastā sētiņa**, nedzīvās zemsedzes  
saprotofs, neēdama, ļoti bieži, skuju koku mežos, IX– XII, H: DM.
- \**M. xantholeuca* Kühner, **dzeltenā sētiņa**, nedzīvās zemsedzes saprotofs,  
neēdama, ļoti reti, jauktos mežos, IX, H: DM, L: Avota 1996.
- M. zephyrus* (Fr.: Fr.) P. Kumm., **zefīra sētiņa**, nedzīvās zemsedzes  
saprotofs, neēdama, ļoti bieži, skuju koku mežos, VIII– XI, H: DM,  
HK.

#### *Naucoria* (Fr.) P. Kumm., riekstenītes

- \*\**N. bohemica* Velen., **Bohēmijas riekstenīte**, humusa saprotofs,  
neēdama, ļoti reti, mitros lapu koku mežos, skābās augsnēs, VIII– IX,  
H: HK.
- \*\**N. celluloderma* Orton., **caurspīdīgā riekstenīte**, nedzīvās zemsedzes  
saprotofs, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, IX– X, H: DM.
- N. escharoides* (Fr.: Fr.) P. Kumm. – *Alnicola melinoides* (Bull.: Fr.)  
Kühner, **medus riekstenīte**, nedzīvās zemsedzes saprotofs,  
neēdama, ļoti bieži, mitros alkšņu mežos, upju krastos, X– XI, H:  
DM.

- \**N. scolecina* (Fr.) Quél., **tumšbrūnā riekstenīte**, nedzīvās zemsedzes un humusa saprotofs, neēdama, ļoti bieži, mitros alkšņu mežos, IX– X, H: DM, L: Avota, Krastiņa 1994.
- \**N. sphagneti* Orton, **sīagnu riekstenīte**, briotrofs, neēdama, ļoti reti, priežu mežos, VIII, H: DM, L: Avota 1996.
- \*\**N. striatula* Orton, **rievotā riekstenīte**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, neēdama, reti, mitros alkšņu mežos, IX, H: DM.
- \**N. subconspersa* Kühner: Orton – *N. conspersa* (Pers.: Fr.) Kumm. ss. Lange, **sīkpārslu riekstenīte**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, neēdama, bieži, mitros alkšņu mežos, zālainās vietās, IX– X, H: DM, L: Avota 1996.
- \*\**N. submelinoides* (Kühner) Maire, **medainā riekstenīte**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, neēdama, bieži, mitros alkšņu mežos, upju krastos, IX, H: DM.

#### *Omphaliaster* Lamoure, **stardobītes**

- \*\**O. asterosporus* (Lange) Lamoure – *Omphalia asterosporus* Lange – *Clitocybe asterosporus* (Lange) M. M. Moser, **zvaigžņsporu stardobīte**, nedzīvās zemsedzes saprotofs, neēdama, reti, priežu mežos, IX– X, H: HK.
- O. obolus* (Fr.) Urbonas – *Clitocybe obolus* Fr., **naudiņas stardobīte**, mikorizas sēne, neēdama, reti, eglu mežos, IX– X, L: Urbonas et al. 1986.

#### *Omphalinina* Quél., **iedobītes**

- \**O. epichysium* (Pers.: Fr.) Quél., **koksnies iedobīte**, koksnes saprotofs, neēdama, reti, skuju koku mežos, IX– X, H: DM, L: Avota 1996.
- O. fusconigra* Orton s. M. M. Moser, **melnbrūnā iedobīte**, briotrofs, neēdama, ļoti reti, mežos, VIII– X, L: Urbonas et al. 1986.
- \**O. oniscus* (Fr.: Fr) Quél., **robotā iedobīte**, briotrofs, neēdama, reti, mežmalās, ceļmalās, IX– X, H: DM, HK, L: Kalamees, Vimba 1985.

\*\**O. pyxidata* (Bull.: Fr.) Quél., **caurspīdīgā iedobīte**, humusa saprotrofs, neēdama, reti, mežmalās, ceļmalās, uz mitras augsnēs, IX– X, H: DM, HK.

*O. rosella* (Lange) M. M. Moser – *Marasmiellus rosellus* (Lange) Kuyper & Noordel, **rožainā iedobīte**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, skuju koku mežos, IX– X, H: DM.

\**O. rustica* (Fr.) Quél., **pelēkā iedobīte**, humusa saprotrofs, neēdama, bieži, priežu mežos, smilšainās augsnēs, IX– X, H: DM, HK, L: Avota 1995a.

\**O. sphagnicola* (Berk.) M. M. Moser, **sfagnu iedobīte**, briotrofs, neēdama, ļoti bieži, sūnu purvos, VI– IX, H: DM, RIG, L: Avota, Krastiņa 1994.

*O. umbellifera* (L.: Fr.) Quél. – *O. ericetorum* (Fr.: Fr.) M. Lange, **silāju iedobīte**, nedzīvās zemsedzes un koksnes saprotrofs, neēdama, bieži, pārpurvotos mežos, V– X, H: DM, HK, RIG.

*O. umbratilis* (Fr.) Quél., **ēnu iedobīte**, humusa saprotrofs, neēdama, ļoti reti, sūnu purvos, VIII– XI, L: Urbonas et al. 1986.

#### *Panaeolina* Maire, svārsteklenes

*Panaeolina foeniseccii* (Pers.: Fr.) Maire – *Panaeolus foeniseccii* (Pers.: Fr.) Kühner, **siena svārsteklene**, humusa saprotrofs, neēdama, ļoti bieži, mežmalās, zālainās vietās, V– X, H: DM.

#### *Panaeolus* (Fr.) Quél., svārstenes

\**P. acuminatus* (Schaeff.) Quél. – *P. rickenii* Hora, **smailā svārstene**, koprotrofs, neēdama, ļoti bieži, ganībās, plavās, VI– X, H: DM, HK, L: Avota, Krastiņa 1994.

\* *P. alcidis* M. M. Moser, **aļņu svārstene**, koprotrofs, neēdama, ļoti reti, mežos, parkos, VII– IX, H: DM, HK, L: Avota 1996.

\* *P. ater* (Lange) Kühner & Romagn.: M. Lange, **tumšā svārstene**, humusa saprotrofs, neēdama, ļoti bieži, zālainās vietās, VI– XI, H: DM, L: Avota 1996.

- P. fimbicola* (Fr.) Quél., **mēslu svārstene**, koprotrofs, humusa saprotrofs, neēdama, bieži, ganībās, pļavās, V– IX, H: DM.
- P. fimiputris* (Bull.: Fr.) Quél. – *P. semiovatus* (With.: Fr.) S. Lundell & Nannf. – *Anellaria semiovatus* (Sowerby: Fr.) A. Pearson & Dennis, **pusoliņas svārstene, gredzenīte**, koprotrofs, neēdama, bieži, pļavās, zālainās vietās, V– X, H: DM.
- \**P. guttulatus* Bres., **pilošā svārstene**, humusa saprotrofs, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, IX, H: DM, L: Avota 1994.
- P. papilionaceus* (Bull.: Fr.) Quél., **tauriņu svārstene**, koprotrofs, humusa saprotrofs, neēdama, ļoti bieži, kultūraugsnēs, VI– X, L: Urbonas et al. 1986.
- P. sphinctrinus* (Fr.) Quél. – *P. campanulatus* (L.: Fr.) Quél. ss. auct., **zvana svārstene**, humusa saprotrofs, koprotrofs, neēdama, ļoti bieži, ganībās, pļavās, V– X, H: DM, HK, RIG.

#### *Panellus* P. Karst., **pundurkamolenes**

- P. mitis* (Pers.: Fr.) Singer – *Pleurotus mitis* (Pers.) Fr., **maigā pundurkamolene**, koksnes saprotrofs uz priedes kritām, neēdama, ļoti bieži, skuju koku mežos, VIII– XII, H: DM, HK, RIG.
- P. ringens* (Fr.) Romagn., **izplestā pundurkamolene**, koksnes saprotrofs uz vītolu kritām, neēdama, bieži, lapu koku mežos, IX– II, H: DM, RIG.
- P. serotinus* (Schrad.: Fr.) Kühner – *Pleurotus serotinus* (Schrad.) Fr., **vēlā pundurkamolene**, koksnes saprotrofs, neēdama, bieži, mežos, VII– I, H: DM, HK, RIG.
- P. stypticus* (Bull.: Fr.) P. Karst., **sūrā pundurkamolene**, koksnes saprotrofs, neēdama, ļoti bieži, mežos, VI– X, H: DM, RIG.
- P. violaceofulvus* (Batsch.: Fr.) Singer, **violetā pundurkamolene**, koksnes saprotrofs uz iervas kritām, neēdama, reti, lapu koku mežos, XI– I, L: Urbonas et al. 1986.

***Paxillus* Fr., mietenes**

*P. atrotomentosus* (Batsch.: Fr.) Fr., **samtainā mietene**, koksnes saprotrofs, ēdama, bieži, skuju koku un jauktos mežos, VII– X, H: DM, RIG.

\**P. filamentosus* (Scop.) Fr., **alkšņu mietene**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, mitros alkšņu mežos, VIII– IX, H: DM, L: Avota, Krastiņa 1994..

*P. involutus* (Batsch: Fr.) Fr., **kailā mietene**, mikorizas sēne, neēdama, ļoti bieži, mežos, VI– IX, H: DM, RIG.

*P. panuoides* (Fr.: Fr.) Fr., **kamoleļu mietene**, koksnes saprotrofs, neēdama, reti, skuju koku mežos, VII– X, H: DM, RIG.

***Phaeolepiota* Maire, brūnsardzenes**

*Ph. aurea* (Matt.: Fr.) Maire: Konrad & Maubl., **zelta brūnsardzene**, humusa un nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, bieži, mežmalās, krūmājos, ceļmalās, IX– XI, H: DM, RIG.

***Phaeocollybia* R. Heim., skrimalenes**

*Ph. christinae* (Fr.) R. Heim, **Kristīnes skrimalene**, nedzīvās zemsedzes un koksnes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, skuju koku mežos, IX– XI, L: Urbonas et al. 1986.

\**Ph. lugubris* (Fr.) R. Heim, **lipīgā skrimalene**, humusa saprotrofs, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VII, H: DM, L: Štolls, akvareļi 1913-1939.

***Phaeogalera* Kühner, kiverītes**

*Ph. oedipus* (Cooke) Romagn., **Edipa kiverīte**, neēdama, reti, lapu koku un jauktos mežos, IV– VII, H: DM, RIG.

***Phaeomarasmius* Scherff., tumšvītenes**

\**Ph. erinaceus* (Fr.) Kühner, **ežu tumšvītene**, koksnes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VIII– IX, H: DM, L: Avota 1996.

***Pholiota* P. Kumm., zvīnenes**

***Ph. alnicola* (Fr.) Singer – *Flammula alnicola* Fr., alkšņu zvīnene**, koksnes saprotrofs, neēdama, bieži, lapu koku mežos, VIII– X, H: DM, HK.

\****Ph. astragalina* (Fr.: Fr.) Singer, safrāna zvīnene**, koksnes saprotrofs, neēdama, reti, skuju koku mežos, VII– X, H: DM, L: Avota 1996.

***Ph. aurivellus* (Batsch: Fr.) P. Kumm. – *P. adiposa* ss. Fr. – *P. cerifera* (P. Karst.) P. Karst., zeltainā zvīnene**, koksnes saprotrofs, ēdama, bieži, lapu koku mežos, VII– X, H: DM, HK, RIG.

\*\****Ph. conissans* (Fr.) M. M. Moser – *P. graminis* (Quél.) Singer, vītolu zvīnene**, koksnes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VII– IX, H: DM.

***Ph. flammans* (Batsch.: Fr.) P. Kumm., liesmainā zvīnene**, koksnes saprotrofs, neēdama, bieži, skuju koku mežos, VII– X, H: DM, HK, RIG.

***Ph. flava* (Schaeff.: Fr.) Singer, iedzeltenā zvīnene**, koksnes saprotrofs, neēdama, bieži, skuju koku mežos, VIII– X, H: DM.

***Ph. gummosa* (Lasch) Singer, zalganā zvīnene**, koksnes saprotrofs, neēdama, reti, lapu koku mežos, VIII– X, H: DM, RIG.

\****Ph. heteroclita* (Fr.: Fr.) Quél., smaržīgā zvīnene**, koksnes saprotrofs, ēdama, reti, lapu koku mežos, VIII– XII, H: DM, L: Avota 1994.

***Ph. highlandiensis* (Peck) Smith & Hesler – *P. carbonaria* (Fr.: Fr.) Singer – *Flammula carbonaria* (Fr.) Quél., oglu zvīnene**, karbotrofs, neēdama, ļoti bieži, degumos, V– X, H: DM, HK, RIG.

***Ph. jahnii* Tjall. & Bas – *P. adiposa* (Batsch: Fr.) P. Kumm. ss. Ricken, Lange, glotainā zvīnene**, koksnes saprotrofs, ēdama, reti, lapu koku mežos, VI– X, H: DM.

\****Ph. lenta* (Pers.: Fr.) Singer, mālubālā zvīnene**, koksnes un nedzīvās zemsedzes saprotrofs, ēdama, bieži, lapu koku mežos, VIII– X, H: DM, HK, RIG, L: Kalamees, Vimba 1885.

\****Ph. limonella* (Peck) Sacc. – *P. squarrosoadiposa* Lange, citrondzeltenā zvīnene**, koksnes saprotrofs, ēdama, reti, lapu koku mežos, VIII– IX, H: DM, L: Avota 1994.

***Ph. lubrica*** (Pers.: Fr.) Singer – *P. decussata* (Fr.) M. M. Moser, **glumā zvīnene**, koksnes un nobiru saprotrofs, neēdama, bieži, mežos, VIII– X, H: DM, HK, RIG.

\****Ph. mixta*** (Fr.) Singer, **jauktā zvīnene**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, reti, skuju koku mežos, VIII– X, H: DM, L: Avota, Krastiņa 1994.

***Ph. populnea*** (Pers.: Fr.) Kuyper & Tjall – *P. destruens* (Brond.) Gillet, **papeļu zvīnene**, koksnes saprotrofs uz apšu un papeļu kritālām, neēdama, reti, lapu koku un jauktos mežos, VIII– X, H: DM, RIG.

\****Ph. scamba*** (Fr.: Fr.) M. M. Moser, **zīdainā zvīnene**, koksnes saprotrofs uz priedes kritālām, neēdama, reti, skuju koku mežos, IX– X, H: DM, HK, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

***Ph. spumosa*** (Fr.) Singer – *Flammula spumosa* Fr., **putainā zvīnene**, nedzīvās zemsedzes un koksnes saprotrofs, neēdama, bieži, skuju koku mežos, VIII– X, H: DM, HK.

***Ph. squarrosa*** (Weigel.: Fr.) P. Kumm., **spurainā zvīnene**, koksnes saprotrofs, ēdama, loti bieži, mežos, IX– XI, H: DM, HK, RIG.

***Ph. squarrosoides*** (Peck) Sacc., **izspūrusī zvīnene**, koksnes saprotrofs, neēdama, reti, lapu koku mežos, VIII– IX, H: DM.

\****Ph. tuberculosa*** (Schaeff.: Fr.) P. Kumm. – *P. curvipes* (Pers.) Quél. – *P. lucifera* (Lasch) Quél., **kuprainā zvīnene**, koksnes saprotrofs, neēdama, reti, lapu koku mežos, VIII– X, H: DM, L: Avota 1996.

#### ***Phyllotopsis* (Gilb. & Donk) Singer, puslocenes**

***Ph. nidulans*** (Pers.: Fr.) Singer – *Pleurotus nidulans* (Pers.) Fr., **oranžā puslocene**, koksnes saprotrofs, ēdama, bieži, mežos, VIII– XI, H: DM, RIG.

#### ***Pleurocybella* Singer, karotenes**

***Pleurocybella porrigens*** (Pers.: Fr.) Singer – *Notophanus porrigens* (Pers.: Fr.) Singer, **mirdzošā karotene**, koksnes saprotrofs, neēdama, reti, skuju koku mežos, IX– X, L: Urbonas et al. 1986.

**Pleurotellus** Fayod, **pundursēdenes**

- \**P. hypnophilus* (Berk.) Fayod, **sūnu pundursēdene**, briotrofs, herbotrofs, neēdama, bieži, mežos, IX– X, H: DM, L: Avota 1995a.
- \**P. patelloides* Orton, **baltā pundursēdene**, herbotrofs, neēdama, reti, mežos, VIII– X, H: DM, L: Avota 1996.

**Pleurotus** (Fr.) P. Kumm., **sānauses**

*P. calyptatus* (Lindbl.) Sacc., **aizsegta sānause**, koksnes saprotrofs uz apses kritālām, neēdama, ļoti reti, mežos, parkos, V–VIII, H: DM, RIG.

*P. cornucopiae* (Paul.: Pers.) Roll., **rievainā sānause**, koksnes saprotrofs, ēdama, reti, lapu koku mežos, VIII– XI, H: DM, RIG.

*P. dryinus* (Pers.: Fr.) P. Kumm. – *Pleurotus corticatus* Fr., **ozolu sānause**, koksnes saprotrofs, ēdama, reti, lapu koku mežos, VII– XI, H: DM, RIG.

*P. ostreatus* (Jacq.: Fr.) P. Kumm., **austeru sānause**, **austersēne**, koksnes saprotrofs, parazīts, ēdama, ļoti bieži, mežos, parkos, VI– XII, H: DM, RIG.

*P. salignus* (Pers.: Fr.) P. Kumm. – *P. ostreatus* var. *salignus* (Pers.: Fr.) Konrad & Maubl., **vītolu sānause**, koksnes saprotrofs, ēdama, bieži, lapu koku mežos, VIII– XI, H: DM.

\**P. pulmonarius* (Fr.) Quél., **dzeltējošā sānause**, koksnes saprotrofs, ēdama, lapu koku mežos, VIII– X, H: DM, RIG, L: Lūkins, 1979.

**Pluteus** Fr., **jumtenes**

*P. cervinus* (Schaeff.) P. Kumm. – *P. atricapillus* (Batsch) Fayod, **briežu jumtene**, koksnes saprotrofs, ēdama, ļoti bieži, lapu koku un jauktos mežos, V– XI, H: DM, HK, RIG.

\**P. chrysophaeus* (Schaeff.) Quél. – *P. xanthophaeus* Orton, **iedzeltenā jumtene**, koksnes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VIII– X, H: DM, L: Avota 1994.

- \*\**P. cinereofuscus* Lange, **dūmainā jumtene**, koksnes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VIII– IX, H: DM.
- \**P. depauperatus* Romagn., **trauslā jumtene**, humusa un nobiru saprotrofs, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VII– VIII, H: DM, L: Avota 1993.
- \**P. dietrichii* Bres. – *P. rimulosus* Kühner & Romagn., **Dītriha jumtene**, koksnes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, jauktos mežos, VIII, H: DM, L: Avota 1994.
- P. drepanophyllus* (Schulz.) Singer, **sirpjlapīņu jumtene**, koksnes un nobiru saprotrofs, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VIII– IX, L: Urbonas et al. 1986.
- \**P. exiguum* (Pat.) Sacc., **sīkā jumtene**, koksnes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VIII, H: DM, L: Avota 1996.
- \**P. godeyi* Gillet, **Godē jumtene**, koksnes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VIII– IX, H: DM, L: Avota 1996.
- P. leoninus* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm., **lauvu jumtene**, koksnes saprotrofs, ēdama, bieži, mežos, VII– IX, H: DM, HK, RIG.
- P. luteovirens* Rea, **zaļgandzeltenā jumtene**, koksnes saprotrofs uz apses kritālām, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, IX, H: DM, RIG.
- P. nanus* (Pers.: Fr.) P. Kumm., **pundura jumtene**, koksnes saprotrofs, neēdama, bieži, lapu koku mežos, VII– X, H: DM.
- P. pellitus* (Pers.: Fr.) P. Kumm., **baltā jumtene**, koksnes saprotrofs, ēdama, reti, lapu koku mežos, V– IX, L: Urbonas et al. 1986.
- P. petasatus* (Fr.) Gillet – *P. patricius* (Scultzer) Boud., **zvīñainā jumtene**, koksnes saprotrofs, ēdama, bieži, lapu koku mežos, V– IX, H: DM.
- \**P. phlebophorus* (Ditmar: Fr.) P. Kumm., **dzīslotā jumtene**, humusa saprotrofs, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VIII– IX, H: DM, L: Avota 1996.
- \**P. plautus* (Weinm.) Gillet, **samtikāta jumtene**, nobiru saprotrofs, ēdama, ļoti reti, eglu mežos, VIII– IX, H: DM, L: Avota 1994.

- \**P. pseudoroberti* M. M. Moser & Stangl., **tumšzvīņu jumtene**, koksnes saprotofs, ēdama, reti, jauktos mežos, VIII– IX, H: DM, L: Avota 1994.
- \**P. romellii* (Britzelm.) Sacc. – *P. lutescens* (Fr.) Bres., **Romella jumtene**, koksnes saprotofs, neēdama, bieži, lapu koku mežos, VII– IX, H: DM, HK, L: Avota 1994.
- P. salicinus* (Pers.: Fr.) P. Kumm., **vītolu jumtene**, koksnes saprotofs, ēdama, reti, lapu koku mežos, VII– X, H: DM.
- \**P. semibulbosus* (Lasch) Gillet – *P. gracilis* (Bres.) Lange, **sīpolā jumtene**, koksnes saprotofs, neēdama, bieži, lapu koku mežos, VIII– IX, H: DM, L: Avota 1994.
- P. triscupidatus* Velen. – *P. atromarginatus* (Singer) Kühner & Romagn., **melnskropstu jumtene**, koksnes saprotofs, ēdama, bieži, skuju koku mežos, VII– X, H: DM, HK.
- P. umbrosus* (Pers.: Fr.) P. Kumm., **ēnainā jumtene**, koksnes saprotofs, ēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VIII– X, L: Urbonas et al. 1986.

#### *Porphyrellus* Gilb., **tumšbekas**

*Porphyrellus porphyrosporus* (Fr.) Gilb. – *P. pseudoscaber* (Secr.) Singer, **raupjā tumšbeka**, mikorizas sēne, neēdama, ļoti reti, skuju koku un jauktos mežos, skābās augsnēs, VIII– IX, H: DM, RIG.

#### *Psathyrella* (Fr.) Quél., **spīgulītes**

*P. ammophila* (Durieu & Lv.) Orton, **smilšu spīgulīte**, humusa saprotofs, neēdama, reti, kāpās, smilšainās augsnēs, VIII– X, H: DM, HK, RIG.

*P. atomata* (Fr.: Fr.) Quél. – *P. prona* (Fr.) Gillet, **graudainā spīgulīte**, humusa saprotofs, neēdama, bieži, mežmalās, ceļmalās, pļavās, zālainās vietās, V– X, H: DM.

\**P. bifrons* (Berk.) A. H. Sm. s. Ricken, **krokainā spīgulīte**, koksnes saprotofs, neēdama, reti, lapu koku mežos, parkos, dārzos, ceļmalās, VIII– X, H: DM, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.

- \*\**P. bipellis* (Quél.) A. H. Sm. – *P. corrugis* Pers. ss Ricken, **purpurbrūnā spīgulīte**, humusa saprotrofs, neēdama, reti, jauktos mežos, ceļmalās, V–VI, H: DM.
- P. candoleana* (Fr.: Fr.) Maire – *Hypholoma candoleanum* Fr., **Kandola spīgulīte**, humusa un nedzīvās zemsedzes saprotrofs, ēdama, ļoti bieži, lapu koku un jauktos mežos, parkos, trūdvielām bagātās augsnēs, zālainās vietās, V–X, H: DM, RIG.
- \**P. canocephs* (Kauffm.) A. H. Sm., **drebošā spīgulīte**, humusa saprotrofs, neēdama, ļoti reti, jauktos mežos, IX, H: DM, L: Avota 1994.
- \**P. casca* (Fr.) Konrad & Maubl. – *P. pseudocasca* Romagn., **rūsgandzeltenā spīgulīte**, nedzīvās zemsedzes un humusa saprotrofs, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VIII–IX, H: DM, L: Avota 1996.
- \**P. cernua* (Vahl.: Fr.) Hirsch, **nokarenā spīgulīte**, koksnes saprotrofs, neēdama, bieži, lapu koku mežos, IX–XI, H: DM, L: Avota 1996.
- P. conopilus* (Fr.: Fr.) A. Pearson & Dennis – *P. subatrata* (Batsch.) Gill., **smailā spīgulīte**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, reti, lapu koku mežos, dārzos, parkos, trūdvielām bagātās augsnēs, V–VIII, H: DM.
- P. corrugis* (Pers.: Fr.) Konrad & Maubl. – *P. gracilis* (Fr.) Quél., **rievainā spīgulīte**, nedzīvās zemsedzes un humusa saprotrofs, neēdama, bieži, parkos, lapu koku mežos, VIII–XI, H: DM, RIG.
- \**P. cystidiosa* (Peck) A. H. Sm., **pūšlainā spīgulīte**, humusa saprotrofs, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, IX, H: DM, L: Avota 1996.
- P. fatua* (Fr.) Konrad & Maubl., **spožā spīgulīte**, humusa saprotrofs, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, V–VIII, H: DM.
- \**P. flexispora* Orton, **līksporu spīgulīte**, humusa saprotrofs, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VIII, H: DM, L: Avota 1994.
- \*\**P. frustulenta* (Fr.) A. H. Sm. – *P. cortinarioides* Orton, **palsā spīgulīte**, humusa saprotrofs, neēdama, ļoti reti, jauktos mežos, ceļmalās, X, H: DM.

- \*\**P. gordoni* (Berk. & Broome) A. Pearson & Dennis, **Gordona spīgulīte**, koksnes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, V– X, H: DM.
- P. gossypina* (Bull.: Fr.) A. Pearson & Dennis – *Psathyra gossypina* (Bull.) Fr., **kokvilnas spīgulīte**, karbotrofs, neēdama, reti, degumos, V– X, H: DM.
- P. hirtosquamulosa* (Peck) A. H. Sm., **cirtainā spīgulīte**, koksnes saprotrofs uz ošu kritālām, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, IX, L: Urbonas et al. 1986.
- P. lacrimabunda* (Bull.: Fr.) M. M. Moser – *Lacrymaria lacrimabunda* (Bull.: Fr.) Pat. – *P. velutina* (Pers.: Fr.) Singer – *Hypholoma lacrimabundum* (Bull.) Fr., **samtainā spīgulīte**, humusa saprotrofs, neēdama, ļoti bieži, mežmalās, ceļmalās, lapu koku mežos, zālainās vietās, VIII– X, H:DM, HK.
- P. marcescibilis* (Britzelm.) Singer, **vīstošā spīgulīte**, humusa saprotrofs, neēdama, reti, lapu koku mežos, krūmājos, VIII– X, H: DM.
- \*\**P. microrhiza* (Lasch: Fr.) Konrad & Maubl., **tiefsaknes spīgulīte**, humusa saprotrofs, neēdama, ļoti reti, mežos, zālainās vietās, IX, H: DM.
- \**P. minutissima* Kits v. Wav., **sīkā spīgulīte**, koksnes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, upju krastos, dūņās, V– X, H: DM, L: Avota 1995.
- \**P. multipedata* (Peck) A. H. Sm., **čemuru spīgulīte**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, reti, lapu koku mežos, parkos, IX– X, H: DM, L: Avota 1994.
- \**P. nolitangere* (Fr.) A. Pearson & Dennis., **springaņu spīgulīte**, humusa saprotrofs, neēdama, reti, mežos, ganībās, dārzos, V, H: DM, L: Avota 1994.
- \*\**P. obtusata* (Pers.: Fr.) A. H. Sm., **ozolu spīgulīte**, humusa saprotrofs, neēdama, bieži, mežmalās, lapu koku mežos, V– IX, H: DM.

- \**P. ocellata* (Romagn.) M. M. Moser, **acu spīgulīte**, humusa un nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, mežos, ceļmalās, VIII– IX, H: DM, L: Avota 1996.
- \**P. panaeoloides* (Maire) Arnolds, **svārsteņu spīgulīte**, humusa saprotrofs, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, IX, H: DM, L: Avota 1996.
- P. pennata* (Fr.) Konrad & Maubl., **ogļu spīgulīte**, karbotrofs, neēdama, ļoti reti, degumos, VI– IX, H: DM.
- \**P. pervelata* Kits. v. Wav., **baltmalas spīgulīte**, humusa saprotrofs, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VIII– X, H: DM, L: Avota 1996.
- \**P. piluliformis* (Bull.: Fr.) Orton – *P. hydrophyla* (Bull.: Fr.) Maire, **ūdeņainā spīgulīte**, koksnes saprotrofs, ēdama, bieži, lapu koku mežos, IX– X, H: DM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913–1939.
- P. populina* (Britzelm.) Kits v. Wav. – *P. sylvestris* (Gill.) M. M. Moser, **apšu spīgulīte**, koksnes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, IX, H: DM.
- \**P. pygmaea* (Bull.: Fr.) Singer, **pundura spīgulīte**, koksnes saprotrofs, neēdama, reti, mitros lapu koku mežos, VI– VII, H: DM, RIG, L: Avota 1996.
- \**P. sarcocephala* (Fr.) Singer, **kakaobrūnā spīgulīte**, koksnes saprotrofs, ēdama, bieži, lapu koku mežos, IX– X, H: DM, L: Avota 1996.
- P. semivestita* (Berk. & Broome) A. H. Sm., **sarkanbrūnā spīgulīte**, humusa saprotrofs, neēdama, ļoti reti, pļavās, VIII– IX, H: DM.
- P. spadicea* (Schaeff.) Singer, **kastaņbrūnā spīgulīte**, koksnes saprotrofs, ēdama, bieži, lapu koku mežos, IX– XI, H: DM.
- \*\**P. spadiceogrisea* (Schaeff.) Maire, **brūnpelēkā spīgulīte**, humusa un koksnes saprotrofs, neēdama, reti, lapu koku mežos, V– IX, H: DM.
- \*\**P. sphagnicola* (Maire) Favre, **sfagnu spīgulīte**, mikotrofs, neēdama, ļoti reti, priežu mežos, parkos, IX– X, H: HK.
- \**P. spintrigera* (Fr.) Konrad & Maubl., **gredzenotā spīgulīte**, nedzīvās zemsedzes un koksnes saprotrofs, neēdama, reti, lapu koku mežos, IX– X, H: DM, L: Avota 1996.

- \**P. spintrigeroides* Orton, **sīkgredzena spīgulīte**, koksnes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, IX, H: DM, L: Avota 1996.
- P. subnuda* (P. Karst.) A. H. Sm., **puskailā spīgulīte**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, lapu koku un jauktos mežos, VI– IX, L: Urbonas et al. 1986.
- P. typhae* (Kalchbr.) A. Pearson & Dennis, **vilkvālīšu spīgulīte**, herbotrofs uz vilkvālīšu atliekām, neēdama, ļoti reti, mitrās pļavās, V– VII, H: DM.
- \**P. vernalis* (Lange) M. M. Moser, **pavasara spīgulīte**, humusa un nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, bieži, skuju koku mežos, IV– V, H: DM, L: Avota 1996.

#### *Pseudoclitocybe* (Singer) Singer, **skaistgalvenes**

- P. cyathiformis* (Bull.: Fr.) Singer, – *Clitocybe cyathiformis* (Bull.) Fr., **kausveida skaistgalvene**, humusa saprotrofs, ēdama, bieži, skuju koku un jauktos mežos, VIII– XII, H: DM, RIG.
- \**P. obbata* (Fr.) Singer, **rūsganā skaistgalvene**, humusa saprotrofs, neēdama, ļoti reti, skuju koku mežos, X, H: DM, L: Avota 1996.

#### *Psilocybe* (Fr.) Quél., **kailgalves**

- P. coprophila* (Bull.: Fr.) P. Kumm., **trūdu kailgalve**, koprotrofs, neēdama, reti, ganībās, VII– X, H: DM.
- \**P. crobula* (Fr.) M. Lange: Singer – *P. inquilina* var. *crobulus* (Fr.) Hoiland, **baltpārslu kailgalve**, koksnes saprotrofs, neēdama, reti, mežos, VIII– X, H: DM, HK, L: Avota, Krastiņa 1994.
- \**P. inquilina* (Fr.: Fr.) Bres., **lipīgā kailgalve**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, koksnes saprotrofs, neēdama, reti, mežos, dārzos, VIII– XI, H: DM, HK, L: Avota, Krastiņa 1994.
- \**P. merdaria* (Fr.) Ricken, **mēslu kailgalve**, koprotrofs, neēdama, reti, ganībās, dārzos, VI– IX, H: DM, L: Avota 1996.
- P. montana* (Pers.: Fr.) P. Kumm., **kalnu kailgalve**, humusa saprotrofs, neēdama, ļoti bieži, sausās pļavās, zālainās vietās, V– IX, H: DM, HK.

\**P. muscorum* (Orton) M. M. Moser, **sūnu kailgalve**, humusa saprotrofs, neēdama, bieži, sausās pļavās, IX– X, H: DM, L: Avota 1994.

\**P. semilanceata* (Fr.) P. Kumm., **smailā kailgalve**, humusa saprotrofs, neēdama, ļoti reti, pļavās, IX– X, H: DM, L: Avota 1996.

#### ***Ramicola* Velen., ramikolas**

\**R. centunculus* (Fr.: Fr.) Watling – *Simocybe centunculus* (Fr.) Singer, **sīksporu ramikola**, koksnes saprotrofs, neēdama, bieži, lapu koku mežos, VII– X, H: DM, HK, L: Avota 1996.

\*\**R. haustellaris* (Fr.: Fr.) Watling – *Simocybe rubi* (Berk.) Singer, **lipīgā ramikola**, koksnes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, IX– X, H: DM, HK.

\**R. sumptuosa* (Orton) Watling – *Simocybe sumptuosa* (Orton) Singer, **rievotā ramikola**, koksnes saprotrofs, neēdama, reti, lapu koku mežos, IX– X, H: DM, L: Avota 1996.

#### ***Rhodocybe* Maire, sārtgalves**

\**R. nitellina* (Fr.: Fr.) Raithel., **spožā sārtgalve**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, ēdama, reti, jauktos mežos, VIII– X, H: DM, L: Avota 1994.

\**R. gemina* (Fr.) Kuyper & Noordel. – *R. truncata* (Schaeff.) Singer: Bon, **nošķeltā sārtgalve**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, ēdama, ļoti reti, jauktos mežos, IX– XI, H: DM, L: Avota 1996.

#### ***Rhodotus* Maire, sārtaines**

\**R. palmatus* (Bull.: Fr.) Maire, **vēdeklā sārtaine**, koksnes saprotrofs uz gobas un vīksnas koksnes, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VIII– XI, H: DM, RIG, L: Avota 1994.

**Rhizopogon** Fr., **jumjupūpēži**

- \***R. obtusus** (Spreng.) Rauschert – *R. luteolus* Fr., **iedzeltenais jumjupūpēdis**, ēdams, bieži, smilšainos priežu mežos, VII– X, H: DM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913-1939.
- \***R. roseolus** (Corda) Th. Fr. : Fr., **iesārtais jumjupūpēdis**, ēdams, bieži, smilšainos priežu mežos, VII– X, H: DM, RIG, L: Štolls, akvareļi 1913-1939.

**Rickinella** Raithel., **rikinellas**

- R. fibula** (Bull.: Fr.) Raithel. – *Gerronema fibula* (Bull.: Fr.) Singer – *Omphalina fibula* (Bull.: Fr.) Quél., **sprādzes rikinella**, briotrofs, neēdama, ļoti bieži, mežos, mitrās pļavās, VII– X, H: DM, HK.
- \***R. setipes** (Fr.: Fr.) Raithel. – *Gerronema setipes* (Fr.: Fr.) Singer – *Omphalina setipes* (Fr.: Fr.) Quél. – *Mycena swartzii* (Fr.) A. H. Sm. **sarainā rikinella**, briotrofs, neēdama, bieži, skuju koku mežos, VIII– IX, H: DM, HK, L: Avota, Krastiņa 1994.

**Ripartites** P. Karst., **krastaines**

- \***R. serotinus** Einhellinger, **atvasaras krastaine**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, mežos, VIII, H: DM, L: Avota 1996.
- \***R. tricholoma** (Alb. & Schwein.: Fr.) P. Karst. – *R. strigiceps* (Fr.) P. Karst. **pūkaiņu krastaine**, nedzīvās zemsedzes un humusa saprotrofs, neēdama, bieži, mitros skuju koku un jauktos mežos, VIII– X, H: DM, L: Avota 1994.

**Rozites** P. Karst. **čigānenes**

- Rozites caperata** (Pers.: Fr.) P. Karst., **cirtainā čigānene**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, priežu mežos, VIII– X, H: DM.

**Russula** Pers.: S. F. Gray **bērzlapes**

- \***R. acrifolia** Romagn., **sīvlapīņu bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, mežos, IX, H: HA, RIG, L: Amoliņš 1985.

- \* *R. adulterina* Fr. f. *colorata* J. Blum, **raženā bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, skuju koku mežos, kaļķainās augsnēs, VII– X, H: HA, L: Amoliņš 1992.
- R. adusta* (Pers.: Fr.) Fr., **tumšā bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, skuju koku mežos, smilšainās augsnēs, VII– X, H: DM, HA.
- \* *R. adusta* f. *sabulosa* R. Heim & J. Blum, mikorizas sēne, ēdama, bieži, smilšainos skuju koku mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1992.
- R. aeruginea* Lindblad, **zilzaļā bērzlape**, bērzu mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, mežos, VII– X, H: DM, HA.
- \**R. albonigra* (Krombh.) Fr. **melnbaltā bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, reti, mežos, VII–IX, H: DM, HA, L: Amoliņš 1992.
- R. alutacea* (Pers.: Fr.) Fr., **ādasdzeltenā bērzlape**, ozolu un dižskābaržu mikorizas sēne, ēdama, reti, lapu koku mežos, kaļķainās augsnēs, VII– XI, H: HA.
- \**R. amethystina* Quél., **ametista bērzlape**, eglu mikorizas sēne, ēdama, reti, eglu mežos, VII– IX, H: HA, RIG, L: Amoliņš 1992.
- \**R. amoenides* Romagn., **krāšņā bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1996.
- \**R. amoenipes* Romagn., **skaistkāta bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, priežu mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1992.
- \**R. anthracina* Romagn., **sārtlapīņu bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, reti, mitros mežos, IX– X, H: HA, L: Amoliņš 1985.
- \**R. anthracina* f. *densissima* Romagn. mikorizas sēne, ēdama, bieži, smilšainos priežu mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1992.
- \**R. anthracina* var. *insipida* Romagn., mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1992.
- \**R. aquosa* Leclair, **ūdeņainā bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, reti, purvainos skuju koku mežos, VII– IX, H: HA, HK, L: Amoliņš 1992.

- R. atropurpurea** (Krombh.) Britzelm. – **R. undulata** Velen., **purpurmelnganā bērzlape**, ozolu mikorizas sēne, ēdama, reti, mežos, parkos, VI– X, H: HA, HK.
- \**R. atropurpurea* Krombh. var. *alutaceomaculata* (Britzelm.) Singer, mikorizas sēne, ēdama, reti, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1992.
- \* *R. atropurpurea* Krombh. var. *depallens* (Fr.) Maire., mikorizas sēne, ēdama, reti, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1992.
- \**R. atropurpurea* var. *rubripes* Singer, mikorizas sēne, ēdama, reti, mežos, kaļķainās augsnēs, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1992.
- \***R. atrorubens** Quél., **sarkanmelnā bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, reti, mitros skuju koku mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1992.
- \***R. aurantiaca** J. Schaeff., **oranžsārtā bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, reti, lapu koku mežos, VII– IX, H: HA, RIG, L: Amoliņš 1992.
- R. aurata** (With.) Fr. – **R. aurea** Pers., **zeltainā bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, reti, jauktos mežos, kaļķainās augsnēs, VIII– IX, H: DM, HA.
- R. azurea** Bres., **zilā bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, reti, skuju koku mežos, skābās augsnēs, VIII– X, H: DM.
- \***R. badia** Quél., **purpurbrūnā bērzlape**, priežu un egļu mikorizas sēne, neēdama, bieži, priežu mežos, VIII– X, H: DM, HA, L: Amoliņš 1992.
- \***R. barlae** (Schaeff.) Fr., **Barla bērzlape**, ozolu mikorizas sēne, īoti reti, lapu koku mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1996.
- \***R. brevipes** Peck var. *acrior* Schaeff., **īskāta bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, īoti reti, priežu mežos, VII– IX, H: DM, HA, L: Amoliņš 1996.
- \***R. brunneoviolacea** Crw., **brūnvioletā bērzlape**, ozolu un liepu mikorizas sēne, ēdama, reti, lapu koku mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1992.

- \**R. caerulea* (Pers.) Fr. ss. Cokee., **paugura bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, reti, priežu mežos, zālainās, sūnainās vietās, VIII– IX, H: HA, RIG, L: Amoliņš 1992.
- \**R. carminea* Schaeff. ss. J. Blum, **karmīna bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, mežos, VII– IX, H: DM, HA, L: Amoliņš 1992.
- \**R. cessans* A. Pearson ss. Romagn., **vēlā bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, skuju koku mežos, VIII– X, H: DM, HA, HK, L: Amoliņš 1992.  
 \**R. cessans* f. *schaefferiana* Niolle, mikorizas sēne, ēdama, reti, IX– X, H: HA, L: Amoliņš 1996.
- \**R. chamaeleontina* Fr. f. *lutea* Huds.: Fr., **mazā dzeltenā bērzlape**, ozolu mikorizas sēne, ēdama, reti, lapu koku mežos, VII– IX, H: DM, HA, L: Amoliņš 1992.  
 \**R. chamaeleontina* Fr. var. *ochracea* ss. Bres., mikorizas sēne, ēdama, reti, jauktos mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1996.
- \**R. chlorantha* Zvára & Schaeff., **zaļdzeltenā bērzlape**, ozolu mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, trūdvielām bagātās augsnēs, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1992.
- \**R. chloroides* Krombh. – *R. delica* var. *chloroides* Krombh., **mentola bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, reti, lapu koku mežos, VIII– IX, H: HA, RIG, L: Amoliņš 1992.  
 \**R. chloroides* Krombh. var. *parvispora* Romagn., mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1996.
- \**R. cicatricata* Romagn., **rētainā bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, parkos, VII– XI, H: HA, L: Amoliņš 1992.
- R. claroflava* Grove – *R. flava* (Romell) Romell, **dzeltenā bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, mitros lapu koku mežos, VII– X, H: DM, HA, HK.
- R. consobrina* Fr.: Fr.) Fr., **kūmu bērzlape**, mikorizas sēne, neēdama, bieži, skuju koku un jauktos mežos, VII– X, H: DM, HA, HK.

\**R. cremeoavelanea* Singer ss. J. Blum p. p., **krēmkrāsas bērzlape**, bērzu mikorizas sēne, ēdama, reti, lapu koku mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1996.

*R. cyanoxantha* (Schaeff.) Fr., **violetzaļā bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, reti, mežos, VII– X, H: DM, HA, RIG.

\**R. cyanoxantha* f. *peltereaui* Maire, mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, mežos, VII– IX, H: DM, HA, L: Amoliņš 1996.

\**R. cyanoxantha* var. *variata* (Bann. in Peck) Singer, mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1996.

*R. decolorans* (Fr.) Fr., **mainīgā bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, mitros priežu mežos, VII– X, H: DM, HA, HK, RIG.

*R. delica* Fr., **baltā bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, mežos, kalķainās augsnēs, VII– X, H: DM, HA, HK.

\**R. delica* var. *trachyspora* Romagn., mikorizas sēne, ēdama, bieži, mežos, VII– IX, H: DM, L: Amoliņš 1992.

*R. densifolia* Gillet, **ciešlapīnu bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, reti, jauktos mežos, VIII– X, H: HA, L: Amoliņš 1985.

\**R. duportii* Phill., **Duporta bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1992.

\**R. elaeodes* (Bres.) Bon – *R. xeramphelina* var. *elaeodes* ss. Singer, **olīvbrūnā bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, lapu koku mežos, VII– IX, H: HA, HK, L: Amoliņš 1996.

*R. emetica* (Schaeff.: Fr.) Pers., **sīvā bērzlape**, mikorizas sēne, neēdama, bieži, mitros mežos, VIII– X, H: DM, HA, RIG.

*R. emetica* Fr. var. *betularum* (Hora) Romagn., bērzu mikorizas sēne, neēdama, bieži, lapu koku mežos, VII– IX, H: DM, HA.

\**R. emetica* f. *emeticella* Singer ss. J. Blum, mikorizas sēne, neēdama, reti, slapjos mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1992.

\**R. emetica* Fr. var. *longipes* Singer, mikorizas sēne, neēdama, reti, slapjos mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1992.

\**R. emetica* Fr. var. *pineticola* Melzer, priežu mikorizas sēne, neēdama, bieži, priežu mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1992.

\**R. emetica* var. *griseascens* Bon, mikorizas sēne, neēdama, reti, slapjos mežos, VII– IX, H: DM, HA, L: Amoliņš 1992.

\**R. emetica* Fr. var. *sylvestris* Singer, mikorizas sēne, neēdama, reti, sausos mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1992.

***R. exalbicans*** (Secr.) Melzer & Zvára – *R. pulchella* Borzcow, **bālējošā bērzlape**, bērzu mikorizas sēne, ēdama, bieži, jauktos mežos, kaļķainās augsnēs, VII– IX, H: DM, HA, RIG.

\**R. faginea* Romagn., **dižskābaržu bērzlape**, ozolu un dižskābaržu mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, trūdvielām bagātās augsnēs, VII– IX, H: HA, RIG, L: Amoliņš 1992.

*R. farinipes* Romell & Britzelm., **miltu bērzlape**, ozolu mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VII– X, L: Urbonas et al. 1986.

*R. fellea* Fr., **žults bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, reti, jauktos mežos, VII– X, L: Urbonas et al. 1986.

\**R. firmula* Schaeff., **stingrā bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, jauktos mežos, VII– IX, H: DM, HA, L: Amoliņš 1985.

*R. foetens* (Pers.: Fr.) Fr., **smirdīgā bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, jauktos mežos, VII– X H: DM, HA, HK, RIG.

\**R. foetens* Fr. var. *minor* Singer, mikorizas sēne, ēdama, reti, mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1996.

*R. fragilis* (Pers.: Fr.) Fr., **trauslā bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, skuju koku mežos, krūmājos, VI– X, H: DM, HA, HK.

\**R. fragilis* f. *atropurpurina* (Singer) Crw., mikorizas sēne, ēdama, reti, skuju koku mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1996.

- \**R. fragilis* f. *griseoviolacea* Britzelm., mikorizas sēne, ēdama, reti, lapu koku mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1996.
- \**R. fragilis* f. *salicina* Melzer, vītolu mikorizas sēne, ēdama, reti, lapu koku mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1996.
- \**R. fragilis* f. *violascens* Gillet, mikorizas sēne, ēdama, reti, lapu koku mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1992.
- R. fragilis* var. *fallax* (Cooke) Massee, mikorizas sēne, ēdama, bieži, skuju koku mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1992.
- \**R. fragilis* var. *knauthii* Singer, mikorizas sēne, ēdama, reti, lapu koku mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1996.
- \**R. fusconigra* M. M. Moser, **melnbrūnā bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, purvainos skuju koku mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1996.
- \**R. fuscorubroides* Bon, **ērkšķogu bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, priežu mežos, skābās augsnēs, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1992.
- \**R. glaucophylla* Quél. ss. Singer, **zallapinu bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, reti, mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1992.
- R. gracillima* Schaeff., **smalkā bērzlape**, bērzu mikorizas sēne, ēdama, bieži, jauktos mitros mežos, VIII– X, H: DM, HA, HK.
- \**R. gracillima* Schaeff. f. *emeticicolor* Singer, mikorizas sēne, ēdama, reti, jauktos mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1992.
- \**R. graveolens* Romell, **smakojošā bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, lapu koku mežos, smilšainās augsnēs, VII– IX, H: DM, HA, RIG, L: Amoliņš 1992.
- \**R. graveolens* Romell var. *subrubens* Lange., mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1992.
- \**R. graveolens* Romagn. var. *megacantha* Romagn., mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1996.

- \**R. grisea* (Pers.: Secr.) Fr. ss. Gillet, **pelēkā bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VIII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1996.
- \*\**R. heterophylla* (Fr.) Fr., **dažādlapiņu bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, reti, jauktos un skujkoku mežos, VIII, H: HK.
- \**R. integra* L.: Fr. – *R. polychroma* Singer: Hora, **veselā bērzlape**, eglu mikorizas sēne, ēdama, reti, eglu mežos, VII– IX, H: DM, HA, L: Amoliņš 1992.
- \**R. integra* L.: Fr. ss. Maire. var. *fuscella* Singer, mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, skuju koku mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1996.
- \**R. integra* L.: Fr. ss. Maire. var. *purpurea* J. Blum, mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, skuju koku mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1996.
- \**R. ionochlora* Romagn. – *R. palumbina* Quél. var. *ionochlora* Romagn. **vijolišu bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, reti, lapu koku mežos, VII– IX, H: HA.
- R. laeta* Schaeff., **košā bērzlape**, ozolu mikorizas sēne, ēdama, reti, lapu koku mežos, VII– IX, H: HA.
- \**R. laurocerasi* var. *fragrans* Melzer & Zvára, **maigā mandeļu bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, reti, lapu koku un jauktos mežos, VIII– IX, H: DM, HA, RIG, L: Amoliņš 1985.
- R. lepida* Fr., **cinobrsarkanā bērzlape** – *R. rosacea* S. F. Gray, mikorizas sēne, ēdama, reti, lapu koku un jauktos mežos, VII– IX, H: HA.
- \**R. lilacea* var. *retispora* Singer, **sarkanvioletā bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1992.
- \**R. lundelli* Singer, **Lundella bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, lapu koku un jauktos mežos, VII– IX, H: DM, HA, L: Amoliņš 1985.
- \**R. luteotacta* Rea, **dzeltējošā bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1992.

- \**R. luteoviridans* Mart. ss. Melzer & Zvára, **ķivuļa bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, reti, skuju koku mežos, VII– IX, H: DM, HA, L: Amoliņš 1985.
- \* *R. mairei* Singer v. *fageticola* Melzer - *R. fageticola* Singer, **Maira bērzlape**, ozolu un dižskābaržu mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1992.
- \**R. melitoides* Romagn., **medainā bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, kaļķainās un mālainās augsnēs, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1992.
- \**R. messospora* Singer, **oranžsarkanā bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, reti, jauktos mežos, VII– IX, H: DM, HA, L: Amoliņš 1992.
- R. nauseosa* (Pers.) Fr., **pretīgā bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, reti, eglu mežos, jauktos mežos, trūdvielām bagātās augsnēs, VII– X, H: DM, HA.
- R. nigricans* Fr., **melnganā bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, mežos, ceļmalās, sausās vietās, VIII– XI, H: DM, HA, RIG.
- R. nitida* (Pers.: Fr.) Fr., **spožā bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, mitros jauktos mežos, VIII– X, H: DM, HA.
- \**R. norvegica* J. Reid., **norvēģu bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, jauktos mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1992.
- R. ochroleuca* (Pers.) Fr., **okerdzeltenā bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, jauktos mežos, smilšainās augsnēs, VIII– X, H: DM, HA, HK.
- \**R. odorata* Romagn., **smaržīgā bērzlape**, ozolu mikorizas sēne, ēdama, reti, lapu koku mežos, zālainās vietās, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1992.
- \**R. olivaceoviolascens* Gillet, **olīvvioletā bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, mitros, purvainos mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1992.
- \**R. olivaceoviolascens* Gillet var. *violacea* ss. Melzer & Zvára, mikorizas sēne, ēdama, reti, jauktos mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1992.

- \**R. olivascens* Pers. ss. Bres., **olīvzaļganā bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, reti, skuju koku mežos, VII– IX, H: HA, RIG, L: Amoliņš 1992.
- R. paludosa* Britzelm. **purva bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, mitros priežu mežos, purvu malās, VII– X, H: DM, HA.
- R. pectinatoides* Peck, **ķemmveida bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, lapu koku mežos, dārzos, parkos, VII– VIII, H: DM, HA, RIG.
- \**R. pelargonia* Niolle ss. Romagn., **pelargoniju bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, reti, lapu koku mežos, VII– VIII, H: DM, HA, L: Amoliņš 1992.
- R. persicina* Krombh, **persiku bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, reti, lapu koku un jauktos mežos, VIII– X, H: DM, HA, HK.
- R. persicina* Krombh. var. *multibrevifolia* Romell., mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VII– IX, H: HA.
- \**R. pruinosa* Velen. – *R. cretata* Romagn., **apsarmotā bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, mežos, kaļķainās augsnēs, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1992.
- \**R. pseudointegra* Arn. & Gor., **rūgtenā bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1992.
- \**R. pseudoromelli* J. Blum, **tīklsporu bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1996.
- R. puellaris* Fr., **vaska bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, reti, skuju koku mežos, smilšainās augsnēs, VII– X, H: DM, HA, HK, RIG.
- \**R. puellaris* Fr. var. *abietina* Peck (J. Blum), mikorizas sēne, ēdama, reti, eglu mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1996.
- \**R. puellaris* f. *rubida* Romagn., mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, priežu mežos, VII– IX, H: DM, HA, L: Amoliņš 1992.
- \**R. puellaris* var. *minutalis* (Britzelm.) Singer, mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, skuju koku mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1996.

- \**R. pumila* Pouz. & F. Massart, **pundura bērzlape**, alkšņu mikorizas sēne, ēdama, reti, mitros lapu koku mežos, VII– IX, H: DM, HA, L: Amoliņš 1992.
- \**R. purpurata* Bres. ss. Crw., **purpura bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, reti, jauktos mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1992.
- R. queletii* Fr., **Kelē bērzlape**, mikorizas sēne, neēdama, reti, egļu mežos, VII– X, H: DM, HA.
- \**R. raoulpii* Quél., **Raulta bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, reti, mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1996.
- \**R. rhodella* Gilberd., **sārtā bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, jauktos mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1996.
- \**R. rhodopoda* Zvára, **liesmainā bērzlape**, egļu mikorizas sēne, ēdama, reti, egļu mežos, VIII– X, H: DM, HA, HK, RIG, L: Amoliņš 1992.
- \**R. rhodopoda* Zvára var. *clusii* Zvára mikorizas sēne, ēdama, reti, skuju koku mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1996.
- \**R. rivulicola* Routs. & Vauras, spec. nov., **urdziņu bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, slapjos mežos, sfagnos, VII– IX, H: HA, L: Vauras, Rotsalainen 2000.
- \**R. rosea* Pers. – *R. rosacea* (Pers.) Gray, **rožsārtā bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, reti, lapu koku mežos, VIII– X, H: HA, L: Amoliņš 1992.
- \**R. rosea* Pers. var. *aurora* Krombh. ss. Melzer & Zvára, mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1992.
- \**R. roseicolor* J. Blum, **rožainā bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1996.
- R. roseipes* Bres., **rožkāta bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, priežu mežos, sausās vietās, VI– VIII, H: DM, HA, HK.
- R. rubra* Krombh., **sarkanā bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, reti, lapu koku mežos, VII– X, L: Urbonas et al. 1986.

- \**R. rubra* Krombh. var. *kavinae* Melzer & Zvára, mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1996.
- \**R. rutila* Romagn., **iesarkanā bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1996.
- R. sanguinea* (Bull.)Fr., **asinssarkanā bērzlape**, priežu mikorizas sēne, ēdama, reti, priežu mežos, zālainās vietās, VIII– X, H: DM, HA, HK.
- R. sardonia* Fr., **zeltasaru bērzlape**, mikorizas sēne, neēdama, bieži, skuju koku mežos, smilšainās augsnēs, VII– IX, H: DM, HA, HK.
- \**R. sericatula* Romagn., **zīdainā bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1996.
- \**R. serotina* Melzer & Zvára: Singer, **atvasaras bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, reti, lapu koku mežos, VIII– XI, H: DM, HA, L: Amoliņš 1992.
- R. sororia* (Fr.) Romagn. ss. Boud., **siera bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, reti, lapu koku un jauktos mežos, VII– X, L: Urbonas et al. 1986.
- \**R. sphagnophila* Singer ss. Bon, **sūnu bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, reti, lapu koku mežos, VII– IX, H: DM, HA, L: Amoliņš 1996.
- \**R. subcompacta* Britzelm. ss. Crw., **bronzas bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, reti, egļu mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1992.
- \**R. subfoetens* (Fr.) Smith, **vājsmirdīgā bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, lapu koku un jauktos mežos, VII– IX, H: DM, HA, RIG, L: Amoliņš 1992.
- \**R. torulosa* Bres., **druknā bērzlape**, priežu mikorizas sēne, ēdama, reti, priežu mežos, kalķainās augsnēs, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1992.
- \**R. torulosa* Bres. var. *fuscorubra* J. Blum, mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, priežu mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1992.
- \**R. transiens* (Singer) Romagn., **pārejas bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, reti, skuju koku mežos, VII– X, H: HA, L: Amoliņš 1992.

\**R. turci* Bres., **jodoforma bērzlape**, priežu mikorizas sēne, ēdama, reti, sausos skuju koku mežos, VII– IX, H: DM, HA, RIG, L: Amoliņš 1992.

\**R.. turci* Bres. var. *punctata* Singer, mikorizas sēne, ēdama, reti, skuju koku mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1996.

\**R. unicolor* ss. Romagn., **vienkrāsas bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, reti, lapu koku mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1992.

\**R. urens* Romagn., **pasūrā bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, skuju koku mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1996.

*R. velenovskyi* Melzer & Zvára, **Velenovska bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, jauktos mežos, sausās vietās, VI– XI, H: DM, HA, RIG.

\**R. velenovskyi* var. *cruentata* Quél., mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1996.

\**R. versicolor* Schaeff., **dažādkrāsu bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, mežos, mežmalās, zālainās vietās, VII– IX, H: DM, HA, HK, L: Amoliņš 1992.

\* *R. versicolor* Schaeff. f. *macrospora* Romagn., mikorizas sēne, ēdama, bieži, lapu koku mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1992.

\**R. versicolor* Schaeff. f. *microspora* Romagn., mikorizas sēne, ēdama, reti, lapu koku mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1992.

\**R. versicolor* Schaeff. var. *intensior* J. Blum, mikorizas sēne, ēdama, reti, skuju koku mežos. VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1992.

\**R. versicolor* Schaeff. var. *pseudopuellaris* Bon, mikorizas sēne, ēdama, reti, lapu koku mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1992.

*R. vesca* Fr., **plankumainā bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, mežos, ceļmalās, blīvā augsnē, VII– X, H: DM.

\**R. vesca* Fr. f. *neglecta* Singer, mikorizas sēne, ēdama, reti, mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1992.

***R. veternosa*** Fr., ss. Schaeff., **miega bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VII– IX, L: Urbonas et al. 1986.

***R. vinosa*** Lindbl., **vīnsarkanā bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, mitros skuju koku mežos, VII– IX, H: DM, HA, HK.

\****R. vinosobrunnea*** (Bres.) Romagn., **vīnbrūnā bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, reti, lapu koku un jauktos mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1992.

\**R. vinosobrunnea* (Bres.) Romagn var. *pseudoolivacea* J. Blum, mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, jauktos mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1992.

\****R. vinososordida*** Routs. & Vauras, spec. nov., **netīrā bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, jauktos mežos, VII– IX, H: HA, L: Vauras, Rotsalainen 2000.

\****R. violacea*** Quél. ss. Romagn., **violetā bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, reti, lapu koku mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1992.

***R. virescens*** (Schaeff.) Fr., **zaļā bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, VII– IX, L: Urbonas et al. 1986.

\****R. vitellina*** (Pers.: Fr.) Fr., **oldzeltēnā bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, reti, skuju koku mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1992.

***R. xerampelina*** (Schäff.) Fr., **siļķu bērzlape**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, priežu mežos, VIII– XI, H: DM, HA, HK, RIG.

*R. xerampelina* (Schaeff.) Fr. var. *elaeodes* ss. Singer, mikorizas sēne, ēdama, bieži, skuju koku mežos, VII– IX, H: HA.

\**R. xerampelina* (Schaeff.) Fr. var. *olivascens* Zvára, mikorizas sēne, ēdama, bieži, lapu koku mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1992.

\**R. xerampelina* (Schaeff.) Fr. var. *putorina* Melzer, mikorizas sēne, ēdama, bieži, skuju koku mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1992.

- \**R. xerampelina* (Schaeff.) Fr. var. *rubra* Singer, mikorizas sēne, ēdama, bieži, skuju koku mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš, 1992.
- \**R. xerampelina* (Schaeff.) Fr. var. *erythropoda* Pelt., mikorizas sēne, ēdama, bieži, skuju koku mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1996.
- \* *R. xerampelina* (Schaeff.) Fr. var. *xanthophae* Crw., mikorizas sēne, ēdama, reti, mežos, VII– IX, H: HA, L: Amoliņš 1996.

#### *Strobilomyces* Berk., zvīņbekas

*S. strobilaceus* (Scop.: Fr.) Berk. – *S. floccopus* (Vahl.: Fr.) P. Karst., **melnā zvīņbeka**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, skuju koku un jauktos mežos, VII– X, L: Urbonas et al. 1986.

#### *Strobilurus* Singer, čiekursēnes

*S. esculentus* (Wulfen: Fr.) Singer – *Collybia esculenta* (Wulfen) Fr., **eglu čiekursēne**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, ēdama, ļoti bieži, eglu mežos, uz čiekuriem, III– XII, H: DM, HK, RIG.

*S. stephanocystis* (Hora) Singer, **pūšlainā čiekursēne**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, ēdama, ļoti bieži, priežu mežos, uz čiekuriem, III– VII, H: DM, HK, RIG.

*S. tenacellus* (Pers.: Fr.) Singer – *Collybia conigena* (Pers.) Bres., **priežu čiekursēne**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, ēdama, reti, priežu mežos, uz čiekuriem, IX– III, H: DM, RIG.

#### *Stropharia* (Fr.) Quél., virpaineitēs

*S. aeruginosa* (Curt.: Fr.) Quél., **zaļā virpaineite**, nedzīvās zemsedzes un humusa saprotrofs, ēdama, bieži, skuju koku un jauktos mežos, VIII– XI, H: DM, HK, RIG.

*S. albocreata* (Peck) Kreisel, **baltrobainā virpaineite**, koksnes saprotrofs, neēdama, bieži, lapu koku mežos, VII– X, H: DM.

- S. albonitens* (Fr.) P. Karst., **spožbaltā virpainīte**, nedzīvās zemsedzes un humusa saprotrofs, neēdama, reti, pļavās, ceļmalās, zālainās vietās, VIII, L: Urbonas et al. 1986.
- S. coronilla* (Bull.: Fr.) Quél., **vainaga virpainīte**, humusa saprotrofs, ēdama, ļoti bieži, pļavās, zālainās vietās, VIII– XI, H: DM, HK.
- \**S. cyanea* (Bull.) Tuomikoski – *S. caerulea* Kreisel, **zilganā virpainīte**, nedzīvās zemsedzes un humusa saprotrofs, ēdama, reti, pļavās, zālainās vietās, dārzos, IX– X, H: DM, L: Avota, Krastiņa 1994.
- S. hornemannii* (Fr.: Fr.) S. Lundell & Nannf, **Hornemana virpainīte**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, indīga, bieži, skuju koku un jauktos mežos, VIII– X, H: DM, RIG.
- S. semiglobata* (Batsch: Fr.) Quél. – *S. stercoraria* (Schum. : Fr.) Quél., **puslodes virpainīte**, koprotrofs, neēdama, ļoti bieži, ganībās, trūdvielām bagātās augsnēs, V– XI, H: DM, HK, RIG.
- \*\**S. umbonatescens* (Peck) Sacc. – *S. luteonitens* (Fr.) Quél., **iedzeltenā virpainīte**, humusa saprotrofs, koprotrofs, neēdama, ļoti reti, ganībās, VIII– IX, H: DM.

***Suillus* Micheli: S. F. Gray, sviestbekas**

- S. aeruginascens* (Opat.) Snell. – *S. laricinus* (Berk.) O. Kuntze – *Boletus viscidus* L., **lipīgā sviestbeka**, lapegļu mikorizas sēne, ēdama, reti, lapegļu stādījumos, VII– IX, H: DM.
- S. bovinus* (L.: Fr.) Roussel – *Boletus bovinus* (L.) Fr., **govju sviestbeka**, priežu mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, priežu mežos, VII– X, H: DM, RIG.
- \*\**S. cothurnatus* var. *hiemalis* Korhonen, **zābakotā sviestbeka**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, atrasta Patkula alā pie Vaidavas upes, VIII, H: RIG.
- S. flavidus* (Fr.: Fr.) J. S. Presl, **purva sviestbeka**, priežu mikorizas sēne, ēdama, reti, pārpurvotos priežu mežos, purvos, VIII– IX, H: DM.

- S. granulatus* (L.: Fr.) Roussel – *Boletus granulatus* L., **graudainā sviestbeka**, priežu mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, priežu mežos, VI– X, H: DM.
- S. grevillei* (Klotzsch: Fr.) Singer – *Boletus elegans* Schum., **zeltainā sviestbeka**, lapegļu mikorizas sēne, ēdama, bieži, lapegļu stādījumos, VIII– X, H: DM, HK, RIG.
- S. luteus* (L.: Fr.) Roussel – *Boletus luteus* (L.) Fr., **parastā sviestbeka**, priežu mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, priežu mežos, VII– XI, H: DM.
- \*\**S. placidus* (Bonord.) Singer, **gaišā sviestbeka**, priežu mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, Šķēdē zem Veimuta piedēm, VIII– IX, H: DM.
- S. variegatus* (Sowerby: Fr.) Kuntze – *Boletus variegatus* Swartz, **priežu sviestbeka**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, priežu mežos, VII– X, H: DM.

#### *Tephrocybe* Donk, **pelēklapes**

- T. ambusta* (Fr.) Donk – *Lyophyllum ambustum* (Fr.) Singer – *Collybia ambusta* Fr., **degumu pelēklape**, karbotrofs, neēdama, reti, mežos, IX– XI, H: DM, HK.
- T. antracophila* (Lasch) Orton – *Lyophyllum antrachophylum* (Lasch) M. Lange & Sivertsen – *T. carbonaria* (Velen.) Donk, **ogļu pelēklape**, karbotrofs, neēdama, reti, mežos, IX– X, H: DM, RIG.
- \**T. baeosperma* (Romagn.) n. c., **melnkāta pelēklape**, humusa saprotrofs, neēdama, ļoti reti, jauktos mežos, X, H: DM, L: Avota 1993.
- \**T. cessans* (P. Karst.) M. M. Moser, **vēlā pelēklape**, humusa saprotrofs, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, X, H: DM, L: Avota 1996.
- T. inolens* (Fr.) M. M. Moser – *Lyophyllum inolens* (Fr.) Singer – *Collybia inolens* (Fr.) Quél., **nesmaržīgā pelēklape**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, ēdama, reti, skuju koku un jauktos mežos, IX– XI, H: DM.
- \**T. mephitica* (Fr.) M. M. Moser – *Lyophyllum mephiticum* (Fr.) Singer, **gaišā pelēklape**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, reti, eglu mežos, IX– XI, H: DM, L: Avota, Krastiņa 1994.

- \**T. murina* (Batsch.: Fr.) M. M. Moser – *Lyophyllum murinum* (Batsch.: Fr.) M. M. Moser, **tumšā pelēklape**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, lapu koku un jauktos mežos, VIII, H: DM, HK, L: Avota 1996.
- T. palustre* (Peck) Singer, **purva pelēklape** – *Lyophyllum palustre* (Peck.) Singer, briotrofs, neēdama, bieži, skuju koku un jauktos mežos, sfagnos, IX– X, H: DM.
- \**T. platypus* (Kühner) M. M. Moser, **smakojošā pelēklape**, humusa saprotrofs, neēdama, ļoti reti, jauktos mežos, VIII, H: DM, L: Avota 1996.
- \**T. rancida* (Fr.) Donk – *Lyophyllum rancidum* (Fr.) Singer, **sakņkāta pelēklape**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, reti, mežos, IX, H: DM, HK, L: Avota, Krastiņa 1994.

*Tricholoma* (Fr.) Quél., **pūkaines, smiltenes**

- T. acerbum* (Bull.: Fr.) Quél., **sīvā pūkaine**, mikorizas sēne, neēdama, ļoti reti, skuju koku mežos, VIII– X, H: DM.
- \**T. aestuans* (Fr.) Gillet, **rūgtā smiltene**, mikorizas sēne, neēdama, reti, priežu mežos, VIII– IX, H: DM, L: Avota, Krastiņa 1994.
- T. albobrunneum* (Pers.: Fr.) P. Kumm. – *T. striatum* (Schaeff.) Sacc. ss. Lange, **baltbrūnā pūkaine**, mikorizas sēne, indīga, bieži, skuju koku mežos, priežu mežos, VII– XI, H: DM, HK.
- T. album* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm. – *T. pseudoalbum* Bon – *T. stiparophyllum* (S. Lundell) P. Karst., **baltā pūkaine**, bērzu mikorizas sēne, neēdama, ļoti bieži, mitros lapu koku un jauktos mežos, VIII– X, H: DM, HK.
- T. argyraceum* (Bull.) Sacc., **sudrabpelēkā pūkaine**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, mežos, ceļmalās, parkos, VIII– XI, H: DM.
- T. aurantium* (Schaeff.: Fr.) Ricken, **oranžā pūkaine**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, skuju koku mežos, VIII– X, L: Urbonas et al. 1986.

- \**T. cingulatum* (Almfelt) Jacobasch., **jostainā pūkaine**, mikorizas sēne, ēdama, reti, ceļmalās, krūmājos, VIII– X, H: DM, L: Avota, Krastiņa 1994.
- T. colossus* (Fr.) Quél., **milzu pūkaine**, priežu mikorizas sēne, ēdama, reti, skuju koku mežos, priežu mežos, IX– X, L: Urbonas et al. 1986.
- T. columbetta* (Fr.) P. Kumm., **baložu pūkaine**, mikorizas sēne, ēdama, reti, mežos, VIII– X, H: DM.
- T. equestre* (L.: Fr.) P. Kumm. – *T. auratum* (Paulet) Gillet – *T. flavovirens* (Pers.: Fr.) S. Lundell, **parastā smiltene**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, skuju koku un jauktos mežos, IX– XII, H: DM, HK, RIG.
- T. focale* (Fr.) Ricken, **gredzenotā pūkaine**, priežu mikorizas sēne, ēdama, bieži, priežu mežos, sausās, smilšainās vietās, VIII– X, H: DM, HK.
- T. fulvum* (DC.: Fr.) Sacc. – *T. flavobrunneum* (Fr.) P. Kumm., **dzeltenbrūnā pūkaine**, bērzu mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, lapu koku un jauktos mežos, VIII– X, H: DM, HK.
- \**T. gausapatum* (Fr.) Quél., **pinkainā pūkaine**, priežu mikorizas sēne, ēdama, bieži, skuju koku mežos, VII– X, H: DM, L: Avota, Krastiņa 1994.
- T. imbricatum* (Fr.: Fr.) P. Kumm., **sīkzvīņu pūkaine**, priežu mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, skuju koku mežos, priežu mežos, VII– X, H: DM, HK.
- T. impolitum* (Lasch) Ricken, **sāļā pūkaine**, mikorizas sēne, neēdama, reti, lapu koku mežos, IX– X, H: DM.
- \**T. inamoenum* (Fr.: Fr.) Gillet, **netīkamā pūkaine**, mikorizas sēne, neēdama, bieži, jauktos mežos, ceļmalās, IX– X, H: DM, HK, L: Avota 1994.
- T. inocybeoides* A. Pearson, **pelēcīgā pūkaine**, mikorizas sēne, neēdama, ļoti reti, skuju koku un jauktos mežos, VIII– IX, H: DM.
- T. irinum* (Fr.) P. Kumm., **smaržīgā pūkaine, aplocene**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, jauktos mežos, zālainās vietās, X– XI, H: DM, RIG.
- T. lascivum* (Fr.) Gillet, **smirdošā pūkaine**, mikorizas sēne, neēdama, bieži, lapu koku mežos, VI– X, H: DM.

- \**T. myomyces* (Pers.: Fr.) P. Kumm., **pelpelēkā pūkaine**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, priežu mežos, IX– XI, H: DM, L: Avota, Krastiņa 1994.
- T. pardinum* (Pers.) Quél. – *T. tigrinum* P. Kumm. – *T. pardolotum* Herink & Kotl., **tīgeru pūkaine**, mikorizas sēne, indīga, reti, platlapju mežos, VIII– X, L: Urbonas et al. 1986.
- T. pessundatum* (Fr.) Quél. non ss. Lange, **lāsainā pūkaine**, priežu mikorizas sēne, neēdama, ļoti bieži, skuju koku mežos, skābās augsnēs, IX– X, H: DM.
- T. populinum* Lange, **apšu pūkaine**, apšu mikorizas sēne, ēdama, reti, jauktos mežos, IX– X, H: DM.
- T. portentosum* (Fr.) Quél., **pelēkā pūkaine**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, priežu mežos, IX– XII, H: DM, HK.
- T. robustum* (Alb. & Schwein.: Fr.) Ricken, **cietā pūkaine**, mikorizas sēne, ēdama, reti, skuju koku mežos, VIII– X, L: Urbonas et al. 1986.
- T. saponaceum* (Fr.: Fr.) P. Kumm., **ziepju pūkaine**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, parkos, jauktos mežos, VIII– XI, H: DM, HK, RIG.
- T. saponaceum* (Fr.: Fr.) P. Kumm. var. *cnista* (Fr.) Lange, mikorizas sēne, ēdama, reti, lapu koku mežos, VIII– X, L: Urbonas et al. 1986.
- T. scalpturatum* (Fr.) Quél., **dzeltējošā pūkaine**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, skuju koku mežos, VIII– X, H: DM, RIG.
- T. sejunctum* (Sowerby: Fr.) Quél., **iedzeltenā pūkaine**, mikorizas sēne, neēdama, reti, skuju koku mežos, IX– XI, H: DM, HK, RIG.
- T. sulphureum* (Bull.: Fr.) P. Kumm., **sēra pūkaine**, mikorizas sēne, neēdama, bieži, lapu koku un jauktos mežos, VIII– X, H: DM, HK, RIG.
- T. terreum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm., **zemes pūkaine**, priežu mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, skuju koku mežos, VIII– XI, H: DM, RIG.
- \*\**T. ustaloides* Romagn., **sarkanbrūnā pūkaine**, ozolu mikorizas sēne, ēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, X, H: DM.

- T. vaccinum*** (Pers.: Fr.) P. Kumm., **govju pūkaine**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, skuju koku un jauktos mežos, VII– X, H: DM, RIG.
- T. virgatum*** (Fr.: Fr.) P. Kumm., **svītrainā pūkaine**, mikorizas sēne, indīga, bieži, skuju koku mežos, VIII– IX, H: DM.
- \****T. viridilutescens*** M. M. Moser, **zaļdzeltenā pūkaine**, mikorizas sēne, neēdama, ļoti reti, lapu koku mežos, IX, H: DM, L: Avota 1996.

#### ***Tricholomopsis* Singer, vistenes**

- \****T. decora*** (Fr.) Singer – *Tricholoma rutilans* (Schaeff.: Fr. ) P. Kumm., **krāšņā vistene**, koksnes saprotrofs, ēdama, reti, skuju koku mežos, VII– X, H: DM, HK, RIG, L: Avota, Krastiņa 1994.
- T. rutilans*** (Schaeff.: Fr.) Singer – *Tricholoma decora* (Fr.) Gill., **parastā vistene**, koksnes saprotrofs, ēdama, ļoti bieži, skuju koku un jauktos mežos, VIII– XI, H: DM, HK.

#### ***Tubaria* ( W. G. Sm.) Gill., turzenes**

- \****T. confragosa*** (Fr.) Kühner, **gredzenotā turzene**, koksnes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, jauktos un lapu koku mežos, IX, H: DM, HK, L: Avota 1996.
- \****T. conspersa*** (Pers.: Fr.) Fayod, **pārslainā turzene**, koksnes un nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, ļoti bieži, mežos, V– X, H: DM, HK, RIG, L: Avota, Krastiņa 1994.
- T. furfuracea*** (Pers.: Fr.) Gillet – *T. pellucida* (Bull.: Fr.) Gillet s. Konrad & Maubl., Romagn. – *T. hiemalis* Bon, **klijainā turzene**, koksnes un nedzīvās zemsedzes saprotrofs, ēdama, ļoti bieži, mežos, III– XII, H: DM, HK.
- \****T. minutalis*** Romagn., **sīkā turzene**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, reti, mežos, VII– VIII, H: DM, L: Avota 1995a.
- \*\****T. pallidospora*** Lange, **bālsporu turzene**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, jauktos mežos, IX, H: DM.

***Tylopilus* P. Karst., žultsbekas**

***Tylopilus felleus*** (Bull.: Fr.) P. Karst., **parastā žultsbeka**, mikorizas sēne, neēdama, bieži, skuju koku un jauktos mežos, VII– X, H: DM, HK RIG.

***Volvariella* Speg., makstaines**

***V. bombycina*** (Schaeff.: Fr.) Singer, **zīdainā makstaine**, koksnes saprotofs, ēdama, reti, lapu koku mežos, VI– X, H: DM, RIG.

\*\****V. cinerascens*** (Bres.) M. M. Moser, **zilpelēkā makstaine**, humusa un nedzīvās zemsedzes saprotofs, neēdama, ļoti reti, dārzos, VIII– IX, H: DM.

***V. gloiocephala*** (DC.: Fr.) Boehhout & Enderle – ***V. speciosa*** (Fr.: Fr.) Singer, **glotgalvainā makstaine**, humusa saprotofs, neēdama, reti, tīrumos, dārzos VI– XI, H: DM, RIG.

\*\****V. hypopithys*** (Fr.) M. M. Moser, **pūkainā makstaine**, humusa saprotofs, neēdama, ļoti reti, priežu mežos, VIII– IX, H: DM.

***V. media*** (Schumach.: Fr.) Singer, **vidējā makstaine**, humusa saprotofs, ēdama, reti, skuju koku un jauktos mežos, VIII– IX, H: DM.

\****V. murinella*** (Quél.) M. M. Moser, **pelpelēkā makstaine**, humusa saprotofs, neēdama, reti, lapu koku un jauktos mežos, VIII– IX, H: DM, L: Avota 1995a.

***V. pussilla*** (Pers.: Fr.) Quél., **mazā makstaine**, humusa saprotofs, neēdama, ļoti reti, jauktos mežos, VI– X, H: DM.

***V. volvacea*** (Bull.: Fr.) Singer, **melnsvītras makstaine**, humusa saprotofs, ēdama, ļoti reti, skuju koku un jauktos mežos, VI– X, L: Urbonas et al. 1986.

***Xerocomus* Quél., samtbekas**

***X. badius*** (Fr.) Kühner: Gilb. – ***Boletus badius*** Fr., **lāču samtbeka**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, skuju koku un egļu mežos, VIII– X, H: DM, HK.

- X. chrysenteron* (Bull.) Quél., **raibā samtbeka**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, lapu koku un jauktos mežos, VII– XI, H: DM, RIG.
- X. parasiticus* Bull.: Fr. – *Boletus parasiticus* (Bull.) Fr., **parazītiskā samtbeka**, mikotrofs, ēdama, ļoti reti, mitros lapu koku mežos, uz cietpūpēžu *Scleroderma* spp. augļķermeniem, VIII– X, H: DM, RIG.
- X. rubellus* (Krombh.) Quél., **sarkanā samtbeka**, mikorizas sēne, ēdama, reti, jauktos un lapu koku mežos, parkos, VII– X, H: DM, RIG.
- \**X. spadiceus* (Fr.) Quél., **kastaņbrūnā samtbeka**, mikorizas sēne, ēdama, bieži, skuju koku mežos, smilšainās, skābās augsnēs, VIII– X, H: DM, L: Štolls, akvareļi 1913-1939.
- X. subtomentosus* (L.: Fr.) Quél. – *Boletus subtomentosus* (L.) Fr., **kazu samtbeka**, mikorizas sēne, ēdama, ļoti bieži, skuju koku un jauktos mežos, VI– XI, H: DM, HK, RIG.

#### *Xeromphalia* Kühner & Maire, **sausdobītes**

- X. campanella* (Batsch: Fr.) Kühner & Maire, **zvanīju sausdobīte**, koksnes saprotrofs, neēdama, ļoti bieži, mežos, IV– XI, H: DM, HK, RIG.
- \*\**X. caulinialis* (With.: Fr.) Kühner & Maire, **stiebra sausdobīte**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, ļoti reti, skuju koku mežos, V– X, H: RIG.
- \**X. cornui* (Quél.) Favre, **raga sausdobīte**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, bieži, skuju koku mežos, VIII– X, H: DM, HK, L: Kastiņa 2000.
- X. fellea* Maire & Malençon – *X. amara* Horak & Peters, **rūgtā sausdobīte**, nedzīvās zemsedzes saprotrofs, neēdama, reti, skuju koku un jauktos mežos, VII– XI, H: DM, HK.

#### *Xerula* Maire, **kserulas**

- X. radicata* (Relhan: Fr.) Dorfelt – *Oudemansiella radicata* (Relhan: Fr.) Singer – *Collybia radicata* (Relhan.) Berk., **sakņkāta kserula**, nedzīvās zemsedzes un koksnes saprotrofs, ēdama, ļoti reti, lapu koku un jauktos mežos, VII– X, H: DM.

## SUGU ZINĀTNISKO NOSAUKUMU SINONĪMU RĀDĪTĀJS

<i>Agaricus abruptibulbus</i>	⇒ <i>Agaricus arvensis</i>
<i>Agaricus edulis</i>	⇒ <i>Agaricus bisporus</i>
<i>Agaricus haemorrhooidarius</i>	⇒ <i>Agaricus comtulus</i>
<i>Agaricus haemorrhooidarius</i>	⇒ <i>Agaricus silvaticus</i>
<i>Agaricus hortensis</i>	⇒ <i>Agaricus bisporus</i>
<i>Agaricus perrarus</i>	⇒ <i>Agaricus augustus</i>
<i>Agaricus rubellus</i>	⇒ <i>Agaricus rusiophyllus</i>
<i>Agrocybe dura</i>	⇒ <i>Agrocybe molesta</i>
<i>Agrocybe pusilla</i>	⇒ <i>Agrocybe pusiola</i>
<i>Agrocybe semiorbicularis</i>	⇒ <i>Agrocybe pediades</i>
<i>Agrocybe tuberosa</i>	⇒ <i>Agrocybe arvalis</i>
<i>Alnicola melinoides</i>	⇒ <i>Naucoria escharoides</i>
<i>Amanita mappa</i>	⇒ <i>Amanita citrina</i>
<i>Amanita muscaria</i> subsp. <i>regalis</i>	⇒ <i>Amanita regalis</i>
<i>Amanita spissa</i>	⇒ <i>Amanita excelsa</i>
<i>Amanita umbrinolutea</i>	⇒ <i>Amanita battarae</i>
<i>Amanita vaginata</i> var. <i>alba</i>	⇒ <i>Amanita alba</i>
<i>Amanita vaginata</i> var. <i>badia</i>	⇒ <i>Amanita fulva</i>
<i>Amanita verna</i>	⇒ <i>Amanita virosa</i>
<i>Amanitopsis alba</i>	⇒ <i>Amanita alba</i>
<i>Amanitopsis crocea</i>	⇒ <i>Amanita crocea</i>
<i>Amanitopsis fulva</i>	⇒ <i>Amanita fulva</i>
<i>Amanitopsis vaginata</i>	⇒ <i>Amanita vaginata</i>
<i>Anellaria semiovatus</i>	⇒ <i>Panaeolus fimiputris</i>
<i>Armillaria obscura</i>	⇒ <i>Armillaria ostoyae</i>
<i>Armillariella mellea</i>	⇒ <i>Armillaria mellea</i>

<i>Bolbitius fragilis</i>	⇒ <b><i>Bolbitius titubans</i></b>
<i>Bolbitius vittellinus</i>	⇒ <b><i>Bolbitius titubans</i></b>
<i>Boletus aestivalis</i>	⇒ <b><i>Boletus reticulatus</i></b>
<i>Boletus albidus</i>	⇒ <b><i>Boletus radicans</i></b>
<i>Boletus badius</i>	⇒ <b><i>Xerocomus badius</i></b>
<i>Boletus bovinus</i>	⇒ <b><i>Suillus bovinus</i></b>
<i>Boletus edulis</i> f. <i>betulincola</i>	⇒ <b><i>Boletus betulincola</i></b>
<i>Boletus elegans</i>	⇒ <b><i>Suillus grevillei</i></b>
<i>Boletus granulatus</i>	⇒ <b><i>Suillus granulatus</i></b>
<i>Boletus luteus</i>	⇒ <b><i>Suillus luteus</i></b>
<i>Boletus pachypus</i>	⇒ <b><i>Boletus calopus</i></b>
<i>Boletus parasiticus</i>	⇒ <b><i>Xerocomus parasiticus</i></b>
<i>Boletus pinicola</i>	⇒ <b><i>Boletus pinophilus</i></b>
<i>Boletus piperatus</i>	⇒ <b><i>Chalciporus piperatus</i></b>
<i>Boletus rufus</i>	⇒ <b><i>Leccinum aurantiacum</i></b>
<i>Boletus scaber</i>	⇒ <b><i>Leccinum scabrum</i></b>
<i>Boletus subtomentosus</i>	⇒ <b><i>Xerocomus subtomentosus</i></b>
<i>Boletus variegatus</i>	⇒ <b><i>Suillus variegatus</i></b>
<i>Boletus viscidus</i>	⇒ <b><i>Suillus aeruginascens</i></b>
<i>Calocybe georgii</i>	⇒ <b><i>Calocybe gambosa</i></b>
<i>Camarophyllus niveus</i>	⇒ <b><i>Camarophyllus virgineus</i></b>
<i>Clitocybe asterosporus</i>	⇒ <b><i>Omphaliaster asterosporus</i></b>
<i>Clitocybe cyathiformis</i>	⇒ <b><i>Pseudoclitocybe cyathiformis</i></b>
<i>Clitocybe dicolor</i>	⇒ <b><i>Clitocybe metachroa</i></b>
<i>Clitocybe expallens</i>	⇒ <b><i>Clitocybe pseudoobbata</i></b>
<i>Clitocybe fritilliformis</i>	⇒ <b><i>Clitocybe fuligineipes</i></b>
<i>Clitocybe gilva</i>	⇒ <b><i>Lepista flaccida</i></b>
<i>Clitocybe incilis</i>	⇒ <b><i>Clitocybe costata</i></b>
<i>Clitocybe infundibuliformis</i>	⇒ <b><i>Clitocybe gibba</i></b>

---

<i>Clitocybe inversa</i>	⇒	<b><i>Lepista inversa</i></b>
<i>Clitocybe obolus</i>	⇒	<b><i>Omphaliaster obolus</i></b>
<i>Clitocybe radicellata</i>	⇒	<b><i>Clitocybe pruinosa</i></b>
<i>Clitocybe rizophora</i>	⇒	<b><i>Clitocybe vermicularis</i></b>
<i>Clitocybe ruderalis</i>	⇒	<b><i>Clitocybe dealbata</i></b>
<i>Clitocybe suaveolens</i>	⇒	<b><i>Clitocybe fragrans</i></b>
<i>Clitocybe verna</i>	⇒	<b><i>Clitocybe pruinosa</i></b>
<i>Collybia ambusta</i>	⇒	<b><i>Tephrocybe ambusta</i></b>
<i>Collybia butyracea</i> var <i>asema</i>	⇒	<b><i>Collybia asema</i></b>
<i>Collybia conigena</i>	⇒	<b><i>Strobilurus tenacellus</i></b>
<i>Collybia esculenta</i>	⇒	<b><i>Strobilurus esculentus</i></b>
<i>Collybia inolens</i>	⇒	<b><i>Tephrocybe inolens</i></b>
<i>Collybia myosura</i>	⇒	<b><i>Baeospora myosura</i></b>
<i>Collybia nivalis</i>	⇒	<b><i>Collybia verna</i></b>
<i>Collybia platyphylla</i>	⇒	<b><i>Megacollybia platyphylla</i></b>
<i>Collybia radicata</i>	⇒	<b><i>Xerula radicata</i></b>
<i>Collybia velutipes</i>	⇒	<b><i>Flammulina velutipes</i></b>
<i>Conocybe siliginea</i> var. <i>ambigua</i>	⇒	<b><i>Conocybe ambigua</i></b>
<i>Conocybe siliginea</i> var. <i>ochracea</i>	⇒	<b><i>Conocybe sienophylla</i></b>
<i>Coprinus fimetarius</i>	⇒	<b><i>Coprinus cinereus</i></b>
<i>Coprinus stercorarius</i>	⇒	<b><i>Coprinus cinereus</i></b>
<i>Cortinarius allutus</i>	⇒	<b><i>Cortinarius multiformis</i></b>
<i>Cortinarius amethystinus</i>	⇒	<b><i>Cortinarius camphoratus</i></b>
<i>Cortinarius cephalixus</i>	⇒	<b><i>Cortinarius olidus</i></b>
<i>Cortinarius collinitus</i>	⇒	<b><i>Cortinarius muscigenus</i></b>
<i>Cortinarius crocolitus</i>	⇒	<b><i>Cortinarius triumphans</i></b>
<i>Cortinarius cyanopus</i>	⇒	<b><i>Cortinarius amoenolens</i></b>
<i>Cortinarius elatior</i>	⇒	<b><i>Cortinarius lividoochraceus</i></b>

<i>Cortinarius emollitus</i>	⇒ <i>Cortinarius eburneus</i>
<i>Cortinarius flexipes</i>	⇒ <i>Cortinarius paleaceus</i>
<i>Cortinarius fulgens</i>	⇒ <i>Cortinarius fulmineus</i>
<i>Cortinarius herpticus</i>	⇒ <i>Cortinarius scaurus</i>
<i>Cortinarius hircinus</i>	⇒ <i>Cortinarius camphoratus</i>
<i>Cortinarius largus</i>	⇒ <i>Cortinarius nemorensis</i>
<i>Cortinarius privignus</i>	⇒ <i>Cortinarius biformis</i>
<i>Cortinarius pseudosalor</i>	⇒ <i>Cortinarius stillatitius</i>
<i>Cortinarius speciosissimus</i>	⇒ <i>Cortinarius orellanoides</i>
<i>Cortinarius subbalteatus</i>	⇒ <i>Cortinarius balteatus</i>
<i>Cortinarius subfulgens</i>	⇒ <i>Cortinarius fulmineus</i>
<i>Cortinarius umbriolens</i>	⇒ <i>Cortinarius rigidus</i>
<i>Cortinarius umidicola</i>	⇒ <i>Cortinarius malachius</i>
<i>Cortinarius validus</i>	⇒ <i>Cortinarius saginus</i>
<i>Cortinarius variegatus</i>	⇒ <i>Cortinarius sebaceus</i>
<i>Crepidotus lundellii</i>	⇒ <i>Crepidotus in honestus</i>
<i>Crepidotus mollis</i> var. <i>calolepis</i>	⇒ <i>Crepidotus calolepis</i>
<i>Crepidotus philipsii</i>	⇒ <i>Melanotus philipsii</i>
<i>Crepidotus pubescens</i>	⇒ <i>Crepidotus versutus</i>
<i>Crinipellis stipitaria</i>	⇒ <i>Crinipellis scabella</i>
<i>Cuphophyllus pratensis</i>	⇒ <i>Camarophyllus pratensis</i>
<i>Cystoderma cinnabarinum</i>	⇒ <i>Cystoderma terrei</i>
<i>Cystolepiota sistrata</i>	⇒ <i>Cystolepiota seminuda</i>
<i>Cystolepiota aspera</i>	⇒ <i>Lepiota aspera</i>
<i>Dermocybe sphagneti</i>	⇒ <i>Cortinarius tubarius</i>
<i>Dermocybe cinnabarinina</i>	⇒ <i>Cortinarius cinnabarinus</i>
<i>Dermocybe cinnamomea</i>	⇒ <i>Cortinarius cinnamomeus</i>
<i>Dermocybe</i> <i>cinnamomeobadia</i>	⇒ <i>Cortinarius</i> <i>cinnamomeobadius</i>

---

<i>Dermocybe crocea</i>	⇒ <i>Cortinarius croceus</i>
<i>Dermocybe malicoria</i>	⇒ <i>Cortinarius malicorius</i>
<i>Dermocybe palustris</i>	⇒ <i>Cortinarius huronensis</i>
<i>Dermocybe phoenicea</i>	⇒ <i>Cortinarius phoeniceus</i>
<i>Dermocybe sanguinea</i>	⇒ <i>Cortinarius sanguineus</i>
<i>Dermocybe semisanguinea</i>	⇒ <i>Cortinarius semisanguineus</i>
<i>Dermocybe uliginosa</i>	⇒ <i>Cortinarius uliginosus</i>
<i>Eccilia griseorubella</i>	⇒ <i>Entoloma griseorubidum</i>
<i>Eccilia rusticoides</i>	⇒ <i>Entoloma rusticoides</i>
<i>Eccilia sericeonitida</i>	⇒ <i>Entoloma undatum</i>
<i>Entoloma griseorubellus</i>	⇒ <i>Entoloma griseorubidum</i>
<i>Entoloma helodes</i>	⇒ <i>Entoloma elodes</i>
<i>Entoloma icterinum</i>	⇒ <i>Entoloma pleopodium</i>
<i>Entoloma leptopipes</i>	⇒ <i>Entoloma</i> <i>incarnatofuscescens</i>
<i>Entoloma lividum</i>	⇒ <i>Entoloma sinuatum</i>
<i>Entoloma staurosporum</i>	⇒ <i>Entoloma conferendum</i>
<i>Flammula alnicola</i>	⇒ <i>Pholiota alnicola</i>
<i>Flammula carbonaria</i>	⇒ <i>Pholiota highlandiensis</i>
<i>Flammula spumosa</i>	⇒ <i>Pholiota spumosa</i>
<i>Flammulaster wieslandri</i>	⇒ <i>Flammulaster gracilis</i>
<i>Galera hypnorum</i>	⇒ <i>Galerina hypnorum</i>
<i>Galera mniophila</i>	⇒ <i>Galerina mniophila</i>
<i>Galera tenera</i>	⇒ <i>Conocybe subovalis</i>
<i>Galera tenera</i> f. <i>convexa</i>	⇒ <i>Conocybe semiglobata</i>
<i>Galera tenera</i> f. <i>tenella</i>	⇒ <i>Conocybe tenera</i>
<i>Galera teneroides</i>	⇒ <i>Conocybe rickeniana</i>
<i>Galerina heterocystis</i>	⇒ <i>Galerina clavata</i>
<i>Galerina jaapii</i>	⇒ <i>Galerina mycenoides</i>
<i>Galerina mycenopsis</i>	⇒ <i>Galerina pumila</i>

<i>Gerronema albidum</i>	⇒ <i>Gerronema prescotii</i>
<i>Gerronema fibula</i>	⇒ <i>Rickinella fibula</i>
<i>Gerronema setipes</i>	⇒ <i>Rickinella setipes</i>
<i>Gliophorus insipidus</i>	⇒ <i>Hygrocybe insipida</i>
<i>Gliophorus lilacinus</i>	⇒ <i>Hygrocybe lilacina</i>
<i>Gliophorus psittacinus</i>	⇒ <i>Hygrocybe psittacina</i>
<i>Gliophorus reae</i>	⇒ <i>Hygrocybe reae</i>
<i>Gomphidius rutilus</i>	⇒ <i>Chroogomphus rutilus</i>
<i>Gomphidius viscidus</i>	⇒ <i>Chroogomphus rutilus</i>
<i>Gymnopilus junonius</i>	⇒ <i>Gymnopilus spectabilis</i>
<i>Hebeloma strophosum</i>	⇒ <i>Hebeloma mesophaeum</i> var. <i>strophosum</i>
<i>Hemimycena delicatella</i>	⇒ <i>Hemimycena lactea</i>
<i>Hygrocybe lepida</i>	⇒ <i>Hygrocybe cantharellus</i>
<i>Hygrocybe acutoconica</i>	⇒ <i>Hygrocybe persistens</i>
<i>Hygrocybe armeniaca</i>	⇒ <i>Cortinarius armeniacus</i>
<i>Hygrocybe chloroides</i>	⇒ <i>Hygrocybe tristis</i>
<i>Hygrocybe langei</i>	⇒ <i>Hygrocybe persistens</i>
<i>Hygrocybe murinacea</i>	⇒ <i>Hygrocybe nitrata</i>
<i>Hygrocybe nigrescens</i>	⇒ <i>Hygrocybe pseudoconica</i>
<i>Hygrocybe quieta</i>	⇒ <i>Hygrocybe obrussea</i>
<i>Hygrocybe uracea</i>	⇒ <i>Cortinarius uraceus</i>
<i>Hygrophorus aureus</i>	⇒ <i>Hygrophorus. hypothecus</i> var. <i>aureus</i>
<i>Hygrophorus calyptriformis</i>	⇒ <i>Hygrocybe calyptriformis</i>
<i>Hygrophorus ceraceus</i>	⇒ <i>Hygrocybe ceracea</i>
<i>Hygrophorus chlorophanus</i>	⇒ <i>Hygrocybe chlorophana</i>
<i>Hygrophorus coccineus</i>	⇒ <i>Hygrocybe coccinea</i>
<i>Hygrophorus conicus</i>	⇒ <i>Hygrocybe conica</i>
<i>Hygrophorus cossus</i>	⇒ <i>Hygrophorus hedrychii</i>

---

<i>Hygrophorus nitratus</i>	⇒ <i>Hygrocybe nitrata</i>
<i>Hygrophorus obrusseus</i>	⇒ <i>Hygrocybe obrussea</i>
<i>Hygrophorus psittacinus</i>	⇒ <i>Hygrocybe psittacina</i>
<i>Hygrophorus puniceus</i>	⇒ <i>Hygrocybe punicea</i>
<i>Hygrophorus spadiceus</i>	⇒ <i>Hygrocybe spadicea</i>
<i>Hypholoma candoleanum</i>	⇒ <i>Psathyrella candoleana</i>
<i>Hypholoma elongatipes</i>	⇒ <i>Hypholoma elongatum</i>
<i>Hypholoma epixanthum</i>	⇒ <i>Hypholoma radicosum</i>
<i>Hypholoma lacrimabundum</i>	⇒ <i>Psathyrella lacrimabunda</i>
<i>Hypholoma sublateritium</i>	⇒ <i>Hypholoma lateritium</i>
<i>Hypholoma tessullatus</i>	⇒ <i>Hypsizygus ulmarius</i>
<i>Inocybe brunneoatra</i>	⇒ <i>Inocybe fuscidula</i>
<i>Inocybe commutabilis</i>	⇒ <i>Inocybe sindonia</i>
<i>Inocybe dulcamara</i>	⇒ <i>Inocybe terrigena</i>
<i>Inocybe fastigiata</i>	⇒ <i>Inocybe rimosa</i>
<i>Inocybe friesii</i>	⇒ <i>Inocybe nitidiuscula</i>
<i>Inocybe gausapata</i>	⇒ <i>Inocybe flocculosa</i>
<i>Inocybe hirsuta</i>	⇒ <i>Inocybe cervicolor</i>
<i>Inocybe incarnata</i>	⇒ <i>Inocybe fraudans</i>
<i>Inocybe kühneri</i>	⇒ <i>Inocybe sindonia</i>
<i>Inocybe lanuginella</i>	⇒ <i>Inocybe curvipes</i>
<i>Inocybe maritima</i>	⇒ <i>Inocybe impexa</i>
<i>Inocybe microspora</i>	⇒ <i>Inocybe glabripes</i>
<i>Inocybe obscura</i>	⇒ <i>Inocybe cincinnata</i>
<i>Inocybe pallidipes</i>	⇒ <i>Inocybe flocculosa</i>
<i>Inocybe patouillardii</i>	⇒ <i>Inocybe erubescens</i>
<i>Inocybe praetervisa</i>	⇒ <i>Inocybe mixtilis</i>
<i>Inocybe pyriodora</i>	⇒ <i>Inocybe flocculosa</i>
<i>Inocybe relicina</i>	⇒ <i>Inocybe fuscomarginata</i>
<i>Inocybe scabella</i>	⇒ <i>Inocybe muricellata</i>

<i>Inocybe umbrina</i>	⇒ <i>Inocybe assimilata</i>
<i>Inocybe virgatula</i>	⇒ <i>Inocybe fuscidula</i>
<i>Inoloma alboviolaceum</i>	⇒ <i>Cortinarius alboviolaceus</i>
<i>Inoloma bolare</i>	⇒ <i>Cortinarius bolaris</i>
<i>Inoloma tophaceum</i>	⇒ <i>Cortinarius tofaceus</i>
<i>Inoloma traganum</i>	⇒ <i>Cortinarius traganus</i>
<i>Inoloma violaceum</i>	⇒ <i>Cortinarius violaceus</i>
<i>Kuehneromyces myriadophylla</i>	⇒ <i>Kuehneromyces lignicola</i>
<i>Kuehneromyces vernalis</i>	⇒ <i>Kuehneromyces lignicola</i>
<i>Laccaria amethystina</i>	⇒ <i>Laccaria amethystea</i>
<i>Laccaria echinospora</i>	⇒ <i>Laccaria tortilis</i>
<i>Lacrymaria lacrimabunda</i>	⇒ <i>Psathyrella lacrimabunda</i>
<i>Lactarius blumii</i>	⇒ <i>Lactarius pubescens</i>
<i>Lactarius cilicioides</i>	⇒ <i>Lactarius citriolens</i>
<i>Lactarius cyathula</i>	⇒ <i>Lactarius omphaliaformis</i>
<i>Lactarius favrei</i>	⇒ <i>Lactarius scoticus</i>
<i>Lactarius fuscus</i>	⇒ <i>Lactarius mammosus</i>
<i>Lactarius ichoratus</i>	⇒ <i>Lactarius fulvissimus</i>
<i>Lactarius pyrogalus</i>	⇒ <i>Lactarius hortensis</i>
<i>Lactarius semisanguifluus</i>	⇒ <i>Lactarius deterrimus</i>
<i>Lactarius tabidus</i>	⇒ <i>Lactarius theiogalus</i>
<i>Lactarius turpis</i>	⇒ <i>Lactarius necator</i>
<i>Lactarius vellereus</i>	⇒ <i>Lactarius bertillonii</i>
<i>Leccinum holopus</i>	⇒ <i>Leccinum niveum</i>
<i>Leccinum melaneum</i>	⇒ <i>Leccinum roseofractum</i>
<i>Leccinum roseotinctum</i>	⇒ <i>Leccinum percandidum</i>
<i>Leccinum testaceoscabrum</i>	⇒ <i>Leccinum versipelle</i>
<i>Lepiota acutesquamosa</i>	⇒ <i>Lepiota aspera</i>
<i>Lepiota amianthina</i>	⇒ <i>Cystoderma amianthinum</i>

---

<i>Lepiota badhamii</i>	⇒ <i>Leucocoprinus bresadolae</i>
<i>Lepiota carcharias</i>	⇒ <i>Cystoderma carcharias</i>
<i>Lepiota cinnabarinia</i>	⇒ <i>Cystoderma cinnabarinum</i>
<i>Lepiota eriophora</i>	⇒ <i>Lepiota langei</i>
<i>Lepiota excoriata</i>	⇒ <i>Macrolepiota excoriata</i>
<i>Lepiota friesii</i>	⇒ <i>Lepiota aspera</i>
<i>Lepiota lenticularis</i>	⇒ <i>Limacella guttata</i>
<i>Lepiota procera</i>	⇒ <i>Macrolepiota procera</i>
<i>Lepiota rhacodes</i>	⇒ <i>Macrolepiota rhacodes</i>
<i>Lepiota umbonata</i>	⇒ <i>Macrolepiota mastoidea</i>
<i>Lepista gilva</i>	⇒ <i>Lepista flaccida</i>
<i>Lepista nebularis</i>	⇒ <i>Clitocybe nebularis</i>
<i>Lepista panaeola</i>	⇒ <i>Lepista luscina</i>
<i>Lepista saeva</i>	⇒ <i>Lepista personata</i>
<i>Leptoglossum muscigenum</i>	⇒ <i>Arrhenia spathulata</i>
<i>Leptoglossum acerosum</i>	⇒ <i>Arrhenia acerosa</i>
<i>Leptonia euchroa</i>	⇒ <i>Entoloma euchroum</i>
<i>Leptonia serrulata</i>	⇒ <i>Entoloma serrulatum</i>
<i>Leucoagaricus bresadolae</i>	⇒ <i>Leucocoprinus bresadolae</i>
<i>Leucoagaricus naucinus</i>	⇒ <i>Leucoagaricus cretaceus</i>
<i>Leucoagaricus pudicus</i>	⇒ <i>Leucoagaricus cretaceus</i>
<i>Leucopaxillus amarus</i>	⇒ <i>Leucopaxillus gentianeus</i>
<i>Leucopaxillus tricolor</i>	⇒ <i>Leucopaxillus compactus</i>
<i>Limacella lenticularis</i>	⇒ <i>Limacella guttata</i>
<i>Limacium agathosmum</i>	⇒ <i>Hygrophorus agathosmus</i>
<i>Limacium chrysodon</i>	⇒ <i>Hygrophorus chrysodon</i>
<i>Limacium eburneum</i>	⇒ <i>Hygrophorus eburneus</i>
<i>Limacium hypotheum</i>	⇒ <i>Hygrophorus hypothejus</i>
<i>Limacium olivaceoalbum</i>	⇒ <i>Hygrophorus olivaceoalbus</i>
<i>Limacium penarium</i>	⇒ <i>Hygrophorus penarius</i>

<i>Lyophyllum aggregatum</i>	⇒ <i>Lyophyllum decastes</i>
<i>Lyophyllum ambustum</i>	⇒ <i>Tephrocybe ambusta</i>
<i>Lyophyllum antrachophylum</i>	⇒ <i>Tephrocybe antracophila</i>
<i>Lyophyllum caerulescens</i>	⇒ <i>Lyophyllum crassifolium</i>
<i>Lyophyllum conglobatum</i>	⇒ <i>Lyophyllum fumosum</i>
<i>Lyophyllum inolens</i>	⇒ <i>Tephrocybe inolens</i>
<i>Lyophyllum mephiticum</i>	⇒ <i>Tephrocybe mephitica</i>
<i>Lyophyllum murinum</i>	⇒ <i>Tephrocybe murina</i>
<i>Lyophyllum palustre</i>	⇒ <i>Tephrocybe palustre</i>
<i>Lyophyllum rancidum</i>	⇒ <i>Tephrocybe rancida</i>
<i>Lyophyllum ulmarium</i>	⇒ <i>Hypsizygus ulmarius</i>
<i>Macrolepiota puellaris</i>	⇒ <i>Macrolepiota nympharum</i>
<i>Macrolepiota rhacodes</i> var. <i>hortensis</i>	⇒ <i>Macrolepiota rhacodes</i> var. <i>bohemica</i>
<i>Marasmiellus rosellus</i>	⇒ <i>Omphalina rosella</i>
<i>Marasmius perforans</i>	⇒ <i>Micromphale perforans</i>
<i>Melanoleuca vulgaris</i>	⇒ <i>Melanoleuca melaleuca</i>
<i>Melanophyllum echinatum</i>	⇒ <i>Melanophyllum</i> <i>haematospermum</i>
<i>Microcollybia cirrhata</i>	⇒ <i>Collybia cirrhata</i>
<i>Microcollybia cookei</i>	⇒ <i>Collybia cookei</i>
<i>Microcollybia tuberosa</i>	⇒ <i>Collybia tuberosa</i>
<i>Mycena "galopoda"</i>	⇒ <i>Mycena galopus</i>
<i>Mycena "haematopoda"</i>	⇒ <i>Mycena haematopus</i>
<i>Mycena alcalina</i>	⇒ <i>Mycena stipata</i>
<i>Mycena ammoniaca</i>	⇒ <i>Mycena aetitis</i>
<i>Mycena ammoniaca</i>	⇒ <i>Mycena leptocephala</i>
<i>Mycena amygdalina</i>	⇒ <i>Mycena filopes</i>
<i>Mycena avenacea</i>	⇒ <i>Mycena olivaceomarginata</i>
<i>Mycena chlorinella</i>	⇒ <i>Mycena leptocephala</i>

---

<i>Mycena clavularis</i>	⇒ <i>Mycena stylobates</i>
<i>Mycena corticola</i>	⇒ <i>Mycena alba</i>
<i>Mycena epipterygia</i> var. <i>viscosa</i>	⇒ <i>Mycena viscosa</i>
<i>Mycena flavipes</i>	⇒ <i>Mycena renati</i>
<i>Mycena flavoalba</i> var. <i>floridula</i>	⇒ <i>Mycena floridula</i>
<i>Mycena gypsea</i>	⇒ <i>Hemimycena cucullata</i>
<i>Mycena lactea</i>	⇒ <i>Hemimycena lactea</i>
<i>Mycena leucogala</i>	⇒ <i>Mycena galopus</i>
<i>Mycena luteoalcalina</i>	⇒ <i>Mycena olivaceomarginata</i>
<i>Mycena phyllogena</i>	⇒ <i>Mycena metata</i>
<i>Mycena plicosa</i>	⇒ <i>Mycena olivaceomarginata</i>
<i>Mycena plicosa</i> var. <i>marginata</i>	⇒ <i>Mycena capillaripes</i>
<i>Mycena praecox</i>	⇒ <i>Mycena abramsii</i>
<i>Mycena pura</i> f. <i>rosea</i>	⇒ <i>Mycena rosea</i>
<i>Mycena uracea</i>	⇒ <i>Mycena megaspora</i>
<i>Mycena vernalis</i>	⇒ <i>Mycena strobilicola</i>
<i>Myxarium collinitum</i>	⇒ <i>Cortinarius muscigenus</i>
<i>Myxarium delibutum</i>	⇒ <i>Cortinarius delibutus</i>
<i>Myxarium elatius</i>	⇒ <i>Cortinarius lividoochraceus</i>
<i>Myxarium mucosum</i>	⇒ <i>Cortinarius mucosus</i>
<i>Myxarium vibratile</i>	⇒ <i>Cortinarius vibratilis</i>
<i>Myxomphalia maura</i>	⇒ <i>Fayodia maura</i>
<i>Naematoloma capnoides</i>	⇒ <i>Hypholoma capnoides</i>
<i>Naematoloma ericaeoides</i>	⇒ <i>Hypholoma ericaeoides</i>
<i>Naematoloma fasciculare</i>	⇒ <i>Hypholoma fasciculare</i>
<i>Naematoloma myosotis</i>	⇒ <i>Hypholoma myosotis</i>
<i>Naematoloma polytrichi</i>	⇒ <i>Hypholoma polytrichi</i>
<i>Naematoloma radicosum</i>	⇒ <i>Hypholoma radicosum</i>

<i>Naematoloma subericaceum</i>	⇒ <i>Hypholoma subericaceum</i>
<i>Naematoloma sublateritium</i>	⇒ <i>Hypholoma lateritium</i>
<i>Naematoloma udum</i>	⇒ <i>Hypholoma udum</i>
<i>Naucoria centunculus</i>	⇒ <i>Ramicola centunculus</i>
<i>Naucoria conspersa</i>	⇒ <i>Naucoria subconspersa</i>
<i>Neohygrocybe nitrata</i>	⇒ <i>Hygrocybe nitrata</i>
<i>Notophanus lignatilis</i>	⇒ <i>Clitocybe lignatilis</i>
<i>Notophanus porrigens</i>	⇒ <i>Pleurocybella porrigens</i>
<i>Nyctalis asterophora</i>	⇒ <i>Asterophora lycoperdoides</i>
<i>Nyctalis parasitica</i>	⇒ <i>Asterophora parasitica</i>
<i>Omphalia asterosporus</i>	⇒ <i>Omphaliaster asterosporus</i>
<i>Omphalina ericetorum</i>	⇒ <i>Omphalina umbellifera</i>
<i>Omphalina fibula</i>	⇒ <i>Rickinella fibula</i>
<i>Omphalina postii</i>	⇒ <i>Gerronema postii</i>
<i>Omphalina setipes</i>	⇒ <i>Rickinella setipes</i>
<i>Oudemansiella platyphylla</i>	⇒ <i>Megacollybia platyphylla</i>
<i>Oudemansiella radicata</i>	⇒ <i>Xerula radicata</i>
<i>Panaeolus foenisecii</i>	⇒ <i>Panaeolina foenisecii</i>
<i>Panaeolus campanulatus</i>	⇒ <i>Panaeolus sphinctrinus</i>
<i>Panaeolus rickenii</i>	⇒ <i>Panaeolus acuminatus</i>
<i>Panaeolus semiovatus</i>	⇒ <i>Panaeolus fimiputris</i>
<i>Panus conchatus</i>	⇒ <i>Lentinus conchatus</i>
<i>Panus suavissimus</i>	⇒ <i>Lentinus suavissimus</i>
<i>Panus tigrinus</i>	⇒ <i>Lentinus tigrinus</i>
<i>Phlegmacium coerulescens</i>	⇒ <i>Cortinarius caerulescens</i>
<i>Phlegmacium elegantius</i>	⇒ <i>Cortinarius elegantior</i>
<i>Phlegmacium fulgens</i>	⇒ <i>Cortinarius fulmineus</i>
<i>Phlegmacium infractum</i>	⇒ <i>Cortinarius infractus</i>
<i>Phlegmacium largum</i>	⇒ <i>Cortinarius nemorensis</i>
<i>Phlegmacium multiforme</i>	⇒ <i>Cortinarius multiformis</i>

---

<i>Phlegmacium scaurum</i>	⇒ <i>Cortinarius scaurus</i>
<i>Phlegmacium triumphans</i>	⇒ <i>Cortinarius triumphans</i>
<i>Phlegmacium variicolor</i>	⇒ <i>Cortinarius variecolor</i>
<i>Pholiota adiposa</i>	⇒ <i>Pholiota aurivellus</i>
<i>Pholiota adiposa</i>	⇒ <i>Pholiota jahnii</i>
<i>Pholiota carbonaria</i>	⇒ <i>Pholiota highlandiensis</i>
<i>Pholiota cerifera</i>	⇒ <i>Pholiota aurivellus</i>
<i>Pholiota curvipes</i>	⇒ <i>Pholiota tuberculosa</i>
<i>Pholiota decussata</i>	⇒ <i>Pholiota lubrica</i>
<i>Pholiota destruens</i>	⇒ <i>Pholiota populnea</i>
<i>Pholiota graminis</i>	⇒ <i>Pholiota conissans</i>
<i>Pholiota lucifera</i>	⇒ <i>Pholiota tuberculosa</i>
<i>Pholiota mutabilis</i>	⇒ <i>Kuehneromyces mutabilis</i>
<i>Pholiota myosotis</i>	⇒ <i>Hypholoma myosotis</i>
<i>Pholiota praecox</i>	⇒ <i>Agrocybe praecox</i>
<i>Pholiota squarrosoadiposa</i>	⇒ <i>Pholiota limonella</i>
<i>Pholiotina aporos</i>	⇒ <i>Conocybe aporos</i>
<i>Pholiotina blattaria</i>	⇒ <i>Conocybe blattaria</i>
<i>Pholiotina cyanopus</i>	⇒ <i>Conocybe cyanopus</i>
<i>Pholiotina filaris</i>	⇒ <i>Conocybe filaris</i>
<i>Pleurocybella lignatilis</i>	⇒ <i>Clitocybe lignatilis</i>
<i>Pleurotellus mutilus</i>	⇒ <i>Clitocybe josserandii</i>
<i>Pleurotus corticatus</i>	⇒ <i>Pleurotus dryinus</i>
<i>Pleurotus geogenius</i>	⇒ <i>Hohenbuehelia geogenia</i>
<i>Pleurotus mitis</i>	⇒ <i>Panellus mitis</i>
<i>Pleurotus nidulans</i>	⇒ <i>Phyllotopsis nidulans</i>
<i>Pleurotus ostreatus</i> var. <i>salignus</i>	⇒ <i>Pleurotus salignus</i>
<i>Pleurotus petaloides</i>	⇒ <i>Hohenbuehelia petaloides</i>
<i>Pleurotus serotinus</i>	⇒ <i>Panellus serotinus</i>

<i>Pleurotus ulmarius</i>	⇒ <i>Hypsizygus ulmarius</i>
<i>Pluteus atricapillus</i>	⇒ <i>Pluteus cervinus</i>
<i>Pluteus atromarginatus</i>	⇒ <i>Pluteus triscupidatus</i>
<i>Pluteus gracilis</i>	⇒ <i>Pluteus semibulbosus</i>
<i>Pluteus lutescens</i>	⇒ <i>Pluteus romellii</i>
<i>Pluteus patricius</i>	⇒ <i>Pluteus petasatus</i>
<i>Pluteus rimulosus</i>	⇒ <i>Pluteus dietrichii</i>
<i>Pluteus xanthophaeus</i>	⇒ <i>Pluteus chrysophaeus</i>
<i>Porphyrellus pseudoscabер</i>	⇒ <i>Porphyrellus porphyrosporus</i>
<i>Psalliota arenicola</i>	⇒ <i>Agaricus campestris</i>
<i>Psalliota arvensis</i>	⇒ <i>Agaricus arvensis</i>
<i>Psalliota campestris</i>	⇒ <i>Agaricus bitorquis</i>
<i>Psalliota haemorrhoidea</i>	⇒ <i>Agaricus langei</i>
<i>Psalliota rusiophylla</i>	⇒ <i>Agaricus langei</i>
<i>Psalliota silvatica</i>	⇒ <i>Agaricus silvaticus</i>
<i>Psalliota silvicola</i>	⇒ <i>Agaricus silvicola</i>
<i>Psathyra gossypina</i>	⇒ <i>Psathyrella gossypina</i>
<i>Psathyrella corrugis</i>	⇒ <i>Psathyrella bipellis</i>
<i>Psathyrella cortinarioides</i>	⇒ <i>Psathyrella frustulenta</i>
<i>Psathyrella gracilis</i>	⇒ <i>Psathyrella corrugis</i>
<i>Psathyrella hydrophyla</i>	⇒ <i>Psathyrella piluliformis</i>
<i>Psathyrella prona</i>	⇒ <i>Psathyrella atomata</i>
<i>Psathyrella pseudocasca</i>	⇒ <i>Psathyrella casca</i>
<i>Psathyrella subatrata</i>	⇒ <i>Psathyrella conopilus</i>
<i>Psathyrella sylvestris</i>	⇒ <i>Psathyrella populina</i>
<i>Psathyrella velutina</i>	⇒ <i>Psathyrella lacrimabunda</i>
<i>Pseudohygrocybe cantharellus</i>	⇒ <i>Hygrocybe cantharellus</i>
<i>Pseudohygrocybe ceracea</i>	⇒ <i>Hygrocybe cantharellus</i>

---

<i>Pseudohygrocybe coccinea</i>	⇒ <b><i>Hygrocybe coccinea</i></b>
<i>Pseudohygrocybe intermedia</i>	⇒ <b><i>Hygrocybe intermedia</i></b>
<i>Pseudohygrocybe miniata</i>	⇒ <b><i>Hygrocybe miniata</i></b>
<i>Pseudohygrocybe obrussea</i>	⇒ <b><i>Hygrocybe obrussea</i></b>
<i>Pseudohygrocybe punicea</i>	⇒ <b><i>Hygrocybe punicea</i></b>
<i>Pseudohygrocybe turunda</i>	⇒ <b><i>Hygrocybe turunda</i></b>
<i>Psilocybe inquilina</i> var. <i>crobulus</i>	⇒ <b><i>Psilocybe crobula</i></b>
<i>Psilocybe uda</i>	⇒ <b><i>Hypholoma elongatum</i></b>
<i>Rhizopogon luteolus</i>	⇒ <b><i>Rhizopogon obtextus</i></b>
<i>Rhodocybe truncata</i>	⇒ <b><i>Rhodocybe gemina</i></b>
<i>Rhodophyllus aprilis</i>	⇒ <b><i>Entoloma aprile</i></b>
<i>Rhodophyllus cetratus</i>	⇒ <b><i>Entoloma cetratum</i></b>
<i>Rhodophyllus clypeatus</i>	⇒ <b><i>Entoloma clypeatum</i></b>
<i>Rhodophyllus cucullatus</i>	⇒ <b><i>Entoloma vernum</i></b>
<i>Rhodophyllus elodes</i>	⇒ <b><i>Entoloma elodes</i></b>
<i>Rhodophyllus euchlorus</i>	⇒ <b><i>Entoloma incanum</i></b>
<i>Rhodophyllus icterinus</i>	⇒ <b><i>Entoloma pleopodium</i></b>
<i>Rhodophyllus lampropus</i>	⇒ <b><i>Entoloma lampropus</i></b>
<i>Rhodophyllus lazulinus</i>	⇒ <b><i>Entoloma chalybaeum</i></b>
<i>Rhodophyllus mammosus</i>	⇒ <b><i>Entoloma mammosum</i></b>
<i>Rhodophyllus nidorosus</i>	⇒ <b><i>Entoloma nidorosum</i></b>
<i>Rhodophyllus nitidus</i>	⇒ <b><i>Entoloma nitidum</i></b>
<i>Rhodophyllus rhodopolius</i>	⇒ <b><i>Entoloma rhodopolium</i></b>
<i>Rhodophyllus sericellus</i>	⇒ <b><i>Entoloma sericellum</i></b>
<i>Rhodophyllus sericeonitidus</i>	⇒ <b><i>Entoloma undatum</i></b>
<i>Rhodophyllus sericeus</i>	⇒ <b><i>Entoloma sericeum</i></b>
<i>Rhodophyllus serrulatus</i>	⇒ <b><i>Entoloma serrulatum</i></b>
<i>Rhodophyllus sinuatus</i>	⇒ <b><i>Entoloma sinuatum</i></b>
<i>Rhodophyllus staurosporus</i>	⇒ <b><i>Entoloma conferendum</i></b>

<i>Ripartites strigiceps</i>	⇒ <i>Ripartites tricholoma</i>
<i>Russula aurea</i>	⇒ <i>Russula aurata</i>
<i>Russula delica</i> var <i>chloroides</i>	⇒ <i>Russula chloroides</i>
<i>R. fageticola</i>	⇒ <i>Russula mairei</i> var. <i>fageticola</i>
<i>Russula flava</i>	⇒ <i>Russula claroflava</i>
<i>R. palumbina</i> var. <i>ionochlora</i>	⇒ <i>Russula ionochlora</i>
<i>Russula polychroma</i>	⇒ <i>Russula integra</i>
<i>Russula pulchella</i>	⇒ <i>Russula exalbicans</i>
<i>Russula rosacea</i>	⇒ <i>Russula rosea</i>
<i>Russula undulata</i>	⇒ <i>Russula atropurpurea</i>
<i>Russuliopsis laccata</i>	⇒ <i>Laccaria laccata</i>
<i>Simocybe centunculus</i>	⇒ <i>Ramicola centunculus</i>
<i>Simocybe rubi</i>	⇒ <i>Ramicola haustellaris</i>
<i>Simocybe sumptuosa</i>	⇒ <i>Ramicola sumptuosa</i>
<i>Strobilomyces floccopus</i>	⇒ <i>Strobilomyces strobilaceus</i>
<i>Stropharia caerulea</i>	⇒ <i>Stropharia cyanea</i>
<i>Stropharia luteonitens</i>	⇒ <i>Stropharia umbonatescens</i>
<i>Stropharia squamosa</i>	⇒ <i>Hypholoma squamosa</i>
<i>Stropharia stercoraria</i>	⇒ <i>Stropharia semiglobata</i>
<i>Suillus castaneus</i>	⇒ <i>Gyroporus castaneus</i>
<i>Suillus cyanescens</i>	⇒ <i>Gyroporus cyanescens</i>
<i>Suillus laricinus</i>	⇒ <i>Suillus aeruginascens</i>
<i>Suillus piperatus</i>	⇒ <i>Chalciporus piperatus</i>
<i>Telamonia armillata</i>	⇒ <i>Cortinarius armillatus</i>
<i>Telamonia brunnea</i>	⇒ <i>Cortinarius brunneus</i>
<i>Telamonia brunneofulva</i>	⇒ <i>Cortinarius brunneofulvus</i>
<i>Telamonia gentilis</i>	⇒ <i>Cortinarius gentilis</i>
<i>Telamonia rigida</i>	⇒ <i>Cortinarius rigidus</i>

---

<i>Telamonia torva</i>	⇒ <b><i>Cortinarius torvus</i></b>
<i>Tephrocybe carbonaria</i>	⇒ <b><i>Tephrocybe antracophila</i></b>
<i>Tricholoma auratum</i>	⇒ <b><i>Tricholoma equestre</i></b>
<i>Tricholoma bulbigerum</i>	⇒ <b><i>Leucocortinarius bulbiger</i></b>
<i>Tricholoma conglobatum</i>	⇒ <b><i>Lyophyllum fumosum</i></b>
<i>Tricholoma decora</i>	⇒ <b><i>Tricholomopsis rutilans</i></b>
<i>Tricholoma flavobrunneum</i>	⇒ <b><i>Tricholoma fulvum</i></b>
<i>Tricholoma flavovirens</i>	⇒ <b><i>Tricholoma equestre</i></b>
<i>Tricholoma gambosum</i>	⇒ <b><i>Calocybe gambosa</i></b>
<i>Tricholoma melaleucum</i>	⇒ <b><i>Melanoleuca melaleuca</i></b>
<i>Tricholoma nudum</i>	⇒ <b><i>Lepista nuda</i></b>
<i>Tricholoma pardolotum</i>	⇒ <b><i>Tricholoma pardinum</i></b>
<i>Tricholoma personatum</i>	⇒ <b><i>Lepista personata</i></b>
<i>Tricholoma pseudoalbum</i>	⇒ <b><i>Tricholoma album</i></b>
<i>Tricholoma rutilans</i>	⇒ <b><i>Tricholomopsis decora</i></b>
<i>Tricholoma semitale</i>	⇒ <b><i>Lyophyllum semitale</i></b>
<i>Tricholoma sordidum</i>	⇒ <b><i>Lepista sordida</i></b>
<i>Tricholoma stiparophyllum</i>	⇒ <b><i>Tricholoma album</i></b>
<i>Tricholoma tigrinum</i>	⇒ <b><i>Tricholoma pardinum</i></b>
<i>Tricholomella constricta</i>	⇒ <b><i>Calocybe leucocephala</i></b>
<i>Tubaria hiemalis</i>	⇒ <b><i>Tubaria furfuracea</i></b>
<i>Tubaria pellucida</i>	⇒ <b><i>Tubaria furfuracea</i></b>
<i>Volvariella speciosa</i>	⇒ <b><i>Volvariella gloiocephala</i></b>
<i>Xeromphalia amara</i>	⇒ <b><i>Xeromphalia fellea</i></b>

## GINŠU LATVISKO NOSAUKUMU RĀDĪTĀJS

atmatenes	⇒	<i>Agaricus</i>
alksnenes	⇒	<i>Lactarius</i>
aplocenes	⇒	<i>Lepista</i>
apšubekas	⇒	<i>Leccinum</i>
austersēnes	⇒	<i>Pleurotus</i>
balmietenes	⇒	<i>Leucopaxillus</i>
balttīmeklenes	⇒	<i>Leucocortinarius</i>
baravikas	⇒	<i>Boletus</i>
bārkstmales	⇒	<i>Hebeloma</i>
bekas	⇒	<i>Boletus</i>
bērzlapenes	⇒	<i>Laccaria</i>
bērzelapse	⇒	<i>Russula</i>
bērzubekas	⇒	<i>Leccinum</i>
brūnsardzenes	⇒	<i>Phaeolepiota</i>
celmenes	⇒	<i>Armillaria</i>
čemurpūkaines	⇒	<i>Lyophyllum</i>
čiekurenēs	⇒	<i>Baeospora</i>
čiekursēnes	⇒	<i>Strobilurus</i>
čigānenes	⇒	<i>Rozites</i>
dāldersēnes	⇒	<i>Megacollybia</i>
dižsardzenes	⇒	<i>Macrolepiota</i>
dobumsēnītes	⇒	<i>Micromphale</i>
dzeltenpēdenes	⇒	<i>Chroogomphus</i>
fajodijas	⇒	<i>Fayodia</i>
gailenītes	⇒	<i>Cantharellula</i>
geronēmas	⇒	<i>Gerronema</i>
gliemezenes	⇒	<i>Hygrophorus</i>

---

gliemežnīcenes	⇒	<i>Hohenbuehelia</i>
glotaines	⇒	<i>Limacella</i>
graudcepurītes	⇒	<i>Cystoderma</i>
graudsardzenes	⇒	<i>Cystolepiota</i>
gredzenītes	⇒	<i>Panaeolus</i>
greznulītes	⇒	<i>Delicatula</i>
iedobītes	⇒	<i>Omphalina</i>
jumjupūpēži	⇒	<i>Rhizopogon</i>
jumtenes	⇒	<i>Pluteus</i>
kailgalves	⇒	<i>Psilocybe</i>
kamolenes	⇒	<i>Lentinus</i>
karotenes	⇒	<i>Cheimonophyllum</i>
kokpūkaines	⇒	<i>Hypsizygus</i>
košlapītes	⇒	<i>Melanophyllum</i>
krastaines	⇒	<i>Ripartites</i>
krimildes	⇒	<i>Lactarius</i>
krinipelas	⇒	<i>Crinipellis</i>
kroksardzenes	⇒	<i>Leucocoprinus</i>
kserulas	⇒	<i>Xerula</i>
ķiverenes	⇒	<i>Galerina</i>
ķiverītes	⇒	<i>Phaeogalera</i>
lācīši	⇒	<i>Leccinum</i>
liepenes	⇒	<i>Clitocybe</i>
liesmenes	⇒	<i>Gymnopilus</i>
liesmenītes	⇒	<i>Flammulaster</i>
makrocistīdijas	⇒	<i>Macrocytista</i>
makstaines	⇒	<i>Volvariella</i>
makstsēnes	⇒	<i>Amanita</i>
melnbaltenes	⇒	<i>Melanoleuca</i>
melnules	⇒	<i>Melanotus</i>

mietenes	⇒	<i>Paxillus</i>
mušmires	⇒	<i>Amanita</i>
naksnenes	⇒	<i>Asterophora</i>
negailenes	⇒	<i>Hygrophoropsis</i>
pacelmenes	⇒	<i>Kuehneromyces</i>
pelēklapes	⇒	<i>Tephrocybe</i>
pienaines	⇒	<i>Lactarius</i>
piltuvenes	⇒	<i>Clitocybe</i>
plūmenes	⇒	<i>Clitopilus</i>
pūkaines	⇒	<i>Tricholoma</i>
pundurkamolenes	⇒	<i>Panellus</i>
pundursēdenes	⇒	<i>Pleurotellus</i>
puslovenes	⇒	<i>Phyllotopsis</i>
pussēntījas	⇒	<i>Hemimycena</i>
ramikolas	⇒	<i>Ramicola</i>
riekstenītes	⇒	<i>Naucoria</i>
rikinellas	⇒	<i>Rickinella</i>
rubīnbekas	⇒	<i>Chalciporus</i>
rudmieses	⇒	<i>Lactarius</i>
saldūksnes	⇒	<i>Lactarius</i>
samtbekas	⇒	<i>Xerocomus</i>
samtmicītes	⇒	<i>Conocybe</i>
sānausenes	⇒	<i>Pleurocybella</i>
sānauses	⇒	<i>Pleurotus</i>
sarkandzeltaines	⇒	<i>Lactarius</i>
sārtaines	⇒	<i>Rhodotus</i>
sārtgalves	⇒	<i>Rhodocybe</i>
sārtlapītes	⇒	<i>Entoloma</i>
sārtsporenes	⇒	<i>Leucoagaricus</i>
saulsardzenes	⇒	<i>Lepiota</i>

---

sausdobītes	⇒	<i>Xeromphalia</i>
sēdenes	⇒	<i>Crepidotus</i>
sēntiņas	⇒	<i>Mycena</i>
sērsēnes	⇒	<i>Hypholoma</i>
sīkstenes	⇒	<i>Lentinus</i>
skaistgalvenes	⇒	<i>Pseudoclitocybe</i>
skaistgalves	⇒	<i>Calocybe</i>
skaistgalves	⇒	<i>Calocybe</i>
skrimalenes	⇒	<i>Phaeocollybia</i>
smilšbekas	⇒	<i>Gyroporus</i>
smiltenes	⇒	<i>Tricholoma</i>
spīgulītes	⇒	<i>Psathyrella</i>
stardobītes	⇒	<i>Omphaliaster</i>
stiklenes	⇒	<i>Hygrocybe</i>
sūneklenes	⇒	<i>Arrhenia</i>
svārsteklenes	⇒	<i>Panaeolina</i>
svārstenes	⇒	<i>Panaeolus</i>
sviestbekas	⇒	<i>Suillus</i>
šķiedrgalvītes	⇒	<i>Inocybe</i>
tīmeklenes	⇒	<i>Cortinarius</i>
tintenes	⇒	<i>Coprinus</i>
tīrumenes	⇒	<i>Agrocybe</i>
tumšbekas	⇒	<i>Porphyrellus</i>
tumšvītenes	⇒	<i>Phaeomarasmius</i>
turzenes	⇒	<i>Tubaria</i>
ūdenspēdenes	⇒	<i>Hydropus</i>
vērdiņsēnes	⇒	<i>Collybia</i>
vilnīši	⇒	<i>Lactarius</i>
virpainītes	⇒	<i>Stropharia</i>
vistenes	⇒	<i>Tricholomopsis</i>

vītenes	⇒	<i>Marasmius</i>
vītenītes	⇒	<i>Marasmiellus</i>
zeltkātes	⇒	<i>Gomphidius</i>
ziemenes	⇒	<i>Flammulina</i>
zobiņbekas	⇒	<i>Gyrodon</i>
zvīñenes	⇒	<i>Phaeolepiota</i>
zvīñbekas	⇒	<i>Strobilomyces</i>
žultsbekas	⇒	<i>Tylopilus</i>

## LITERATŪRA

- Amoliņš A.** 1992. *Bērzlapes*. Avots, Rīga, 203 lpp.
- Amoliņš A.** 1996. *Bestimmungstabelle der Lettischen Täublinge*. Manuscripts, Rīga, 26 lpp.
- Avota I.** 1992. *Agaricales* rindas sēnu sugas Riča ezera apkārtnes un Silenes meža kompleksajā dabas liegumā. *Informatīvais biletens*. Latvijas Dabas un Pieminekļu Aizsardzības Biedrība. Daugavpils Pedagoģiskais Institūts. Daugavpils, 2: 6.
- Avota I.** 1993. Retas sēnu sugas Ilgu un Daugavpils apkārtnē. *Informatīvais biletens*. Latvijas Dabas un Pieminekļu Aizsardzības Biedrība. Daugavpils Pedagoģiskais Institūts. Daugavpils, 6: 6.
- Avota I.** 1994. Fungi new for Latvia from National Park of Gauja. (1991 – 1992) *Daba un muzejs*. Gandrs, Rīga, 5: 30– 31.
- Avota I. Krastiņa I.** 1994. New species of Fungi in Latvian mycoflora (1984 – 1992.) *Daba un muzejs*. Gandrs, Rīga, 5: 32– 33.
- Avota I.** 1995. Cepurīšu sēnes Markavas izziņas takā. *Informatīvais biletens*. Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte. DIVIC. Daugavpils, 8: 5.
- Avota I.** 1995a. Latvijai jaunas cepurīšu sēnu sugas Daugavpils apkārtnē. *Informatīvais biletens*. Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte. DIVIC. Daugavpils, 8: 6.

- Avota I.** 1996. Latvijai jaunas cepurīšu (Agaricales s. l.) sēņu sugas Dabas muzeja fondos. *Daba un muzejs*. ADverts, Rīga, 6: 8– 10.
- Avota I. 1996a.** Rare and new for Latvia fungi species in the valley of Daugava in 1995. *Fungi and lichens in the Baltic region. 13 international conference*. Abstract, Riga, p 12.
- Kalamees K. 1996.** Cheklist of the species of the tribus *Lyophyllea* (*Tricholomatales: Tricholomataceae*) in Baltic countries. *Fungi and lichens in the Baltic region. 13 international conference*. Abstract, Riga, p 12.
- Kalamees K., Vimba E. 1985.** Jauni Slīteres Valsts rezervāta mikofloras dati. *Mežsaimniecība un mežrūpniecība*. Nr1,1. 33-38.
- Krastiņa I. 1990.** Materiāli GNP Cepurīšu sēņu florai (Valmieras raj.) Diplomdarbs. LU Bioloģijas fakultāte. Rīga, 100 lpp.
- Krastina I. 2000.** Species composition and dynamics of sporocarp production of macrofungi in pine forests with Vaccinium myrtillus in northern Latvia, *Folia Cryptog. Estonica*, Fasc. 37: 39– 50
- Lapiņš O. 1963.** Materiāli par makroskopiskajam sēnēm Latvijas PSR teritorijā. *Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis*, 12(197): 86-94.
- Moser M. 1978.** *Die Röhrlinge und Blätterpilze*. VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 532 S.
- Nordic Macromycetes 1992.** Vol.2., *Polyporales, Boletales, Agaricales, Russulales*. Helsinki, 475 p.
- Pučko A. 1954.** *Latvijas PSR sēņu noteicējs*. Rīga, 203 lpp.
- Štolls F. E. 1913-1939.** *Latvijas augstāko sēņu akvareļi*. Rokraksts
- Vauras J., Ruotsalainen J. 2000.** Two new species of russula with greying flesh from Fennoscandia. *Micologia 2000 extracta*. A.M.B., pp. 557-568.
- Vimba E. 1997.** Mycological studies of the Latvian coast of the Baltic sea and the gulf of Rīga. *Proceedings of the Latvian Academy of Sciences*, sektion B, Vol. 51.,5/6:234-240.
- Hallingback T. 1994.** *Ekologisk Katalog over Storsvampar. Databanken för hotade arter*. Uppsala, 140p.
- Urbonas V. Kalamees K. Lukin V. 1986.** *Conspectus florum Agaricalium fungorum (Agaricales s. l.) Lithuaniae, Latviae et Estoniae*. Vilnius "Moksłas" 140 p.

**Checklist of Agaricoid and Boletoid Fungi (*Agaricales* s.l.) of Latvia**

Inita Dāniele [Avota], Inguna Krastiņa

**Summary**

Keywords: mycoflora of Latvia, agaricoid fungi, boletoid fungi, Latvian names of species

Conspectus florum Agaricalium fungorum (*Agaricales* s.l.) Lithuaniae, Latviae et Estoniae [Urbonas, Kalamees, Lukin, 1986] published in 1986 is the last and largest data summary on agaricoid and boletoid fungi of Latvia. Species recorded in Lithuania, Latvia and Estonia between 1778 - 1984 are included in the list. During this period 639 species of *Agaricales* s. l., 17 subspecies and 4 forms were known in Latvia.

Since then new species were added to the list of agaricoid and boletoid fungi of Latvia as well as the list was revised considerably. After 1986 several lists of fungi new for Latvia were published (Avota 1992, 1993, 1994, 1995, 1995a, 1996, Avota & Krastiņa, 1994) as well as the determination keys of *Russula* (Amoliņš 1992, 1996). In the other articles or in unpublished material of mycologists new species are mentioned (Krastiņa, 1990, Krastina, 2000, Kalamees 1996, Vimba 1997, Vauras & Routsalainen 2000).

Up to now 1080 species, 43 varieties and 14 forms are known in Latvia. Herbarium specimens of 1022 taxa have been collected (species, forms, varieties); from them, 827 taxa are in the funds of the Latvian Museum of Natural History (collected mainly by I. Daniele [Avota]). Part of taxa are stored in the other herbariums - 257 taxa in the herbarium of the University of Latvia, 317 in the herbarium of I. Krastiņa, and 162 in the herbarium of A. Amoliņš. In total 115 species are mentioned only in literature. We have no information about herbarium existing abroad but it is known that fungal material in Latvia was collected also by mycologists from other countries: K. Kalamees (Estonia), J. Vauras (Finland) and others.

Some of the previously published species are not included in the checklist. These species either have no herbarium specimens (and they have not been displayed in the exhibitions organised by the Latvian Museum of Natural History) or scrupulous re-examination revealed that species were identified incorrectly.

Herbarium specimens whose systematic position is uncertain are not included in the checklist. Species mentioned in articles published after 1986 are marked with an asterisk (\*) and the reference to publication is given. Species mentioned in the publications before 1986 but not mentioned in the “Conspectus florū Agaricalium fungorum”, such as fungal species pictured in the aquarelles of F.E. Stoll are marked in the same way. Species new for Latvia are marked with a double asterisk (\*\*).

In the checklist the species names are given in an alphabetical order. Nomenclature follows mainly “Nordic Macromycetes Vol.2” (Hansen & Knudsen 1992) and “Die Röhrlinge und Blätterpilze” (Moser 1978) and in some cases is conformed to the checklists of Estonia and Lithuania. Most widely used synonyms are given. In order to facilitate work with the checklist at the end an alphabetical list of synonyms is added. For all families and species the Latvian names are given. Usage in food, distribution, assignment to a certain ecological group, typical habitats and vegetation period of fruit bodies are indicated for every taxon as well as the herbariums in which the taxa are stored.

Species that belong to a certain ecological group were identified using “Ekologisk Katalog over Storsvampar. Databanken for hotade arter” (Hallingback 1994).

**Abbreviations:**

L - source of literature;

H - herbarium;

DM – herbarium of Latvian Museum of Natural History;

RIG – herbarium of the University of Latvia;

HK – herbarium of I. Krastiņa;

HA – herbarium of A. Amoliņš;

\*- species mentioned in the publications but not included in the “Conspectus florū Agaricalium fungorum (Agaricales s. l.) Lithuaniae, Latviae et Estoniae”;

\*\*- new species for Latvia.

Authors acknowledge the help of A. Amoliņš, V. Urbonas and K. Kalamees for their aid with the identification of species. We are grateful to E. Vimba for the review of the checklist.